

## CALENDARIO VACCINALE REGIONE CALABRIA - NOTE ESPLICATIVE

Il Calendario Vaccinale Regionale prevede, previo counselling vaccinale, la somministrazione dei seguenti vaccini:

### Nel corso del 1° anno di vita:

Esavalente+Pneumococco+Rotavirus+ Meningococco B ad inizio del 3° mese (61° giorno di vita)  
( in alternativa Meningococco B entro i successivi 15 giorni ma preferibilmente a distanza di una settimana)

Esavalente+Pneumococco+Rotavirus+ Meningococco B ad inizio del 5° mese (121° giorno di vita)  
( in alternativa Meningococco B entro i successivi 15 giorni ma preferibilmente a distanza di una settimana)

Esavalente+Pneumococco ad 11 mesi compiuti

### Sintesi Vaccinazione meningococco B nel primi due anni di vita .

Schedula vaccinale a 2 dosi + 1 dose booster; include la possibilità della co-somministrazione di Esavalente + Pneumococco + MenB + Rotavirus. In alternativa somministrare Esavalente + Pneumococco + Rotavirus e, entro i successivi 15 giorni ma preferibilmente a distanza di una settimana, Men B. La dose booster di Men B sarà effettuata tra il 13° ed il 15° anche in co-somministrazione con MPRV e Men ACYW135 .

### Nel corso del 2° anno di vita:

- MPRVaricella o MPR + Varicella al 13° - 14° mese di vita
- MeningococcoACWY al 13° - 14° mese di vita
- Meningococco B dal 13° al 15° mese di vita

### 6° anno:

- Difterite – tetano – pertosse – poliosalk (DTPalPV o dTpalPV)
- MPRV

### 12° anno:

- Papilloma (HPV) offerta attiva a due dosi nei soggetti di sesso femminile e di sesso maschile

### 12°-18° anno:

- Difterite – tetano – pertosse – poliosalk (dTpalPV)
- MeningococcoACWY + Meningococco B a due dosi

25 anni:

- Papilloma (HPV) offerta gratuita della vaccinazione alle donne non precedentemente vaccinate- Per le donne di età superiore offerta del vaccino in co-payment. Vaccinazione per le donne trattate chirurgicamente per le lesioni precancerose HPV correlate e per soggetti a rischio per determinati comportamenti o condizioni, tra cui i soggetti immunocompromessi con particolare raccomandazione per le persone con infezione da HIV di età compresa tra 22-26 anni.

Dal 60° anno:

- Antinfluenzale ogni anno

65° anno:

- Coorte per antipneumococcico seguito a distanza di almeno 2 mesi da PPV23 + vaccino anti-zoster RZV a due dosi

70° anno:

- Coorte per antipneumococcico seguito a distanza di almeno 2 mesi da PPV23 + e anti-zoster RZV a due dosi, se non effettuate al 65° anno.

Le vaccinazioni antinfluenzale, antipneumococcica, antimeningococcica, anti-zoster vanno effettuate gratuitamente nei soggetti a rischio anche al di fuori delle età previste in calendario.

Chi ha diritto alla gratuità vaccinale mantiene tale diritto anche di effettuare la vaccinazione in ritardo rispetto al calendario.