

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A	APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO							
A02BA01	Cimetidina	os,ev	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BA02	Ranitidina	os,ev	RR			Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BA03	Famotidina	os,ev	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BA04	Nizatidina	os	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BB01	Misoprostolo	os	RNR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1
A02BC01	Omeprazolo	os,ev	RR/OSP	A/H		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1, 48
A02BC02	Pantoprazolo	os	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1, 48
A02BC03	Lansoprazolo	os	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1, 48
A02BC04	Rabeprazolo	os	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BC05	Esomeprazolo	os, ev	RR/OSP	A/H		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1, 48
A04AA05	Palonosetron	ev	OSP	H			Hub, Spoke e Ospedali Generali: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A04AA55	Palonosetron/netupitant	os	RRL	H			Hub, Spoke e Ospedali Generali: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
A05AA03	Acido colico	os	RNRL	H		Trattamento dei difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari primari causati dal deficit di 3β-idrossi-Δ5-C27-steroido ossidoreduttasi o deficit di Δ4-3- ossosteroido-5β-reduktasi in lattanti, bambini e adolescenti da 1 mese a 18 anni di età e negli adulti.	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A05AA04	Acido obeticolico	os	RRL	H	PT cartaceo AIFA	Trattamento della colangite biliare primitiva (PBC, primary biliary cholangitis) (nota anche come cirrosi biliare primitiva) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA	Hub: - Medicina Generale - Gastroenterologia	
A05AA04	Acido obeticolico	os	RRL	H	PT cartaceo AIFA	Trattamento della colangite biliare primitiva (PBC, primary biliary cholangitis) (nota anche come cirrosi biliare primitiva) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA	Hub: - Medicina Generale - Gastroenterologia	
A06AH01	Metilnaltrexone bromuro	sc	RR	A		La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	90
A06AH03	Naloxegol	os	RR	A		La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	90
A06AH05	Naldemedina	os	RR	A		La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche (DCA 70/2022)	90
A07AA11	Rifaximina	os	RR/RRL*	A-PHT		Riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età superiore 0 uguale a 18 anni	Hub, Spoke e Ospedali Generali: - Malattie infettive - Medicina Interna - Gastroenterologia	
A10AE04	Insulina Glargine	sc	RR	A-PHT			Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10AE04	Insulina Glargine Biosimilare	sc	RR	A-PHT			Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE06	Insulina degludec	sc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA		Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	
A10AE54	Insulina glargine/lixisenatide	sc	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10AE56	Insulina degludec/liraglutide	sc	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD07	Sitagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD08	Vildagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD09	Alogliptin + pioglitazone	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD10	Saxagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BD11	Linagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD13	Alogliptin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD15	Dapaglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD16	Canaglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD19	Empaglifozin + linagliptin	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018) Ambulatori I,II,III livello	100
A10BD20	Empaglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BD21	Saxagliptin + dapaglifozin	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018) Ambulatori I,II,III livello	100
A10BD23	Ertuglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018) Ambulatori I,II,III livello	100
A10BD24	Ertuglifozin + sitagliptin	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BH01	Sitagliptin	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria</p>	100
A10BH02	Vildagliptin	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Indicato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico, per migliorare il controllo glicemico nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2: come monoterapia, in pazienti per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza; in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l'insulina, quando questi medicinali non forniscono un adeguato controllo glicemico	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria</p>	100
A10BH03	Saxagliptin	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Indicato in pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico per migliorare il controllo glicemico: in monoterapia quando la metformina non è appropriata a causa di intolleranza o controindicazioni. in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete, inclusa l'insulina, quando questi non forniscono un controllo adeguato della glicemia	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria</p>	100
A10BH04	Alogliptin	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni affetti da diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in combinazione ad altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa insulina basale, quando questi, unitamente a dieta ed esercizio fisico, non forniscono un adeguato controllo glicemico	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Nota prot. 427568 del 29/12/2020</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria</p>	100
A10BH05	Linagliptin	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	In aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico è indicato per migliorare il controllo della glicemia negli adulti con diabete mellito di tipo 2: come monoterapia quando la metformina non è appropriata a causa di intolleranza o è controindicata a causa della compromissione renale. come terapia di associazione in associazione con altri medicinali per il trattamento del diabete, compresa l'insulina, quando questi non forniscono un adeguato controllo della glicemia	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria</p>	100
A10BJ01	Exenatide	sc	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Indicato in pazienti adulti, a partire dai diciotto anni di età con diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in associazione con altri medicinali ipoglicemizzanti inclusa insulina basale, quando la terapia in uso, insieme alla dieta all'esercizio fisico, non fornisce un adeguato controllo glicemico. Per i risultati degli studi relativi alle associazioni, effetti sul controllo glicemico ed eventi cardiovascolari, e sulle popolazioni esaminate	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria</p>	100
A10BJ02	Liraglutide	sc	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico come monoterapia quando l'uso di metformina è considerato inappropriato a causa di intolleranza o controindicazioni in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria</p>	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BJ03	Lixisenatide	sc	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di adulti con diabete mellito di tipo 2 per ottenere il controllo glicemico in associazione con antidiabetici orali e/o insulina basale quando questi, insieme con la dieta e l'esercizio fisico, non forniscono un adeguato controllo glicemico	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BJ05	Dulaglutide	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BJ06	Semaglutide	sc,os	RRL/RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BK01	Dapaglifozin	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BK01	Dapaglifozin	os	RR/RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia	
A10BK02	Canaglifozin	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018) Ambulatori I,II,III livello	100
A10BK03	Empaglifozin	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A10BK03	Empaglifozin	os	RR/RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BK04	Ertuglifozin	os	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria	100
A12AA12	Calcio acetato anidro	os	RR	A			Hub e Spoke: - Nefrologia - Emodialisi	
A16AA01	Levocarnitina	ev	RR	A-PHT		carezza primaria di carnitina	Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Generale	8
A16AA01	Levocarnitina	ev	RR	A-PHT		carezza di carnitina secondaria a trattamento dialitico	Hub e Spoke: - Nefrologia - Emodialisi	8
A16AA04	Mercaptamina bitartrato	os	RNRL	A-PHT			Hub: - Pediatria - Nefrologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AA04	Mercaptamina bitartrato	os	RNRL	A-PHT		Trattamento della cistinosi nefropatica manifesta. La cisteamina riduce l'accumulo della cistina in alcune cellule (ad esempio leucociti e cellule muscolari ed epatiche) di pazienti con cistinosi nefropatica e, se il trattamento è iniziato precocemente, ritarda la comparsa dell'insufficienza renale	Hub: - Nefrologia - Pediatria (Rete Regionale Malattie Rare)	
A16AA05	Acido carginico	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Pediatria - Medicina Generale	
A16AA06	Betaina anidra	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pediatria - Medicina Generale - Epatologia - Nefrologia	
A16AA07	Metreleptina	ev	RRL	H		Indicato in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva per il trattamento delle complicanze da deficit di leptina in pazienti affetti da lipodistrofia (LD): • con diagnosi confermata di LD generalizzata congenita (sindrome di Berardinelli-Seip) o di LD generalizzata acquisita (sindrome di Lawrence) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 2 anni; • con diagnosi confermata di LD parziale familiare o di LD parziale acquisita (sindrome di Barraquer-Simons) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 12 anni, per i quali le terapie standard non sono riuscite a raggiungere un controllo metabolico adeguato	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Pediatria	
A16AB02	Imiglucerasi	ev	OSP	H			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AB04	Agalsidasi beta	ev	OSP	H			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB05	Laronidasi	ev	RR	H			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB07	A-glicosidasi alfa	ev	OSP	H			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB09	Idursulfase	ev	RR	H			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB14	Sebelipasi alfa	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato per la terapia enzimatica sostitutiva (TES) a lungo termine in pazienti affetti da deficit di lipasi acida lisosomiale (LAL) ad esordio precoce (entro il primo anno di vita) e a rapida progressione	Hub: - Endocrinologia - Pediatria - Neonatologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB15	Velmanase alfa	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento di manifestazioni non neurologiche in pazienti affetti da alfa-mannosidosi da lieve a moderata	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB17	Cerliponase alfa	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento della patologia ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), nota anche come carenza di tripeptidil-peptidasi 1 (TPP-1)	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB18	Vestronidasi alfa	ev	OSP	H		Indicato per la cura di manifestazioni non neurologiche di mucopolisaccaridosi VII (MPS VII; sindrome di Sly).	Hub: - Pediatria - Medicina interna Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB19	Pegvaliase	sc	RRL	H		Indicato per il trattamento di pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU), di eta' pari e superiore ai sedici anni, che hanno un controllo inadeguato della fenilalanina ematica (livelli ematici di fenilalanina maggiori di 600 micromol/L) nonostante il trattamento precedente con le opzioni terapeutiche disponibili	Hub: - Pediatria - Medicina interna Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AB21	Atidarsagene autotemcel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento della leucodistrofia metacromatica (MLD) caratterizzata da mutazioni bialleliche del gene arilsulfatasi A (ARSA) che comportano una riduzione dell'attività enzimatica di ARSA: - nei bambini con forme infantili tardive o giovanili precoci, senza manifestazioni cliniche della malattia, - nei bambini con la forma giovanile precoce, con manifestazioni cliniche precoci della malattia, che conservano la capacità di camminare autonomamente e prima dell'inizio del declino cognitivo	IRCCS San Raffaele di Milano Pediatria Immunoematologica	
A16AX03	Sodio fenilbutirrato	os	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Medicina Generale - Pediatria - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AX04	Nittsinone	os	RR	A-PHT			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AX05	Zinco acetato	os	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Medicina Generale - Pediatria - Epatologia - Neurologia - Neuropsichiatria	
A16AX06	Miglustat	os	RRL	A-PHT		Trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C.	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AX07	Sapropterin	os	RRL	A-PHT			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AX08	Teduglutide	sc	RRL	H		Trattamento di pazienti di 1 anno di età e oltre affetti da sindrome dell'intestino corto (SBS). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito dell'intervento	Hub e Spoke: - Gastroenterologia	
A16AX10	Eliglustat	os	RRL	A-PHT		Trattamento a lungo termine di pazienti adulti con malattia di Gaucher di tipo 1 (GD1) che sono metabolizzatori lenti (poor metabolisers, PMs), metabolizzatori intermedi (intermediate metabolisers, IMs) o metabolizzatori estensivi (extensive metabolisers, EMs) per CYP2D6.	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AX12	Trientina tetraidrocloridrato	os	RNRL	A-PHT		Indicato per il trattamento del morbo di Wilson in adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 5 anni intolleranti alla terapia con D-penicillamina	Hub: - Medicina Interna - Pediatria - Epatologia - Neurologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AX14	Migalastat	os	RRL	A-PHT		Trattamento a lungo termine negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni, con una diagnosi accertata di malattia di Fabry (carezza dell' α -galattosidasiA) e caratterizzati da una mutazione suscettibile	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
A16AX16	Givosiran	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento della porfiria epatica acuta (AHP) in adulti e adolescenti di età pari e superiore ai dodici anni.	Hub: - Medicina - Epatologia - Ematologia	
A16AX18	Lumasiran	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento dell'iperossaluria primitiva di tipo 1 (PH1) in tutte le fasce d'età	Hub: - Pediatria - Nefrologia - Endocrinologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
B	SISTEMA SANGUE ED EMOPOIESI							
B01AA03	Warfarin	os	RR	A		La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97		97

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AA07	Acenocumarolo	os	RR	A		La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97		97
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 295 del 19.12.2016	Legge 648/96
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB05	Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare	sc,ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 295 del 19.12.2016	Legge 648/96
B01AB05	Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare	sc,ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB05	Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare	sc,ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3) (Legge 648/96)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB06	Nadroparina Calcica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 295 del 19.12.2016	Legge 648/96
B01AB06	Nadroparina Calcica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB06	Nadroparina Calcica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB07	Parnaparina	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB07	Parnaparina	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Proflassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB08	Reviparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB08	Reviparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Proflassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3) (Legge 648/96)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB09	Danaparoid	ev	RR	H		Trattamento di disturbi tromboembolici in pazienti che necessitano di anticoagulazione parenterale urgente a causa dello sviluppo o di anamnesi di HIT	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
B01AB09	Danaparoid	ev	RR	H		Prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) in situazioni in cui non deve essere usata l'eparina, compresi pazienti con trombocitopenia indotta da eparina (HIT)	Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Interna - Chirurgia - Ematologia	
B01AB12	Bemiparina sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB12	Bemiparina sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Proflassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AC09	Epoprostenolo	ev	RRL	H			Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	
B01AC11	Iloprost Sale Di Trometamolo	ev	RRL	A-PHT		Ipertensione polmonare	Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ, GOM RC) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari) - Cardiologia Riabilitativa (AOU CZ) - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)	
B01AC22	Prasugrel	os	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Sindrome coronarica acuta	Hub e Spoke: - Cardiologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AC24	Ticagrelor	os	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	In associazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta (SCA) o storia di infarto miocardico (IM) ed un alto rischio di sviluppare un evento aterotrombotico	Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Interna - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	
B01AC25	Cangrelor	ev	OSP	H		In co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti adulti con cardiopatia coronarica sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI, percutaneous coronary intervention) che non hanno ricevuto un inibitore orale del recettore P2Y12 prima della procedura di PCI e nei quali la terapia con gli inibitori del recettore P2Y12 per via orale non è fattibile o auspicabile	Hub: - Cardiologia	
B01AC27	Selexipag	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in Classe Funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Pneumologia - Reumatologia	
B01AD02	Alteplase	ev	OSP	H			Hub e Spoke: - Neurologia - Cardiologia - Emodinamica	
B01AE07	Dabigatran etexilato	os	RRL	A	Sistema TS	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)	Indicazioni cardiologiche Hub e Spoke e Ospedale di Zona Montana: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)	97
B01AE07	Dabigatran etexilato	os	RRL	A	PT web-based AIFA	Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<u>Indicazioni non cardiologiche</u> Hub e Spoke: - Ortopedia <u>Per tutte le indicazioni</u> - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	97
B01AE07	Dabigatran etexilato	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Trattamento Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<u>Indicazioni non cardiologiche</u> Hub e Spoke: - Ortopedia <u>Per tutte le indicazioni</u> - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	97
B01AF01	Rivaroxaban	os	RRL	A	Sistema TS	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)	Indicazioni cardiologiche Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)	97

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AF02	Rivaroxaban	os	RRL	A		Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<u>Indicazioni non cardiologiche</u> Hub e Spoke: - Ortopedia <u>Per tutte le indicazioni</u> - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	97
B01AF03	Rivaroxaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Trattamento Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<u>Indicazioni non cardiologiche</u> Hub e Spoke: - Ortopedia <u>Per tutte le indicazioni</u> - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	97
B01AF02	Rivaroxaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei neonati a termine, nei lattanti e bambini piccoli, nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni dopo almeno 5 giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale		
B01AF02	Rivaroxaban	os	RRL	A-PHT		<ul style="list-style-type: none"> • 1 mg/ml - granuli per sospensione orale - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei neonati a termine, nei lattanti e bambini piccoli, nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale" • 15 mg - compressa rivestita con film - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso compreso tra 30 kg e 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale" • 20 mg - compressa rivestita con film - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso superiore a 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale" 	Hub e Spoke: - Pediatria - Cardiologia - Medicina Interna - Ematologia	
B01AF02	Apixaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97 Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)	Indicazioni cardiologiche Hub e Spoke e Ospedale di Zona Montana: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)	97
B01AF02	Apixaban	os	RRL	A-PHT		La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97 Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<u>Indicazioni cardiologiche</u> Hub e Spoke e Ospedale di Zona Montana: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) <u>Indicazioni non cardiologiche</u> Hub e Spoke: - Ortopedia <u>Per tutte le indicazioni</u> - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	
B01AF02	Apixaban	os	RRL	A-PHT		La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97 Trattamento Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)		

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AF03	Edoxaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV), con uno o più fattori di rischio, quali insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età > 75 anni, diabete mellito, precedente ictus o attacco ischemico transitorio (TIA).	<u>Indicazioni cardiologiche</u> Hub e Spoke e Ospedale di Zona Montana: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) <u>Indicazioni non cardiologiche</u> Hub e Spoke: - Ortopedia <u>Per tutte le indicazioni</u> - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	97
B01AF04	Edoxaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti.	<u>Indicazioni cardiologiche</u> Hub e Spoke e Ospedale di Zona Montana: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) <u>Indicazioni non cardiologiche</u> Hub e Spoke: - Ortopedia <u>Per tutte le indicazioni</u> - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona)	
B01AX07	Caplacizumab	ev	RRL	H		Trattamento negli adulti degli episodi di porpora trombotico-trombocitopenica (PTT) acquisita, in associazione a plasmateresi (plasma exchange, PE) e immunosoppressione.	Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
B02AB02	Alfa1-antitripsina	ev	RNRL	H		Terapia cronica sostitutiva in soggetti con carenza congenita di inibitore dell'alfa1-proteinasi	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
B02BD	Complesso Protrombinico Umano	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD01	Fattore IX, II, VII, X della coagulazione, prot. c, prot. s.	ev	OSP	H			Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD02	Efmoroctocog	ev	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.	Servizio trasfusionale di Emofilia/Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD02	Moroctocog Alfa - (Fattore VIII di Coagulazione, Ricombinante)	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD02	Octocog alfa	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD02	Fattore VIII Di Coagulazione Del Sangue Umano Liofilizzato	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD02	Turoctocog alfa	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD02	Turoctocog alfa pegol	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti a partire da 12 anni affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII).	Centri Emostasi e Trombosi (AO CS,AO CZ,GOM RC)	
B02BD02	Lonoctocog	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito del fattore VIII). Può essere utilizzato in pazienti di tutti i gruppi di età.	Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD02	Rurioctocog Alfa Pegol	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti dai 12 anni in poi affetti da emofilia A	Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
B02BD02	Damoctocog Alfa Pegol	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti dai 12 anni in poi affetti da emofilia A	Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
B02BD03	Complesso protrombinico attivato- fattore VIII	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	Fattore IX Di Coagulazione Del Sangue Umano Liofilizzato	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	nonacog beta pegilato - fattore IX di coagulazione ricombinante	ev	RR	A-PHT		Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti da 12 anni in su affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	Hub: - Centri di Emofilia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD04	Eftrenonacog	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	Servizio trasfusionale di Emofilia/Ematologia	
B02BD04	Albutrepenonacog alfa	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e la profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia B (carenza congenita di fattore IX); può essere usato per tutti i gruppi d'età.	Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	Albutrepenonacog alfa	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e la profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia B (carenza congenita di fattore IX); può essere usato per tutti i gruppi d'età.	Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	Nonacog gamma	ev	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX), adatto a pazienti di tutte le fasce di età.	Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD05	Fattore VII della coagulazione sangue umano liofilizzato	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD06	Fattore Von Willebrand umano	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD09	Nonacog alfa (Fattore IX di Coagulazione, Ricombinante)	ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B01BD11	Catridecacog	ev	OSP	H			Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD14	Susoctocog alfa	ev	OSP	H		Negli adulti per il trattamento degli episodi emorragici in pazienti con emofilia acquisita causata da anticorpi nei confronti del fattore VIII.	Hub: - Centri di Emofilia	
B02BX04	Romiplostim	sc	RR	H			Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011) Spoke: - Ematologia (KR) - Microcitemia (KR)	
B02BX05	Eltrombopag	ev,os	RR	H		Indicato in pazienti di età superiore ad 1 anno per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)	<u>Per indicazione adulti</u> Hub: - Ematologia (Rete Regionale Malattie Rrare) <u>Per indicazione pediatrica</u> Hub: - Oncoematologia Pediatrica (AO CS); - Ematologia Pediatrica (AO CZ, GOM RC)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BX05	Eltrombopag					Indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia - Oncoematologia - Centro Trapianti Midollo Osseo (GOM RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia (Rossano-Corigliano) - Oncologia (Rossano-Corigliano) - Ematologia-Microcitemia (PO KR) <p>(DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)</p>	
B02BX06	Emicizumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A severa (deficit congenito di fattore VIII, FVIII < 1%) senza inibitori del fattore VIII. Il farmaco può essere usato in tutte le fasce d'età	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centri Emostasi e Trombosi AO CS, AO CZ, GOM RC 	
B02BX07	Lusutrombopag	os	RNRL	H		Trattamento della trombocitopenia severa in pazienti adulti affetti da malattia epatica cronica sottoposti a procedure invasive	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia - Medicina Interna - Gastroenterologia <p>Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)</p>	
B02BX08	Avatrombopag	os	RR	H		Trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) primaria cronica nei pazienti adulti refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline)	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia <p>Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)</p>	
B02BX08	Avatrombopag	os	RR	H		Trattamento della trombocitopenia grave, nei pazienti adulti con malattia epatica cronica (CLD) e programmati per essere sottoposti a una procedura invasiva	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia - Medicina Interna - Gastroenterologia 	
B02BX09	Fostamatinib	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) cronica in pazienti adulti refrattari a trattamenti di prima linea quali corticosteroidi e immunoglobuline in vena e refrattari o che presentino controindicazioni ad almeno uno tra tpora e rituximab	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia <p>Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)</p>	
B03AC	Derisomaltosio ferrico	ev	OSP	H		Indicato negli adulti per il trattamento della carenza di ferro nelle seguenti condizioni: - quando le preparazioni di ferro per via orale sono inefficaci o non possono essere utilizzate; - quando vi è l'esigenza clinica di somministrare ferro rapidamente.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
B03XA01	Eritropoietina alfa originator e biosimilare	ev,sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA01	Eritropoietina beta	ev,sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hube Spoke: - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodioalisi	
B03XA01	Eritropoietina zeta	ev,sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hube Spoke: - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodioalisi	
B03XA01	Eritropoietina teta	ev,sc	RNRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodioalisi	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA02	Darbepoietina Alfa	ev,sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodioalisi 	
B03XA03	Metossipolietilenglicole-epoetina beta	ev,sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodioalisi 	
B03XA06	Luspatercept	sc	RNRL	A	PT web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente dovuta a sindrome mielodisplastica (SMD) a rischio molto basso, basso e intermedio, che presentano sideroblasti ad anello con risposta insoddisfacente o non idonei a terapia basata su eritropoietina.	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia - Oncologia <p>(DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microcitemia (GOM RC) - Ematocologia pediatrica (AO CZ) - SOC Medicina Generale - Unità Funzionale Multidisciplinare per la Talassemia (PO Locri-ASP RC) - Centro Emostasi e Trombosi (AO CS) 	
B03XA06	Luspatercept	sc	RNRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente, associata a beta-talassemia.	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia - Oncologia <p>(DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Microcitemia (GOM RC) - Ematocologia pediatrica (AO CZ) - SOC Medicina Generale - Unità Funzionale Multidisciplinare per la Talassemia (PO Locri-ASP RC) - Centro Emostasi e Trombosi (AO CS) 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B05AA01	Albumina Umana Soluzione	ev	RR	A/C	Scheda Regionale DCA Nota 15	In seguito a paracentesi evacuativa nella cirrosi epatica grave	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terapia Intensiva - Rianimazione - Chirurgia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Ematologia - Oncologia - Ginecologia - Cardiologia - Malattie infettive - Pneumologia - Servizi trasfusionali - Geriatria - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi <p>- Medicina (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC - Nota prot. n. 427568 del 29/12/2020)</p>	15
B05AA01	Albumina Umana Soluzione	ev	RR	A/C	Scheda Regionale DCA Nota 15	Grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento, non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terapia Intensiva - Rianimazione - Chirurgia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Ematologia - Oncologia - Ginecologia - Cardiologia - Malattie infettive - Pneumologia - Servizi trasfusionali - Geriatria - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi <p>- Medicina (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC - Nota prot. n. 427568 del 29/12/2020)</p>	15
B06AC01	Inibitore umano della C1-esterasi	ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B06AC01	Inibitore umano della C1-esterasi	ev,sc	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Prevenzione degli attacchi di angioedema ereditario (HAE) ricorrenti negli adolescenti e negli adulti con deficit di inibitore della C1-esterasi	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
B06AC02	Icatibant acetato	sc	RR	H		Indicato per la terapia sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario (AEE) negli adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni, con carenza di inibitore esterasi C1	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
B06AC05	Lanadelumab	sc	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA			
B06AX01	Crizanlizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Prevenzione delle crisi vasoocclusive (vaso occlusive crises - VOC) ricorrenti nei pazienti con malattia a cellule falciformi di età uguale e superiore a 16 anni. Può essere somministrato come terapia aggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come monoterapia in pazienti per i quali il trattamento con HU/HC è inappropriato o inadeguato	Hub: - Ematologia - Pediatria - Centri Emostasi e Trombosi Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
C	SISTEMA CARDIOVASCOLARE							
C01BD07	Dronedarone	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Indicato per il mantenimento del ritmo sinusale a seguito di cardioversione con esito soddisfacente in pazienti adulti clinicamente stabili con fibrillazione atriale (FA) parossistica o persistente. Dato il suo profilo di sicurezza deve essere prescritto solo dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento	Hub e Spoke: - Cardiologia - Cardiocirurgia - Medicina e Chirurgia d'accettazione urgenza (MCAE)	
C01EB18	Ranolazina	os	RR	A-PHT		Indicato negli adulti come terapia aggiuntiva nel trattamento sintomatico dei pazienti con angina pectoris stabile non adeguatamente controllati con le terapie antianginose di prima linea, come i betabloccanti e/o i calcioantagonisti, o che non le tollerano	Hub e Spoke: - Cardiologia - Geriatria - Medicina Generale Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Geriatria - Medicina Interna	
C01EB21	Regadenoson	ev	OSP	C		Medicinale solo per uso diagnostico. Vasodilatatore coronarico selettivo da utilizzarsi negli adulti come agente per stress farmacologico per: • l'imaging di perfusione miocardica (myocardial perfusion imaging, MPI) con radionuclidi in pazienti incapaci di sottoporsi a un adeguato sforzo fisico. • la misurazione della riserva frazionale di flusso (FFR) di una singola stenosi dell'arteria coronaria durante l'angiografia coronarica invasiva, quando non sono previste misurazioni ripetute dell'FFR	Hub e Spoke: - Medicina Nucleare	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		Ipertensione Arteriosa	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (AO CS, AO CZ , GOM RC, AOU CZ) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) - Medicina Generale (AO CZ) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari, Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) 	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		Sclerodermia	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale 	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		Ulcere digitali	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale 	
C02KX02	Ambrisentan	os	RRL	A-PHT		Ipertensione Arteriosa	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (AO CS, AO CZ , GOM RC, AOU CZ) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari, Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) 	
C02KX02	Ambrisentan	os	RRL	A-PHT		Sclerodermia	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale 	
C02KX04	Macitentan	os	RRL	A-PHT		Ipertensione Arteriosa	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (AO CS, AO CZ , GOM RC, AOU CZ) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari, Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) 	
C02KX05	Riociguat	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Pneumologia - Cardiocirurgia - Reumatologia (GOM RC) 	
C03XA01	Tolvaptan	os	RNRL	A-PHT/H	Scheda multifarmaco semplificata AIFA	Indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 2 a 4 precoce (GFR ₂₅ mL/min) all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione.	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nefrologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C07AA05	Propranololo Cloridrato	os	RR/RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Pediatria - Neonatologia - Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Vascolare - Dermatologia - Cardiologia Pediatrica - Chirurgia Plastica	
C07AB14	Landiololo Cloridrato	ev	OSP	C		Tachicardia sopraventricolare e per il rapido controllo della frequenza ventricolare in pazienti con fibrillazione atriale o flutter atriale in circostanze perioperatorie, postoperatorie o di altro genere, dove si giudichi necessario il controllo a breve termine della frequenza ventricolare con un farmaco di breve durata d'azione.	Hub e Spoke: -Cardiologia	
C07AB14	Landiololo Cloridrato	ev	OSP	C		Tachicardia sinusale non compensatoria laddove, secondo il giudizio del medico, la frequenza cardiaca accelerata richieda un intervento specifico	Hub e Spoke: -Cardiologia	
C08CA16	Clevidipina	ev	OSP	H		Indicato per la rapida riduzione della pressione arteriosa durante la fase perioperatoria	Hub e Spoke: - Cardiologia interventistica - Cardiocirurgia	
C09DX04	Sacubitril/valsartan	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Cardiologia - Geriatria	
C10AA01	Simvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AA02	Lovastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AA03	Pravastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AA04	Fluvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AA05	Atorvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AA07	Rosuvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AB02	Bezafibrato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AB04	Gemfibrozil	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AB05	Fenofibrato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AX06	Omega 3 trigliceridi inclusi altri esteri ed acidi	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AX09	Ezetimibe	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13-94			13
C10AX12	Lomitapide	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Endocrinologia - Medicina Generale	
C10AX13	Evolocumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	In adulti con ipercolesterolemia primaria (familiar eterozigote o non familiare) con dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: • in associazione con una statina a una statica con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per il colesterolo trasportato dalle lipoproteine a bassa densità (LDL-C) con la dose massima tollerata di statine • in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso di statine è controindicato.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia - Diabetologia	
C10AX14	Alirocumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	In adulti con ipercolesterolemia primaria (familiar eterozigote o non familiare) con dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: • in associazione con una statina a una statica con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per il colesterolo trasportato dalle lipoproteine a bassa densità (LDL-C) con la dose massima tollerata di statine • in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso di statine è controindicato.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia - Diabetologia	
C10AX16	Inclisiran	sc	RRL	A	Registro web-based AIFA	Indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: in associazione a una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per l'LDL-C con la dose massima tollerata di una statina, oppure: in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata	Hub, Spoke: - Cardiologia - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AX16	Inclisiran	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: in associazione a una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per l'LDL-C con la dose massima tollerata di una statina, oppure: in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata	Hub, Spoke: - Cardiologia - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia	
C10AX18	Volanesorsen	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato come coadiuvante della dieta in pazienti adulti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare (FCS) confermata geneticamente e ad alto rischio di pancreatite, in cui la risposta alla dieta e alla terapia di riduzione dei trigliceridi è stata inadeguata	Hub: - Medicina Interna - Endocrinologia	
C10AB05	Atorvastatina/Ezetimibe	os	RR	A/C	Scheda Regionale DCA Nota 13-94	<u>Classe A:</u> In aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in pazienti adulti per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, incluso l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista), già adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi		13
D	DERMATOLOGICI							
D03BA	Enzimi proteolitici	loc	OSP	H		Rimozione dell'escara in ustioni profonde a spessore parziale o completo	Centro Grandi Ustionati	
D06BB10	Imiquimod 5%	loc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Ginecologia - Oncologia - Dermatologia	
D06BB10	Imiquimod 3,75%	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95
D06BX03	Tirbanibulina	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	Trattamento cutaneo della cheratosi attinica, non ipercheratosica, non ipertrofica (Olsen di grado 1) del viso o del cuoio capelluto, negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95
D07AB19	Desametasone	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AC01	Betametasone Valerato	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AC06	Diflucortolone Valerato	loc	RR	C/A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AC14	Metilprednisolone Aceponato	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D07AD01	Clobetasolo Propionato	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AD02	Alcinonide	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D11AH01	Tacrolimus	loc	RRL	H ? PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
D11AH08	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, negli adulti eleggibili per la terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Allergologia	
D11AH05	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni eleggibili per la terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Allergologia - Pediatria	
D11AH09	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	Dermatite atopica bambini di età compresa tra 6 e 11 anni eleggibili per la terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Allergologia - Pediatria	
D11AH06	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	PT cartaceo AIFA	Indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni come trattamento aggiuntivo di mantenimento per l'asma grave con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli eosinofili ematici e/o del FeNO, non adeguatamente controllati con ICS (corticosteroidi per via inalatoria) a dosaggio alto e un altro prodotto medicinale per il trattamento di mantenimento	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria U.O. Medicina Interna, Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena -ASP Reggio Calabria	
D11AH07	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	PT cartaceo AIFA	Indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP grave per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non fornisce un controllo adeguato della malattia	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Allergologia - ORL	
D11AH07	Tralokinumab	sc	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in adulti che sono candidati alla terapia sistemica	Hub, Spoke: - Dermatologia	
D11AX18	Diclofenac in ialuronato	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto Per localizzazioni al tronco e/o al cuoio capelluto	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95
D11AX19	Alitretionina	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Eczema cronico severo	Hub e Spoke: - Dermatologia	
G	SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI							

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G02AD06	Misoprostolo	vag/os	OSP	C		Indicato per l'induzione del travaglio	Hub, Spoke: - Ostetricia - Ginecologia	
G02CB03	Cabergolina	os	RNR	A			Ambulatori specialistici territoriali: - Geriatria - Neurologia - Neuropsichiatria - Psichiatria	
G03BA03	Testosterone (enantato/undecanoato)	os,im,loc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	ipogonadismi maschili primitivi e secondari caratterizzati da ridotte concentrazioni di testosterone totale (< 12 nmoli/L o 350 ng/dL) in presenza di sintomi tipici (riduzione del desiderio e potenza sessuale, osteoporosi, riduzione forza muscolare, obesità viscerale, alterazioni del tono dell'umore)	<u>Testosterone os e im</u> Hub e Spoke: - Endocrinologia - Pediatria - Medicina generale - Urologia - Andrologia - Fisiopatologia della riproduzione (A.O. Cosenza)	36
G03BA03	Testosterone (enantato/undecanoato)	os,im,loc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<u>Testosterone loc</u> - Endocrinologia - Urologia - Andrologia	
G03BB01	Mesterolone	os	RNRL	C			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Urologia	
G03GA02	Menotropina	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 MUI/ML Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari Centro di procreazione medicalmente assistita di Tiriolo (CZ) - Urogyn Biotec Sri (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA04	Urofollitropina	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 MUI/ML Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari Centro di procreazione medicalmente assistita di Tirolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ginecologia Andrologia Urologia Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ 	74
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 MUI/ML Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari Centro di procreazione medicalmente assistita di Tirolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ginecologia Andrologia Urologia Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ 	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA06	Follitropina beta	im	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 Mui/ML • Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. • Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari - Centro di procreazione medicalmente assistita di Tirolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ 	74
G03GA07	Lutropina alfa	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 Mui/ML • Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari - Centro di procreazione medicalmente assistita di Tirolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ 	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA08	Coriogonadotropin alfa	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 MUI/ML Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari Centro di procreazione medicalmente assistita di Tirolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ginecologia Andrologia Urologia <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA09	Corifollitropina alfa	sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 MUI/ML Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari Centro di procreazione medicalmente assistita di Tirolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ginecologia Andrologia Urologia <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA10	Follitropina delta	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> • Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 MUI/ML • Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mIU/ml. • Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari - Centro di procreazione medicalmente assistita di Tirolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ 	74
G03GA10	Follitropina delta	sc	RRL	A-PHT		<p>Stimolazione ovarica controllata per lo sviluppo di follicoli multipli nelle donne sottoposte a tecniche di riproduzione assistita (assisted reproductive technologies,ART), come la fecondazione in vitro (in vitro fertilisation, IVF) o un ciclo di iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (intracytoplasmic sperm injection, ICSI).</p>	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA30	Follitropina alfa/Lutropina alfa	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	<ul style="list-style-type: none"> Trattamento dell'infertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al terzo giorno del ciclo, non superiori a 30 MuI/ML Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml. Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente 	<p>Centri di I e II livello, pubblici, censiti sul Registro Nazionale di Procreazione Medicalmente Assistita come da DCA 164/2018 e nota regionale prot. n. 427568 del 29.12.2020</p> <p><u>CENTRI I LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - A.O. CS C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione di Castrovillari Centro di procreazione medicalmente assistita di Tiriolo (CZ) - Urogyn Biotec Srl (CZ) <p><u>CENTRI II LIVELLO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> LIFELAB Studio medico specialistico di produzione medicalmente assistita e andrologia - Gatjc Sas – Gioia Tauro (RC) Centro di Medicina della Riproduzione NAUSICAA Montauro (CZ) - C.I.S. Medicina della Riproduzione (Lamezia Terme) <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ginecologia Andrologia Urologia Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ 	74
G03GA30	Follitropina alfa/Lutropina alfa	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento dell'infertilità maschile maschile: in maschi con ipogonadismo- ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali o comunque con FSH non superiore a 8 mUI/ml.		
G03GA30	Follitropina alfa/Lutropina alfa	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Preservazione della fertilità femminile: in donne di età non superiore ai 45 anni affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a terapie oncologiche in grado di causare sterilità transitoria o permanente		
G03XB02	Ulipristal	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento intermittente (fino a un max di 4 cicli) dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva. Durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e resezione di setti endouterini per via isteroscopica	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ginecologia Oncologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ginecologo 	51
G03XB02	Ulipristal	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento pre-operatorio di sintomi, da moderati a gravi, di fibromi uterini		
G03XC01	Raloxifene	os	RR	A		<p>Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche</p> <p>Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura</p>	<p>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medicina Generale Geriatra Ortopedia Reumatologia Ginecologia Endocrinologia Recupero e Riabilitazione Funzionale Nefrologia 	79
G03XC02	Bazedoxifene	os	RR	A		<p>Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche</p> <p>Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura</p>	<p>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> Medicina Generale Geriatra Ortopedia Reumatologia Ginecologia Endocrinologia Recupero e Riabilitazione Funzionale Nefrologia 	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BD04	Oxibutinina Cloridrato	os	RR	A		Incontinenza urinaria da urgenza	Hub, Spoke: - Urologia - Pediatría - Neurologia - Oncologia	87
G04BE01	Alprostadil	intracaver	RNR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di alprostadil per iniezione intracavernosa a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da lesioni complete del midollo spinale, e ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico qualora vi sia mancata risposta, intolleranza o contro-indicazione agli inibitori della PDE5, secondo un piano terapeutico redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ, GOM RC) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari) Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	75
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di inibitori della PDE5 a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ, GOM RC) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari) Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	75
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare	Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC) - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare	Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC) - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE08	Tadalafil	os	RRL/RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di inibitori della PDES a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ GOM RC) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari) Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	75
G04BE08	Tadalafil	os	RRL/RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare	Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC) - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	
G04BE08	Tadalafil	os	RRL/RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare	Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC) - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	
G04BE09	Vardenafil cloridrato triidrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di inibitori della PDES a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia Hub: - Cardiologia (AO CS, AO CZ GOM RC) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari) Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	75
G04BE10	Avanafil	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di inibitori della PDES a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia	75
H	PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI							

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H01AC01	Somatropina	im,sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	https://www.aifa.gov.it/nota-39	Hub: - Diabetologia (AO CZ, AO RC) - Endocrinologia (AO CZ, AOU CZ, AO RC) - Pediatria (AO CS, AOU CZ, AO RC) Spoke: - Pediatria (PO KR) - PO Locri - PO Castrovillari - PO Lamezia Terme - PO Paola/Cetraro - PO Corigliano/Rossano	39
H01AX01	Pegvisomant	sc	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Endocrinologia	
H01BA01	Argipressina	ev	OSP	C		Indicato per il trattamento dell'ipotensione refrattaria alle catecolamine conseguente a shock settico in pazienti di età superiore ai 18 anni. È presente un'ipotensione refrattaria alle catecolamine se la pressione arteriosa media non può essere stabilizzata ai valori ottimali nonostante un adeguato reintegro del volume e la somministrazione di catecolamine	Hub e Spoke: - Cardiologia	
H01BA02	Desmopressina Acetato	os,ev,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke: - Emodialisi - Ematologia - Servizi Trasfusionali	
H01CA01	Gonadorelina	ev,sc	RR	C			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Pediatria - Urologia - Andrologia	
H01CA01	Gonadorelina	nas	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Pediatria - Urologia - Andrologia	
H01CB02	Octreotide Acetato	sc,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Oncologia - Ematologia - Pediatria	
H01CB03	Lanreotide Acetato	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Oncologia - Ematologia - Pediatria	
H01CB05	Pasireotide	sc	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Malattia di Cushing	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Neurologia - Medicina Interna	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H02AB09	Idrocortisone Emisuccinato Sodico	os,im,ev	RRL/RR	A-PHT/C		Indicato per l'insufficienza surrenalica nei bambini da 0 a 18 anni	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Pediatria	
H05AA02	Teriparatide	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
H05BX01	Cinacalcet	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Endocrinologia - Nefologia - Emodialisi	
H05BX02	Paracalcitolo	ev,os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Prevenzione e trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti e pediatrici di età compresa tra i dieci e i sedici anni associato a malattia renale cronica negli stadi 3 e 4 e per la prevenzione ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti associato a malattia renale cronica di stadio 5 in pazienti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Endocrinologia - Nefologia - Emodialisi	
H05BX04	Etelcalcetide	ev	RRL	A-PHT		Trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (SHPT) in pazienti adulti con malattia renale cronica (CKD) in emodialisi.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Nefrologia - Dialisi	
J	ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO							
J01CA10	Mezlocillina Sodica Monoidrata	im	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01CA12	Piperacillina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01CA12	Piperacillina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		
J01CE08	Benzilpenicillina Benzatinica	im	RR	A-PHT		Profilassi della malattia reumatica in soggetti con infezioni delle prime vie respiratorie sostenute da streptococchi del gruppo A. Profilassi delle recidive della malattia reumatica Sifilide	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: -Malattie Infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatra - Urologia	92

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01CE08	Benzilpenicillina Benzatinica	im	RR	A-PHT		Profilassi delle recidive delle ammalattie reumatiche	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: -Malattie Infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatra - Urologia	92
J01CE09	Benzilpenicillina Benzatinica	im	RR	A-PHT		Sifilide	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: -Malattie Infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatra - Urologia	92
J01CR01	Ampicillina/Sulbactam	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01CR05	Piperacillina Sodica/Tazobactam Sodico	ev,im	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DD02	Ceftazidima	im,ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H		In adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 3 mesi per il trattamento delle seguenti infezioni: • infezione intra-addominale complicata (cIA) • Infezione complicata del tratto urinario (cUTI), inclusa pielonefrite polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)	Hub e Spoke: - Malattie Infettive (specialista con competenze infettivologiche identificate dal CIO)	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda cartacea AIFA	Trattamento di pazienti adulti con batteriemia che si verifica in associazione, o si sospetta sia associata, a una delle infezioni sopra elencate	Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda cartacea AIFA	Trattamento di pazienti adulti con batteriemia che si verifica in associazione, o si sospetta sia associata, a una delle infezioni sopra elencate	Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda cartacea AIFA	Trattamento di infezioni intraddominale complicata	Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda cartacea AIFA	Polmonite acquisita in ospedale	Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda cartacea AIFA	Trattamento di infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 3 mesi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate	Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DE01	Cefepime Dicloridrato Monoidrato	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DF01	Aztreonam	inal	RNRL	C		La prescrizione a carico del SSN è limitata: al trattamento iniziato in ambito ospedaliero La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche		56
J01DH51	Imipenem + Cilastatina	ev,im	OSP	C/H		La prescrizione a carico del SSN è limitata: al trattamento iniziato in ambito ospedaliero La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche al trattamento iniziato in ambito ospedaliero		56
J01DH52	Meropenem/vaborbactam	ev	OSP	H		Trattamento di pazienti adulti con accertate o sospette gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE): infezione accertata del tratto urinario complicata (cUTI), compresa pielonefrite; infezione accertata o sospetta intra-addominale complicata (cIAI); polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione (VAP) accertata o sospetta; batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate; trattamento di infezioni accertate dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DH56	Imipenem/cilastatina/relebactam	ev	OSP	H		Indicato nel: - Trattamento della polmonite acquisita in ospedale (HAP), compresa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), negli adulti; - Trattamento della batteriemia che si manifesta in associazione o che si sospetta sia associata a HAP o VAP, negli adulti; - Trattamento delle infezioni causate da organismi aerobi Gram-negativi negli adulti con opzioni di trattamento limitate	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J01DH56	Imipenem/cilastatina/relebactam	ev	OSP	H		La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J01DI01	Ceftobiprololo	ev	OSP	H		Polmonite acquisita in ospedale (HAP) esclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J01DI01	Ceftobiprololo	ev	OSP	H		Polmonite acquisita in comunità	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J01DI04	Cefiderocol	ev	OSP	H		Indicato per il trattamento delle infezioni dovute a organismi aerobi gram-negativi negli adulti con opzioni terapeutiche limitate	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)	Hub e Spoke: - Malattie Infettive (specialista con competenze infettivologiche identificato dal CIO)	
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		Trattamento delle seguenti infezioni negli adulti: 1- Infezioni intra-addominali complicate con eziologia documentata/sospetta da batteri Gram- negativi, resistenti ai trattamenti di prima linea	Hub e Spoke: - Malattie Infettive (specialista con competenze infettivologiche identificato dal CIO)	
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		Pielonefrite acuta eziologia documentata/sospetta batteri Gram-negativi, resistenti trattamenti di prima linea.	Hub e Spoke: - Malattie Infettive (specialista con competenze infettivologiche identificato dal CIO)	
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		Infezioni complicate del tratto urinario con eziologia documentata/sospetta da batteri gram-negativi, resistenti ai trattamenti di prima linea.	Hub e Spoke: - Malattie Infettive (specialista con competenze infettivologiche identificato dal CIO)	
J01GB01	Tobramicina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB01	Tobramicina	im,ev	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Malattie infettive - Medicina generale - Pediatria - Pneumologia - Centri Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01GB03	Gentamicina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB06	Amikacina Solfato	im,ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB07	Netilmicina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01XA02	Teicoplanina	im,ev	RR	A		La prescrizione a carico del SSN è limitata: al trattamento iniziato in ambito ospedaliero La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche		56
J01XA04	Dalbavancina	ev	OSP	H		Negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI)	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J01XA05	Oritavancina	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Indicato per il trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J01XB01	Colistimetato Sodico	im,ev,inal	RNR	C			Centro Regionale Fibrosi Cistica	
J01XX01	Fosfomicina Sale Di Trometamolo	os	RR	A/C		Trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini, neonati inclusi: • osteomielite • infezioni complicate delle vie urinarie • infezioni nosocomiali delle vie respiratorie inferiori • meningite batterica • batteriemia che si manifesta in associazione o che si ritiene eventualmente associata a una qualsiasi delle infezioni sopracitate	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J01XX01	Fosfomicina sodica	ev	OSP	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01XX08	Linezolid	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H			Hub e Spoke: - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia	
J01XX11	Tedizolid fosfato	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti. La rimborsabilità è limitata alle sole infezioni complicate della cute e dei tessuti molli quando si sospetta o si ha la certezza che l'infezione sia causata da batteri Gram positivi sensibili.	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J02AC03	Voriconazolo	os,ev	RNRL	A-PHT/H			Hub e Spoke: - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia	
J02AC04	Posaconazolo	os	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia	
J02AC05	Isavuconazolo	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Ematologia	
J04AB04	Rifabutina	os	RR	A		La prescrizione a carico del SSN è limitata: al trattamento iniziato in ambito ospedaliero La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche	Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Pneumologia	56
J04AK05	Bedaquiline	os	RNRL	H		Tubercolosi polmonare multiresistente quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità	Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Pneumologia	
J04AK06	Delamanid	os	RNRL	H		Opportuna terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistenti ai farmaci nei pazienti adulti quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità	Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Pneumologia	
J04AK08	Pretomanid	os	RNRL	H		Indicato in combinazione con bedaquiline e linezolid, negli adulti, per il trattamento della tubercolosi (TB) polmonare a estesa farmacoresistenza (extensively drug resistant, XDR) o intollerante al trattamento o multifarmacoresistente (multidrug-resistant, MDR) non responsiva.	Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Pneumologia	
J05AB01	Aciclovir	os,ev	RR/OSP	A/H		Virus Herpes simplex Virus varicella-zoster (VZV) La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.		84

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AB09	Famciclovir	os	RR	A		Virus Herpes simplex Virus varicella-zoster (VZV) La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.		84
J05AB11	Valaciclovir (cloridrato)	os	RR	C/A-PHT		Virus Herpes simplex Virus varicella-zoster (VZV) La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.		84
J05AB14	Valganciclovir (cloridrato)	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di induzione e mantenimento della retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti con sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie Infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia	
J05AB14	Valganciclovir (cloridrato)	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Prevenzione della malattia da CMV in adulti e bambini (dalla nascita ai 18 anni di età) negativi al CMV, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie Infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia	
J05AB14	Valganciclovir (cloridrato)	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Estensioni Legge 648/96: trattamento "pre-emptive" dell'infezione da CMV in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie Infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia	
J05AB15	Brivudina	os	RR	A		Virus Herpes simplex Virus varicella-zoster (VZV) La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.		84
J05AE01	Saquinavir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AE03	Ritonavir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV	
J05AE07	Fosamprenavir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AE08	Atazanavir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AE09	Tipranavir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AE10	Darunavir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AF01	Zidovudina	os,ev	RNRL	A/H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AF05	Lamivudina	os	RR/RNRL	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico	HBV	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: AOU CZ - Malattie Infettive - Epatologia - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale AO CS - Gastroenterologia - Malattie Infettive AO CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive GOM RC - Malattie Infettive ASP KR - Medicina Generale - Malattie Infettive ASP CZ - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato ASP VV - Malattie Infettive	
J05AF06	Abacavir Solfato	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AF07	Tenofovir Disoproxil	os	RNRL	H			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie Infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV	
J05AF08	Adefovir Dipivoxil	os	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Malattie Infettive DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV	
J05AF09	Emtricitabina	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AF10	Entecavir	os	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Malattie infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia	
J05AF11	Telbivudina	os	RNRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Malattie infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia	
J05AF13	Tenofovir alafenamide fumarato	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	HBV in adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg).	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AJ01	Raltegravir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AJ03	Dolutegravir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AJ04	Cabotegravir	os, ev	RNRL	H		HIV	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AG01	Nevirapina	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AG03	Efavirenz	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AG04	Etravirina	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AG05	Rilpivirina	os/*ev	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AG05	Rilpivirina	os/*ev	RNRL	H		HIV	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AG06	Doravirina	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive</p>	
J05AP01	Ribavirina	os,inal	RNRL	A		HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: AOU CZ - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale AO CS - Gastroenterologia - Malattie Infettive AO CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive GOM RC - Malattie Infettive ASP KR - Medicina Generale - Malattie Infettive ASP CZ - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato ASP VV - Malattie Infettive</p>	
J05AP09	Sofosbuvir	os	RNRL	C	Registro web-based AIFA	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: AOU CZ - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale AO CS - Gastroenterologia - Malattie Infettive AO CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive GOM RC - Malattie Infettive ASP KR - Medicina Generale - Malattie Infettive ASP CZ - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato ASP VV - Malattie Infettive</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP09	Dasabuvir	os	RNRL	A		HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AP54	Elbasvir/Grazoprevir	os	RNRL	A	Registro web-based AIFA	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP55	Sosfosbuvir/Velpatasvir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AP56	Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP57	Glecaprevir/Pibrentasvir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AR01	Lamivudina/Zidovudina	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AR02	Abacavir/Lamivudina	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AR04	Abacavir/Lamivudina/Zidovudina	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AR06	Emtricitabina/Efavirenz/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AR08	Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AR09	Cobocistat/Elvitegravir/Emtricitabina/tenofovir	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AR10	Lopinavir/Ritonavir	os	RNRL	H		HIV	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR13	Abacavir/Dalutegravir/Lamivudina	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR14	Cobicistat/Darunavir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR15	Atazanavir/Cobicistat	os	RNRL	H		In associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di soggetti adulti infetti da HIV-1 senza mutazioni note associate a resistenza ad atazanavir.	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR17	Emtricitabina/tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		In associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1).	Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AR18	Cobicista/emtricitabina/Elvitegravir/tenofovir alafenamide	ev	RNRL	H		Trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) infetti da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza alcuna mutazione nota associata a resistenza alla classe degli inibitori dell'Integrasi, a emtricitabina o a tenofovir.	Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AR19	Rilpivirina/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		Trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza alcuna mutazione nota associata a resistenza alla classe degli inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI), a tenofovir o a emtricitabina e con una carica virale \leq 100.000 copie/mL di HIV-1 RNA.	Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AR20	Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		Trattamento degli adulti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza evidenza presente o passata di resistenza virale alla classe degli inibitori dell'integrasi, a emtricitabina o a tenofovir	Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AR21	Dolutegravir/Rilpivirina	os	RNRL	H		Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti in soppressione virologica (HIV-1 RNA $<$ 50 copie/ml), in un regime antiretrovirale stabile da almeno sei mesi, con nessuna storia di fallimento virologico e con nessuna resistenza nota o sospetta a qualsiasi inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa o inibitore dell'integrasi.	Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AR22	Cobicistat/Darunavir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg).	Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AR24	Doravirina/Lamivudina/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H		Trattamento di adulti con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI, lamivudina o tenofovir	Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AR25	Dolutegravir/Lamivudina	os	RNRL	H		trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 HIV-1), negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 40 kg, con nessuna resistenza nota o sospetta verso la classe degli inibitori dell'integrasi o verso lamivudina	Hub e Spoke: Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX07	Enfuvirtide	sc	RNRL	H			Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AX09	Maraviroc	os	RNRL	H			Hub e Spoke: Malattie infettive	
J05AX14	Daclatasvir	os	RNRL	A		HCV	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: AOU CZ - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale AO CS - Gastroenterologia - Malattie Infettive AO CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive GOM RC - Malattie Infettive ASP KR - Medicina Generale - Malattie Infettive ASP CZ - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato ASP VV - Malattie Infettive	
J05AX18	Letermovir	os,ev	RRL/OSP	A-PHT/H	Registro web-based AIFA	Profiliassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: -Malattie infettive - Ematologia	
J05AX29	Fostemsavir	os	RNRL	H		Indicato in associazione con altri antiretrovirali, per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 resistente a molti farmaci, per i quali non è altrimenti possibile stabilire un regime antivirale soppressivo	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX65	Ledipasvir/Sofosbuvir	os	RNRL	C		HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p>	
J06BA01	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Extravascolare	sc	RNRL	H		Immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti con infezioni severe o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace e documentato difetto di anticorpi specifici (PSAF, proven specific antibody failure) o livello sierico di IgG < 4 g/l	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Malattie infettive - Ematologia 	
J06BA02	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Intravascolare	ev	OSP	H		<p>Terapia sostitutiva in pazienti adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni di età) per il trattamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della produzione di anticorpi. • Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC), ove gli antibiotici per uso profilattico abbiano fallito o siano controindicati. • Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM) . • Ipogammaglobulinemia in pazienti prima e dopo allotrapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT, hematopoieticstemcelltransplantation). 	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Malattie infettive - Ematologia 	
J06BA02	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Intravascolare	ev	OSP	H		Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP)	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neurologia 	
J06BA02	Immunoglobulina Umana ad alto titolo	ev	OSP	H		Poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP)	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Neurologia <p>Centro Regionale Malattie Rare</p>	
J06BB01	Immunoglobulina Umana Rho	ev,im	OSP/RR	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi Trasfusionali - Ematologia - Ginecologia 	
J06BC03	Palivizumab	im	RRL	A			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J06BD01	Bezlotoxumab	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Da solo o in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
L	FARMACI ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI							
L01AA05	Clormentina	cut, ev	RRL	H		Trattamento topico del linfoma cutaneo a cellule T tipo micosi fungoide (CTCL tipo-MF) in pazienti adulti	Hub: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale) - Dermatologia	
L01AX03	Temozolomide	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BA04	Pemetrexed	ev	OSP	H		Mesotelioma pleurico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BA04	Pemetrexed	ev	OSP	H		Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BB05	Fludarabina Fosfato	ev,os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e Ospedali Generali: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01BB07	Nelarabina	ev	OSP	H		indicata per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T-LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01BC06	Capecitabina	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BC07	Azacitidina	ev,im	OSP	H		Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con LMA con blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BC08	Decitabina	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LAM) "de novo" o secondaria in base alla classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard.	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01BC52	Fluorouracile/Acido Salicilico	cut	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01BC53	Tegafur/gimeracil/oteracil	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BC59	Trifluridina/tipiracil	os	RNRL	A-PHT		In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico coloretale (CRC), già precedentemente trattati o non considerati candidati per il trattamento con altre terapie disponibili, tra cui chemioterapia a base di fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-VEGF ed anti-EGFR	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BC59	Trifluridina/tipiracil	os	RNRL	A-PHT		In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma gastrico metastatico incluso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che sono stati precedentemente trattati con almeno due precedenti regimi di trattamento sistemico per malattia avanzata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CA04	Vinorelbina Bitartrato	ev,os	OSP/RNRL	A-PHT/H			Formulazione <u>os</u> Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia	
L01CA05	Vinflunina	ev	OSP	H		in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule transizionali del tratto uroteliale avanzato o metastatico dopo fallimento di un precedente regime contenente platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CD01	Paclitaxel	ev	OSP	H		Indicazioni oncologiche	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CD04	Cabazitaxel	ev	OSP	H		in combinazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CE01	Topotecan Cloridrato	ev/os	OSP/RNRL	H/A		indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante (SCLC) per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea	Formulazione <u>os</u> Hub e Spoke: - Oncologia	
L01CE02	Irinotecan Cloridrato Triidrato	ev	OSP	H		Trattamento dell'adenocarcinoma metastatico del pancreas	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CX01	Trabectedina	ev	OSP	H		indicato nel trattamento dei pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato dopo il fallimento della terapia con antracicline e ifosfamide o che non sono idonei a ricevere tali agenti. I dati sull'efficacia si basano soprattutto su pazienti con liposarcoma e leiomiomasarcoma	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CX01	Trabectedina	ev	OSP	H		In associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), è indicato per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01DB11	Pixantrone Dimaleato	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin (LNH) a cellule B aggressive, recidivati più volte o refrattari. Il beneficio del trattamento con pixantrone non è stato dimostrato quando è usato come chemioterapia in quinta linea o successiva, in pazienti refrattari all'ultima terapia.	Hub: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EA01	Imatinib	os	RNRL	A-PHT			Hub: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EA02	Dasatinib	os	RNRL	H		Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica di nuova diagnosi Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo e LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia Leucemia Mieloide Cronica in fase cronica o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EA03	Nilotinib	os	RNRL	H		Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica di nuova diagnosi	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EA04	Bosutinib	os	RNRL	H		Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica, in fase accelerata e in fase blastica trattati in precedenza con uno o più inibitori della Tirocinasi e per i quali l'imatinib, nilotinib e il dasatinib non sono considerate opzioni terapeutiche appropriate	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EA05	Ponatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica in fase cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), accelerata o blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EA05	Ponatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica in fase cronica con cromosoma Philadelphia	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EA05	Ponatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I.	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EB04	Osimertinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EB04	Osimertinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EB04	Osimertinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento adiuvante dopo resezione completa del tumore in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IB-IIIa il cui tumore presenta delezioni dell'esone 19 o mutazione sostitutiva dell'esone 21 (L858R) del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Dal 19/06/2013 (GU n. 129 del 4/6/2013) Zelboraf è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600. Dal 18/11/2015 (GU n. 256 del 3/11/2015) al 15/10/2016 Zelboraf è indicato in associazione con cobimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600, secondo la Legge 648/96. Il medicinale cobimetinib, associato a Zelboraf in regime 648/96, è concesso gratuitamente dall'azienda farmaceutica nell'ambito dell'uso compassionevole fino alla chiusura del trattamento. Dal 16/10/2016 (GU n. 230 del 01/10/2016) Cotellic è indicato in associazione a vemurafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	Indicato in associazione con cobimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600 (GU n.256 del 3/11/2015).	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC02	Dabrafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	Melanoma inoperabile o metastatico: Dabrafenib in monoterapia o in associazione con trametinib e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC02	Dabrafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento adiuvante del melanoma: Dabrafenib in associazione con trametinib è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600, dopo resezione completa.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC03	Encorafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in associazione con binimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC03	Encorafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in associazione con cetuximab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon retto (CRC) positivo alla mutazione BRAF V600E, che hanno ricevuto precedente terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED01	Crizotinib	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED03	Alectinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in stadio avanzato precedentemente trattati con crizotinib.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED03	Alectinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01ED05	Lorlatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è progredita dopo trattamento con alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi (TKI) ALK, oppure dopo trattamento con crizotinib e almeno un altro TKI ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EE01	Trametinib	os	RNRL	H		In associazione a dabrafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EE01	Trametinib					Trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600, dopo resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EF01	Palbociclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) - in associazione ad un inibitore dell'aromatasi - in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EF02	Ribociclib	os	RNL	H	Registro web-based AIFA	In associazione a un inibitore dell' aromatasi o a fulvestrant, e' indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), come terapia iniziale a base endocrina o in donne che hanno in precedenza ricevuto una terapia endocrina. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EH01	Lapatinib	os	RNRL	H		Carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EH03	Tucatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione a trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella localmente avanzato o metastatico HER2-positivo che abbiano ricevuto almeno 2 precedenti regimi di trattamento anti-HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EJ02	Fedratinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento della splenomegalia correlata alla malattia o dei sintomi in pazienti adulti con mielofibrosi primaria, mielofibrosi postpolicitemia vera o mielofibrosi post-trombocitemia essenziale che sono naive agli inibitori della chinasi Janus-associata (JAK) o che sono stati trattati con ruxolitinib	Hub e Spoke: - Ematologia - Medicina Interna - Geriatria	
L01EL02	Acalabrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) non trattata in precedenza.	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EL02	Acalabrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EL03	Zanubrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da macroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o come trattamento di prima linea per pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EM03	Alpelisib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in associazione a fulvestrant per il trattamento delle donne in post-menopausa, e degli uomini, affetti da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con mutazione di PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina come monoterapia	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EN02	Pemigatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di adulti affetti da colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico, con fusione o riarrangiamento del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), che ha manifestato una progressione dopo almeno una linea precedente di terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX05	Regorafenib	os	RNRL	A-PHT		Carcinoma metastatico del colon-retto	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX05	Regorafenib	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'epatocarcinoma (Hepato Cellular Carcinoma, HCC) precedentemente trattato con sorafenib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.		
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H		In monoterapia per il carcinoma a cellule renali avanzato (Renal Cell Carcinoma, RCC) in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia contro il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione a nivolumab, è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato in pazienti adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Cabozantinib	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma a cellule renali (RCC): in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) negli adulti che sono stati precedentemente trattati con sorafenib		
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H		In monoterapia per il carcinoma a cellule renali avanzato (Renal Cell Carcinoma, RCC) in pazienti adulti precedentemente trattati con terapia contro il fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H		Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell Carcinoma, RCC) avanzato: in adulti naïve al trattamento a rischio «intermediate o poor»	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX08	Lenvatinib	os	RNRL	H		Indicato negli adulti per il trattamento del carcinoma indifferenziato della tiroide (DTC)(follicolare, papillare, a cellule di Hurthle) progressivo, localmente avanzato o metastatico, refrattario allo iodio radioattivo (RAI)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX08	Lenvatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	indicato come monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (Hepatocellular Carcinoma, HCC) avanzato o non operabile negli adulti che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica		
L01EX09	Nintedanib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato negli adulti per il trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)	Hub: - Pneumologia - Medicina Interna - Ambulatorio di Insufficienza Respiratoria e Urgenze in Malattie Dell' Apparato Respiratorio (AOU CZ) - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Centro Regionale Fibrosi Cistica	
L01EX09	Nintedanib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in associazione con docetaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX09	Nintedanib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo	Hub e Spoke: - Pneumologia - Reumatologia - Immunologia - Medicina Interna	
L01EX12	Larotrectinib solfato	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi che presentano una fusione di geni del Recettore Tirosin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK), - che abbiano una malattia localmente avanzata, metastatica oppure nel caso in cui la resezione chirurgica possa determinare una severa morbidità - che non dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX13	Gilteritinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) recidivante o refrattaria che presentano una mutazione del gene FLT3.	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01EX14	Entrectinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dodici anni con tumori solidi che esprimono una fusione dei geni del recettore tirosin-chinasico neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia localmente avanzata, metastatica o la cui resezione chirurgica potrebbe comportare una severa morbidità e che non sono stati trattati in precedenza con un inibitore di NTRK, che non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti	Hub: - Oncologia (con i requisiti riportati in G.U. n. 214/2021)	
L01EX14	Entrectinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1- positivo non precedentemente trattati con inibitori di ROS1	Hub: - Oncologia (con i requisiti riportati in G.U. n. 214/2021)	
L01EX22	Selpercatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX22	Selpercatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Cancro della tiroide avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con sorafenib e/o lenvatinib;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FA01	Rituximab/Rituximab biosimilare	ev,sc	OSP	H		Indicazioni ematologiche	Hub: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FA01	Rituximab/Rituximab biosimilare	ev,sc	OSP	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni reumatologiche	Area Reumatologia Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia	
L01FA01	Rituximab/Rituximab biosimilare	ev,sc	OSP	H		Trattamento di pazienti con pemfigo volgare (PV) da moderato a grave	Hub: - Dermatologia	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con Lenalidomide e Desametasone, o bortezomib e Desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con Lenalidomide e Desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con bortezomib, melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con bortezomib, talidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FD02	Pertuzumab	ev	OSP	H		È indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FD02	Pertuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma mammario in fase iniziale. "Perjeta" è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato a metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento in monoterapia del carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento del carcinoma squamoso della testa e del collo ricorrente o metastatico negli adulti in progressione durante o dopo terapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e trattamento con brentuximab vedotin	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma dell'esofago istotipo squamoso, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico dopo precedente chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con Ipilimumab indicati per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile ad istologia non epitelioide	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti In associazione ad Ipilimumab è indicato, negli adulti, per il trattamento del melanoma metastatico in presenza di metastasi cerebrali asintomatiche o con PD-L1 < 1%	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma a cellule renali (RCC): in associazione a cabozantinib è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma del colon-retto (CRC) con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H): in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colonretto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastroesofagea (GEJ) o dell'esofago: in associazione a chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastro-esofagea o dell'esofago, HER2 negativo, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia nel Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico (cHL) recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e brentuximab vedotin (BV), o che non siano eleggibili al trapianto e abbiano fallito il trattamento con BV	Hub e Spoke: - Oncoematologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia nel trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 3 anni affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando ASCT non è un'opzione di trattamento.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia nel trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico negli adulti che hanno ricevuto una precedente chemioterapia contenente platino	Hub e Spoke: - Oncoematologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di prima linea del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti in associazione a carboplatino e paclitaxel o nabpaclitaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato negli adulti in associazione ad axitinib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia e' indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon-retto con elevata instabilita' dei microsatteliti (MSI-H, microsatellite instability-high) o con deficit di riparazione del mismatch (dMMR, mismatch repair deficient) negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia o in associazione a chemioterapia contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU), è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, metastatico o ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma al III Stadio e con coinvolgimento dei linfonodi che sono stati sottoposti a resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF04	Avelumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule di Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC) metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF04	Avelumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, UC) localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con carboplatino ed etoposide, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule; in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con Atezolizumab i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono essere stati sottoposti anche a terapia a bersaglio molecolare	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF06	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con nab-paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario triplo negativo (triple-negative breastcancer, TNBC) non resecabile localmente avanzato o metastatico i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 $\geq 1\%$ e che non sono stati sottoposti a precedente chemioterapia per malattia metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF07	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con bevacizumab, indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile non sottoposti a precedente terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF08	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia, indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) metastatico, i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 = 50% sulle cellule tumorali (TC) o = 10% sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore (IC) e sono negativi per mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con carboplatino ed etoposide, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule; in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con Atezolizumab i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono essere stati sottoposti anche a terapia a bersaglio molecolare	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare localmente avanzato o metastatico (laBCC o mBCC) la cui malattia è progredita o che sono intolleranti a un inibitore del pathway di Hedgehog (HHI)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Dermatologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) con espressione di PD-L1 (in $\geq 50\%$ delle cellule tumorali), senza aberrazioni EGFR, ALK o ROS1, che presentano: NSCLC localmente avanzato e non sono candidati per la chemioradioterapia definitiva, oppure NSCLC metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF07	Dostarlimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, con deficit del sistema di Mismatch Repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), progredito durante o dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FG01	Bevacizumab	ev	OSP	H		In associazione con paclitaxel e cisplatino o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere sottoposte a Terapia a base di platino, per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FG01	Bevacizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegfr	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
L01FG01	Bevacizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegfr	Edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a nivolumab e' indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a nivolumab e due cicli di chemioterapia a base di platino e' indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR o traslocazioni di ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione sono indicati per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile ad istologia non epitelioide	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma del colon-retto (CRC) con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H); in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colonretto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX05	Brentuximab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (SALCL)	Hub e Spoke: - Ematologia - Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX06	Brentuximab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in combinazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ in Stadio IV	Hub e Spoke: - Ematologia - Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX07	Brentuximab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da Linfoma cutaneo a cellule T (CTCL) CD30 positivo, sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica	Hub e Spoke: - Ematologia - Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX08	Elotuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX08	Elotuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con pomalidomide e desametasona per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due linee di terapia precedenti comprendenti lenalidomide e un inibitore del proteasoma e con progressione della malattia durante l'ultima terapia	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX09	Mogamulizumab	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da micosi fungoide (MF) o Sindrome di Sézary (SS) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia sistemica.	Hub: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX12	Tafasitamab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a lenalidomide, seguito da Tafasitamab in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario e non idonei a trapianto autologo di cellule staminali (Autologous Stem Cell Transplant, ASCT)	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX14	Polatuzumab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a bendamustina e rituximab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante/refrattario non candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX15	Belantamab Mafodotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo nei pazienti adulti, che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia risulta refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38 e che hanno mostrato progressione di malattia all'ultima terapia	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01FX17	Sacituzumab govitecan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01X	brexucabtagene autoleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (mantele cell lymphoma, MCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica che includano un inibitore della tirosinasi chinasi di Bruton (Bruton's tyrosine kinase, BTK)	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		Carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		Carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		Carcinoma gastrico metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC05	Gemtuzumab/Ozogamicin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione a terapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a 15 anni con leucemia mieloide acuta (LMA) CD33-positiva de novo, precedentemente non trattata, ad eccezione della leucemia promielocitica acuta (LPA)	Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XC06	Cetuximab	ev	OSP	H		carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC06	Cetuximab	ev	OSP	H		carcinoma a cellule squamose di testa e collo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC08	Panitumumab	ev	OSP	H		carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC09	Catumaxomab	ip	OSP	H		Trattamento peritoneale dell'ascite maligna in pazienti con carcinomi EpCAM-positivi quando la terapia standard non sia disponibile o non sia più attuabile	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC14	Trastuzumab Emtansine	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento adiuvante di pazienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2- positivo con malattia invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC14	Trastuzumab Emtansine	ev	OSP	H		In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, localmente avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano, somministrati separatamente o in associazione. I pazienti devono, o essere stati sottoposti in precedenza a terapia per la malattia localmente avanzata o metastatica, oppure aver sviluppato recidiva di malattia nel corso di o entro sei mesi dal completamento della terapia adiuvante	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Leucemia linfatica cronica (LLC)	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a Bendamustina, seguito da obinutuzumab in mantenimento è indicato nel trattamento di pazienti con Linfoma follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione di malattia durante o fino a sei mesi dopo il trattamento con rituximab o un regime contenente rituximab (linee successive alla prima)	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a chemioterapia, come terapia di mantenimento nei soggetti che ottengono una risposta, è indicato per il trattamento di pazienti con LF avanzato non pretrattato	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC16	Dinutuximab beta	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento del neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire dai 12 mesi di età che sono stati precedentemente sottoposti a chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta parziale, seguita da terapia mieloablattiva e trapianto di cellule staminali	Hub: - Oncologia - Oncoematologia pediatrica GOM Reggio Calabria: - UOC Centro Trapianti Midollo Osseo	
L01XC16	Dinutuximab beta	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	Trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di prima linea, senza cosomministrazione di IL-2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC19	Blinatumomab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia.	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XC19	Blinatumomab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superior a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento.	Hub: - Ematologia - Oncoematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XC21	Ramucirumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine. In monoterapia è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC26	Inotuzumab Ozogonomicin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)	Hub: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XC27	Olaratumab	ev	OSP	H		In combinazione con doxorubicina per il trattamento di pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in fase avanzata che non sono candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico o radioterapico e che non sono stati precedentemente trattati con doxorubicina.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC28	Durvalumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, non resecabile, negli adulti il cui tumore presenta un'espressione di PD-L1 \geq 1% sulle cellule tumorali e la cui malattia non è progredita a seguito di chemio-radioterapia a base di platino	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XC28	Durvalumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con etoposide e carboplatino o cisplatino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC38	Isatuximab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato, in associazione a pomalidomide e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con MM recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma (PI) e con progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC38	Isatuximab				Registro web-based AIFA	in combinazione con carfilzomib e desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una e non più di 3 linee di terapia precedenti. Sono esclusi dalla rimborsabilità i pazienti con "primary refractory disease" e i pazienti pretrattati con carfilzomib o refrattari/intolleranti ad un precedente trattamento con anticorpi monoclonali anti-CD38.	Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XE02	Gefitinib	os	RNRL	H		indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l'EGFR-TK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE03	Erlotinib cloridrato	os	RNRL	H		Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE03	Erlotinib cloridrato	os	RNRL	H		Carcinoma pancreatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE04	Sunitinib maleato	os	RNRL	H		Tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE04	Sunitinib maleato	os	RNRL	H		Carcinoma renale metastatico (MRCC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE04	Sunitinib maleato	os	RNRL	H		Tumori neuroendocrini pancreatici (pNET)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE05	Sorafenib	os	RNRL	H		Epatocarcinoma (HCC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE05	Sorafenib	os	RNRL	H		Carcinoma a cellule renali (RCC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE05	Sorafenib	os	RNRL	H		Carcinoma tiroideo differenziato	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE09	Temsirolimus	ev	OSP	H			Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE11	Pazopanib	os	RNRL	H			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE12	Vandetanib	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma Midollare della Tiroide (MTC)	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XE13	Afatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti naive agli inibitori tirosinchinasi del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XE17	Axitinib	os	RNRL	H			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE18	Ruxolitinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea.	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XE27	Ibrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di Waldenstrom (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano - Oncologia (PO KR) - Ematologia (PO KR) - Microcitemia (PO KR) (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XE27	Ibrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfocitica Cronica (CLL) precedentemente non trattata. in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con CLL che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano - Oncologia (PO KR) - Ematologia (PO KR) - Microcitemia (PO KR) (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XE27	Ibrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano - Oncologia (PO KR) - Ematologia (PO KR) - Microcitemia (PO KR) (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XE28	Ceritinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)	Hub: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE28	Ceritinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib	Hub: - Oncologia	
L01XE38	Cobimetinib	os	RNRL	H		In associazione a vemurafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE39	Midostaurina	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina ad alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento con Rydapt come agente singolo per pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva	Hub: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XE41	Binimetinib	os	RNRL	H		In associazione con encorafenib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE43	Brigatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un inibitore di ALK.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Medicina Interna - Pneumologia	
L01XE43	Brigatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC, ALK positivo, in stadio avanzato, precedentemente trattati con Crizotinib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Medicina Interna - Pneumologia	
L01XE50	Abemaciclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di donne con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico, positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2): in associazione con un inibitore delle aromatasi o fulvestrant come terapia endocrina iniziale o in donne che hanno ricevuto una precedente terapia endocrina. Nelle donne in pre- o peri-menopausa, la terapia endocrina deve essere combinata con un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale sieroso di alto grado, di carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primitivo, BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), che sono in risposta (risposta completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia, per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo FIGO) BRCA1/2- mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che sono in risposta (completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento in monoterapia di pazienti adulti con cancro della mammella, localmente avanzato o metastatico, HER2 negativo, e con mutazioni della linea germinale BRCA1/2. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con un'antraciclina e un taxano nel setting (neo)adiuvante o metastatico, a meno che i pazienti fossero stati non eleggibili per questi trattamenti. I pazienti con cancro della mammella e recettore ormonale (HR)-positivo, devono inoltre aver progredito durante o dopo una precedente terapia endocrina o devono essere considerati non eleggibili per la terapia endocrina	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un deficit di ricombinazione omologa (homologous recombination deficiency, HRD), definito dalla presenza di una mutazione BRCA1/2 e/o di instabilità genomica.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato, in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione e con mutazioni nei geni BRCA1/2 (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), in progressione dopo precedente trattamento che includeva un nuovo agente ormonale	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK02	Niraparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio FIGO III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia di prima linea a base di platino per le pazienti BRCA mutate.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK04	Rucaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino sensibile di carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle tube di Falloppio o peritoneale primario, in risposta (risposta completa o parziale) dopo chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XJ02	Sonidegib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare (BCC) in stadio localmente avanzato che non sono suscettibili di intervento chirurgico curativo o radioterapia	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Dermatologia	
L01XJ03	Glasdegib maleato	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato, in associazione a citarabina a basse dosi, per il trattamento della leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi di novo oppure secondaria, in pazienti adulti non candidabili alla chemioterapia di induzione standard	Hub, Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX05	Idrossiurea o Idrossicarbamide	os	RNRL	C		Indicato per la prevenzione delle crisi dolorose vaso-occlusive ricorrenti inclusa la sindrome acuta toracica in pazienti adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 2 anni affetti da anemia falciforme sintomatica	Hub: - Ematologia - Pediatria Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
L01XX14	Tretionina	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Centro Regionale Trapianti - Ematologia - Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX23	Mitotane	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX24	Peg-asparaginasi	ev	OSP	H		Come componente di una terapia di associazione antineoplastica per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) nei pazienti pediatrici dalla nascita a diciotto anni e negli adulti.	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX25	Bexarotene	os	RNRL	A			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX27	Arsenico triossido	ev	OSP	H		Induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da leucemia promielocitica acuta (LPA) di nuova diagnosi a rischio basso/intermedio (conta leucocitaria $\leq 10 \times 10^9/\text{mcl}$) in combinazione con acido all-trans retinoico (ATRA) caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene Leucemia Promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa)»	uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
L01XX32	Bortezomib	ev	OSP	H		In monoterapia in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desamteasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: -Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX33	Bortezomib	ev	OSP	H		In associazione con melafalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: -Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX34	Bortezomib	ev	OSP	H		In associazione con desametasone o con desametasone e talidomide è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: -Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX35	Bortezomib	ev	OSP	H		In associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoiche.	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke: -Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX35	Anagrelide cloridrato	os	RNRL	A-PHT			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX41	Eribulina mesilato	ev	RNRL/OSP	H		E' indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, che hanno mostrato una progressione dopo almeno due regimi chemioterapici per malatti avanzata. La terapia precedente deve aver previsto l'impiego di un'antraciclina e di un taxano, in contesto adiuvante o metastatico, a meno che i pazienti non siano idonei a ricevere questi trattamenti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX41	Eribulina mesilato	ev	RNRL/OSP	H		E' indicato per il trattamento di pazienti adulti con liposarcoma inoperabile, sottoposti a precedente terapia contenente antracicline (eccetto se non idonei) per malattia avanzata o metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX43	Vismodegib	os	OSP	H		Carcinoma basocellulare	Hub e Spoke: - Oncoematologia - Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX44	Aflibercept	ev	OSP	H		In combinazione con chemioterapia a base di irinotecan/5-fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) è indicato nei pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (MCRC) resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX45	Carfilzomib	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX46	Carfilzomib	ev	OSP	H		In associazione con daratumumab e desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	Hub: -Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX47	Idelalisib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento	Hub e Spoke: - Oncoematologia - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX47	Idelalisib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia	Hub e Spoke: - Oncoematologia - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX50	Ixazomib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia Si ricorda che è ammesso alla rimborsabilità solamente il trattamento di Ixazomib, in combinazione con lenalidomide e desametasone, in pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario che non si siano dimostrati refrattari a lenalidomide o ad un inibitore del proteasoma e che abbiano ricevuto ≥ 2 precedenti linee di terapia o almeno 1 precedente linea di terapia con citogenetica sfavorevole [del (17); t (4;14); t(14;16)]	Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX52	Venetoclax	os	RNRL	H		Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL- chronic lymphocytic leukaemia) in presenza della delezione 17p o della mutazione TR53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX52	Venetoclax	os	RNRL	H		Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	Hub: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX52	Venetoclax	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con obinutuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) non trattati in precedenza	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XX60	Talazoparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA1/2, affetti da carcinoma mammario HER2-negativo localmente avanzato o metastatico. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con una antraciclina e/o un taxano nel contesto (neo)adiuvante, localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dei pazienti non idonei per tali trattamenti. I pazienti con carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali (HR) devono essere stati precedentemente trattati con terapia endocrina o ritenuti non idonei alla terapia endocrina	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX70	Axicabtagene ciloleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B refrattario o recidivante (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (primary mediastinal large B-cell lymphoma, PMBCL), dopo due o più linee di terapia sistemica	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX71	Tisagenlecleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di: • Pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva;	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX71	Tisagenlecleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di: • Pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica.	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XY01	Daunorubicina/citarabina	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta correlata a terapia (t-AML) o AML con alterazioni correlate a mielodisplasia (AML-MRC)	Hub: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L01XY02	Pertuzumab/Trastuzumab	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	• in associazione con chemioterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva; • in associazione con docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, metastatico o localmente recidivato non operabile, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02AB01	Megestrol Acetato	os	RNR	A		neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata o da AIDS		28
L02AB02	Medrossiprogesterone (Acetato)	os,im	RNR	A		neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata o da AIDS		28
L02AE01	Buserelina Acetato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva	Hub e Spoke: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51
L02AE02	Leuprorelina Acetato	im,sc	RR/RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva Pubertà precoce	Hub e Spoke: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51
L02AE03	Goserelin Acetato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva	Hub e Spoke: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51
L02AE04	Triptorelina	sc,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva Pubertà precoce	Hub e Spoke: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H		E' indicato per il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione (CRPC), asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H		E' indicato per il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H		Trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC) in associazione con terapia di deprivazione androgenica.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H		Trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (castration resistant prostate cancer, CRPC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB05	Apalutamide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato negli uomini adulti per il trattamento del carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC) in combinazione con terapia di deprivazione androgenica (ADT), con diagnosi di malattia a basso volume o ad alto volume e non candidabili a trattamento con docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB06	Darolutamide	Os	RNRL	H		Trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione (nmCRPC) che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BX02	Degarelix	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Endocrinologia - Oncologia - Urologia	
L02BX03	Abiraterone acetato	os	RNRL	H		E' indicato assieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BX03	Abiraterone acetato	os	RNRL	H		E' indicato assieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti la cui malattia è progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L03	Frazione cellulare arricchita di cellule autologhe CD34+	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti con immunodeficienza grave combinata da deficit di adenosina deaminasi (ADA-SCID), per i quali non sia disponibile un idoneo donatore consanguineo di cellule staminali HLA (antigene leucocitario umano)- compatibili		
L03AA02	Filgrastim originator	ev,sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AA02	Filgrastim biosimilare	ev,im,sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AA10	Lenograstim	ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AA13	Pegfilgrastim	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AA14	Lipegfilgrastim	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AB01	Intereferone Alfa Naturale	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB01	Intereferone Alfa Naturale	im,sc	RRL	A		Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB04	Interferone Alfa 2a	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB05	Interferone Alfa 2a	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB05	Interferone Alfa 2b	im,sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB06	Interferone Alfa 2b	im,sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AB07	Interferone Beta 1a	im	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB08	Interferone Beta 1b	im	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011) Sclerosi Multipla secondariamente progressiva con malattia in fase attiva evidenziata da recidive	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB10	Interferone Alfa 2b Pegilato	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB10	Interferone Alfa 2b Pegilato	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB11	Interferone Alfa-2A Pegilato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB12	Interferone Alfa-2A Pegilato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB13	Peg-interferone Beta 1A	sc	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB15	Ropeginterferone alfa-2b	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento della policitemia vera senza splenomegalia sintomatica, in monoterapia nei pazienti adulti.	Hub: - Ematologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
L03AX13	Glatiramer	sc	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AX15	Mifamurtide	ev	OSP	H		E' indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non metastatico ad alto grado resecabile in seguito a resezione chirurgica macroscopicamente	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AX16	Plerixafor	os,sc	OSP	H		E' indicato in combinazione con il fattore stimolante le colonie dei granulociti (G-CSF) per incrementare la mobilizzazione delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti adulti con linfoma e mieloma multiplo con una scarsa mobilizzazione cellulare	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di Ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L04AA06	Acido micofenolico	os	RNRL	A-PHT		Profilassi del rigetto acuto	Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Nefrologia - Pediatria - Immunologia - Ematologia	
L04AA10	Sirolimus	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Centri di Trapianto - Emodialisi - Nefrologia	
L04AA13	Leflunomide	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Medicina Generale - Reumatologia	
L04AA18	Everolimus	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiocirurgia - Nefrologia - Malattie infettive - Gastroenterologia - Epatologia	
L04AA23	Natalizumab	ev	OSP	H		Sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA24	Abatacept	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia	
L04AA25	Eculizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	E' indicato per il trattamento di adulti e bambini affetti da: emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni. Sindrome emolitico uremica atipica (SEUa)	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
L04AA27	Eculizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di adulti affetti da disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) in pazienti positivi agli anticorpi anti-aquaporina 4 (AQP4) con decorso recidivante della malattia	Hub: - Neurologia	
L04AA28	Eculizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da miastenia gravis generalizzata refrattaria (MGg) in pazienti positivi agli anticorpi anti recettore dell'acetilcolina (AChR)	Hub: - Neurologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA26	Belimumab	ev,sc	OSP/RRL	H	Registro web-based AIFA	E' indicato come terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, con un alto grado di attività della malattia (ad es. anti-ds DNA positivi e basso complemento) nonostante la terapia standardcx	Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina Interna - Immunologia - Ambulatori di Reumatologia	
L04AA28	Belimumab	ev,sc	OSP/RRL	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con terapie immunosoppressive di fondo per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica attiva	Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina Interna - Nefrologia - Immunologia	
L04AA27	Fingolimod	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre: pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia disease modifying; oppure pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA28	Belatacept	ev	OSP	C		In combinazione con corticosteroidi e acido micofenolico (MPA), è indicato per la profilassi del rigetto del trapianto negli adulti riceventi trapianto renale.	Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Nefrologia - Immunologia	
L04AA29	Tofacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia <u>Area Gastroenterologia</u> Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AA29	Tofacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Trattamento di pazienti adulti affetti da colite ulcerosa (CU) attiva da moderata a severa che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono intolleranti alla terapia convenzionale o a un agente biologico	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia <u>Area Gastroenterologia</u> Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA29	Tofacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Artrite psoriasica - in associazione con MTX e' indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva (PsA) in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono intolleranti ad una precedente terapia con un farmaco antireumatico modificante la malattia (DMARD)		
L04AA31	Teriflunomide	os	RRL	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L04AA32	Apremilast	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AA33	Vedolizumab	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Gastroenterologia</u> Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AA34	Alemtuzumab	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA36	Ocrelizumab	ev	OSP	H		Trattamento di pazienti adulti affetti da forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base alle caratteristiche cliniche o radiologiche	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA37	Baricitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia	
L04AA38	Ozanimod	os	RRL	A-PHT		Indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) con malattia in fase attiva, come definito da caratteristiche cliniche o di imaging.	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA40	Cladribina	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA42	Siponimod	os	RRL	A-PHT		Indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria.	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA43	Ravulizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato nel trattamento di pazienti adulti e pediatrici con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN): <ul style="list-style-type: none"> in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia; in pazienti clinicamente stabili dopo trattamento con eculizumab per almeno gli ultimi 6 mesi 	<p>Hub: - Ematologia</p> <p>Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)</p>	
L04AA44	Upadacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p>	
L04AA44	Upadacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicato nel trattamento dell'artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più DMARD" e "Rinvoq" può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato	<p>Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina interna - Dermatologia</p>	
L04AA45	Filgotinib	os	RNRL	H		Trattamento dell'artrite reumatoide, in monoterapia o in associazione a metotrexato (MTX), in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD).	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p>	
L04AA50	Ponesimod	os	RRL	A-PHT		Trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita sulla base di caratteristiche cliniche o radiologiche	<p>PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017</p>	
L04AA52	Ofatumumab	sc	RRL	H		Trattamento in combinazione con clorambucile o bendamustina di pazienti con LLC che non sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina	<p>Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke - Area dedicata di ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)</p>	
L04AA53	Ofatumumab	sc	RRL	H		Indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o radiologiche	<p>PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017</p>	
L04AA54	Pegcetacoplan	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con emoglobinuria parossistica notturna (EPN) che rimangono anemici dopo trattamento con un inibitore di C5 per almeno TRE mesi	<p>Hub: - Ematologia</p> <p>Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AB01	Etanercept/Etanercept biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia	
L04AB02	Infliximab/Infliximab biosimilare	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia <u>Area Gastroenterologia</u> Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria	
L04AB05	Certolizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AB06	Golimumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia <u>Area Gastroenterologia</u> Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AB04	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia <u>Area Gastroenterologia</u> Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria	
L04AB05	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Uveite	Hub: - Oculistica	
L04AB07	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Uveite pediatrica		
L04AB08	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Idrosadenite Suppurativa		
L04AC03	Anakinra	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia	
L04AC04	Anakinra	ev	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Febbre mediterranea familiare (FMF). Se appropriato, Anakinra deve essere somministrato in associazione con colchicina	Hub: - Reumatologia - Medicina interna - Pediatria - Immunologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
L04AC05	Ustekinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia <u>Area Gastroenterologia</u> Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC07	Tocilizumab	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Pediatria - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia	
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sindromi da Febbre Periodica Autoinfiammatoria (TRAPS, MKD, FMF)	Hub: - Reumatologia - Medicina interna - Pediatria - Immunologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Pediatria - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia	
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Malattia di Still	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
L04AC10	Secukinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC11	Siltuximab	ev	OSP	H		Trattamento di malattia di Castleman multicentrica (MCD) che sono negativi per il virus dell'immunodefidenza umana (HIV) e per l'herpes virus-8 umano (HHV8)	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
L04AC12	Brodalumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC13	Ixekizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC14	Sarilumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC16	Guselkumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia <u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC17	Tildrakizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC18	Risankizumab	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Dermatologia</u> Hub e Spoke: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC19	Satralizumab	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia o in associazione a terapia immunosoppressiva (TIS), per il trattamento dei disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD), in pazienti adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di età con sieropositività per le IgG antiacquaporina- 4 (AQP4-IgG)	Hub: - Neurologia	
L04AD02	Tacrolimus	os,ev	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Profilassi del rigetto da trapianto nei pazienti che ricevono trapianto allogenico di fegato, rene o cuore. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri medicinali immunosoppressori.	Hub e Spoke: - Centri di Trapianto - Nefrologia - Emodialisi - Cardiologia - Cardiochirurgia - Malattie Infettive - Gastroenterologia	
L04AX02	Talidomide	os	RR	H	Registro web-based AIFA	Per le indicazioni : vedere Scheda di Prescrizione PPP https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1758720/Registro_PPP_2022.08.12_TOCTI_NO.zip	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Spoke: - Area dedicata di Ematologia in SC Oncologia di Rossano (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L04AX04	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	E' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto	Hub: Ematologia Oncoematologia Spoke: Rossano: area dedicata di Ematologia in SC Oncologia -Oncologia (PO KR) - Ematologia e Microcitemia (PO KR) (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L04AX05	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L04AX06	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AX07	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA 102 del 21 luglio 2020)	
L04AX05	Pirfenidone	os	RR/RNRL	H	Registro web-based AIFA	Tattamento di fibrosi polmonare idiopatica da lieve a moderata	Hub: - Pneumologia - Medicina Interna - Ambulatorio di Insufficienza Respiratoria e Urgenze in Malattie Dell' Apparato Respiratorio (AOU CZ) - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Centro Regionale Fibrosi Cistica	
L04AX06	Pomalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	in associazione a desametasone è indicato nel trattamento di pazienti adulti con amiloidosi AL sottoposti a precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib che non abbiano determinato una risposta ematologica completa o parziale molto buona (definita come dFLC <40 mg/L nei soggetti con dFLC basale >50 mg/L o come dFLC <10 mg/L nei soggetti con dFLC basale tra 20 e 50 mg/L).	Hub: - Ematologia - Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L04AX06	Pomalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione con desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia Spoke: Rossano: area dedicata di Ematologia in SC Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L04AX06	Pomalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione con bortezomib e desametasone, e' indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia comprendente lenalidomide	Hub e Spoke: - Oncologia - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
L04AX07	Dimetilfumarato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L04AX08	Dimetilfumarato	os	RR/RRL	A		Tattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che necessitano di terapia farmacologica sistemica	Hub e Spoke: - Dermatologia	
M	SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO							
M01AB01	Indometacina	os,ev,im,loc	RR	A/C		Artropatie su base connettivtica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AB05	Diclofenac	os,loc,im	RR	A/C		Artropatie su base connettivtica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AB14	Proglumetacina	os	RR	A		Artropatie su base connettivtica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M01AB55	Diclofenac Sodico/Misoprostolo	os	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AC01	Piroxicam	os,im	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AE01	Ibuprofene	os	OTC/RR	C/A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AE02	Naprossene	os	RR	A/C		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AE03	Ketoprofene	ev,os	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AE09	Flurbiprofene	os	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AE12	Oxaprozina	os	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AX17	Nimesulide	os	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta Trattamento di breve durata del dolore acuto		66
M04AA04	Febuxostat	os	RR	A		Trattamento dell'iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti.		91
M05BA02	Acido Clodronico Sale Disodico	im	RR	A/C		Trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Ematologia - Medicina Interna - Ortopedia	42
M05BA03	Acido Pamidronico Sale Disodico	ev	RNRL	H			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Ematologia - Medicina Interna - Ortopedia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BA04	Acido Alendronico Sale Sodico	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
M05BA04	Acido Alendronico Sale Sodico	os	RR	A		Indicato negli adulti per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee;	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Medicina Interna - Ortopedia	
M05BA06	Acido Ibandronico	os,ev	RNRL	A-PHT		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
M05BA06	Acido Ibandronico	os,ev	RNRL	A-PHT		Indicato negli adulti per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee;	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Medicina Interna - Ortopedia	
M05BA07	Acido Risedronico	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia Ambulatori specialistici territoriali: - Ortopedia - Fisiatria - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia - Reumatologia	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BA08	Acido Zolendronico Monoidrato	ev	RNRL/OSP	H		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<p>Hub, Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortopedia - Fisiatria - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia - Reumatologia 	79
M05BA08	Acido Zolendronico Monoidrato	ev	RNRL/OSP	H			<p><u>Acido Zolendronico 5 mg (fino a 4 unità-sacche o flaconcini)</u></p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Reumatologia - Geriatria - Endocrinologia - Ginecologia - Ortopedia <p><u>Acido Zolendronico 4 mg (fino a 4 unità-sacche o flaconcini)</u></p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Ematologia - Medicina Interna - Ortopedia - Urologia <p>OSP: 5 mg (unità superiori a 4) OSP: 4 mg (unità superiori a 4)</p>	
M05BB03	Acido Alendronico (aledronato sodico triidrato e colecalciferolo)	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<p>Hub, Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortopedia - Fisiatria - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia - Reumatologia 	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BX04	Denosumab	sc	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia Nota prot. n. 427568 del 2020 - Ambulatorio di Endocrinologia del Distretto Valle Crati (ASP CS) - Ambulatorio di Geriatria del Poliambulatorio di Amantea (ASP CS) - CdC Madonna dello Scoglio (Cotronei - ASP KR)	79
M05BX04	Denosumab	sc	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso.	Hub e Spoke: - Oncologia	
M05BX04	Denosumab	sc	RRL	A-PHT		Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbidità	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
M05BX05	Burosumab	sc	RNL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'ipofosfatemia X-linked (XLH) con evidenza radiografica di malattia ossea, nei bambini di età pari o superiore ad un anno e negli adolescenti con sistema scheletrico in crescita	Centri di riferimento autorizzati alla diagnosi e al trattamento dell'ipofosfatemia X-linked (XLH) individuati dalle regioni	
M05BX06	Romozosumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
M09AB02	Collagenasi di clostridium histolyticum	im	RL/OSP	H		E' indicato nel trattamento della contrattura di Dupuytren in pazienti adulti con corda palpabile	- Ortopedia (specializzata nella chirurgia della mano)	
M09AB02	Collagenasi di clostridium histolyticum	im	RL/OSP	H		E' indicato nel trattamento di uomini adulti affetti da malattia di Peyronic con placca palpabile e curvatura di almeno 30 gradi all'inizio della terapia	- Ortopedia (specializzata nella chirurgia della mano)	
M09AX03	Ataluren	os	RNRL	H		Trattamento della distrofia muscolare di Duchenne dovuta a mutazione nonsense nel gene della distrofina (nonsense mutation Duchenne Muscular Dystrophy, nmDMD) nei pazienti deambulanti di età pari o superiore a 5 anni. L'efficacia non è stata dimostrata nei pazienti non deambulanti	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
M09AX07	Nusinersen	intrat	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale 5q	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M09AX09	Onasemnogene Aboeparvovec	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 kg: diagnostic clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi di vita, oppure diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a due copie del gene SMN2)	Hub: - Neurologia - Pediatria - Genetica medica Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
M09AX10	Risdiplam	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti a partire da 2 mesi di età, con una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o aventi da una a quattro copie di SMN2	Hub: - Neurologia - Pediatria Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
SISTEMA NERVOSO								
N01AX03	Ketamina	ev	OSP	H		Come unico anestetico per manovre chirurgiche e diagnostiche. Nonostante sia più indicato per interventi brevi, KETAMINA MOLTENI può essere usato, con dosi addizionali, per interventi di maggiore durata. Qualora si desideri rilascio della muscolatura scheletrica, si usi un miorelaxante e si tenga sotto controllo la respirazione. Per indurre l'anestesia prima di somministrare altri anestetici generali. Come supplemento ad altri anestetici.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
N02AE01	Buprenorfina (Cloridrato)	os,im,ev,td	RMR	A/H		Trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un contesto di trattamento medico, sociale e psicologico	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N02BG10	Delta-9-tetraidrocannabinolo/cannabidiolo	inal	RNRL	H		E' indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM) che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
N02CD01	Erenumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	Rete Regionale delle Cefalee (DCA n. 21 del 07/03/2022)	
N02CD02	Galcanezumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	Rete Regionale delle Cefalee (DCA n. 21 del 07/03/2022)	
N02CD03	Fremanezumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	Rete Regionale delle Cefalee (DCA n. 21 del 07/03/2022)	
N03AF03	Rufinamide	os	RRL	A			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N03AF04	Eslicarbazepina acetato	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N03AX10	Felbamato	os	RRL	A			Hub e Spoke: - Neurologia - Pediatria - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neurologo - Pediatra	
N03AX12	Gabapentin	os	RR	A		Dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes, neuropatia associata a malattia, dolore post-ictus o da lesione midollare, polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risultati inefficace, neuropatia diabetica	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	4
N03AX12	Gabapentin	os	RR	A		Trattamento della epilessia	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		Dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes, neuropatia associata a malattia, dolore post-ictus o da lesione midollare, polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risultati inefficace, neuropatia diabetica	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	4
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		Trattamento della epilessia	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		Trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato	Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Psichiatria	
N03AX21	Retigabina	os	RR	A		E' indicato come trattamento aggiuntivo delle crisi parziali farmaco-resistenti con o senza generalizzazione secondaria nei pazienti di età pari o superiore ai 18 anni affetti da epilessia, quando altre associazioni appropriate di farmaci si siano dimostrate inadeguate o non siano state tollerate	Hub e Spoke: - Neurologia	
N03AX22	Perampanel	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neurologo	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N03AX23	Brivaracetam	os/ev	RR/OSP	A-PHT/C	PT Cartaceo AIFA	Terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia	Hub e Spoke: - Neurologia - Neuropsichiatria infantile	
N03AX24	Cannabidiolo	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox Gastaut (LGS) nei pazienti a partire da due anni di età'	Hub e Spoke: - Neurologia - Neuropsichiatria infantile	
N03AX25	Cannabidiolo	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Dravet (DS) nei pazienti a partire da due anni di età'	Hub e Spoke: - Neurologia - Neuropsichiatria infantile	
N03AX26	Cannabidiolo	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato come terapia aggiuntiva per le crisi epilettiche associate a sclerosi tuberosa complessa (TSC) nei pazienti a partire da due anni di età'	Hub : - Neurologia	
N03AX25	Cenobamato	os	RRL	A-PHT		Indicato come terapia aggiuntiva delle crisi convulsive a insorgenza focale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti affetti da epilessia che non sono stati adeguatamente controllati nonostante una storia di trattamento con almeno due medicinali antiepilettici.	Hub e Spoke: - Neurologia	
N03AX26	Fenfluramina	os	RNRL	A-PHT		Trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici per pazienti di età pari o superiore ai 2 anni	Hub: - Neurologia	
N04BA03	Levodopa/Carbidopa/Entacapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neurologo	
N04BC06	Cabergolina	os	RNL/RNR	A/C	Scheda Regionale DCA PT generico		<u>Classe C</u> Ambulatori specialistici territoriali: - Geriatria - Neurologia - Psichiatria	
N04BD02	Rasagilina mesilato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Psichiatria - Geriatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Geriatria - Neurologo - Psichiatria	
N04BX01	Tolcapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Geriatria - Neurologia	
N04BX02	Entacapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Geriatria - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N04BX04	Opicapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Terapia aggiuntiva alle associazioni di levodopa/inibitori della DOPA decarbossilasi (DOPA decarboxylase inhibitors, DDCI) in pazienti adulti con malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie di fine dose che non sono stabilizzate con queste associazioni		
N05AE04	Ziprasidone Cloridrato	os	RR	A-PHT			Hub e Spoke: - Psichiatria	
N05AE05	Lurasidone	os	RR	A-PHT		Tattamento della schizofrenia in pazienti adulti	Hub e Spoke: - Psichiatria	
N05AH01	Loxapina	inal	OSP	H	PT Cartaceo AIFA	E' indicato per il controllo rapido dello stato di agitazione da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare. I pazienti devono ricevere il trattamento abituale immediatamente dopo il controllo dei sintomi acuti di agitazione	Hub e Spoke: - Psichiatria	
N05AH02	Clozapina	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AH03	Olanzapina	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H			Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AH04	Quetiapina (fumarato)	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AH05	Asenapina	os	RR	A-PHT			Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AX08	Risperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H			Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N05AX12	Aripiprazolo	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H			<p>Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</p>	
N05AX13	Paliperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		Trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 15 anni di età	<p>Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</p>	
N05AX16	Brexpiprazolo	Os	RR	A-PHT		Indicato per il trattamento della schizofrenia nei pazienti adulti	<p>Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</p>	
N05CD08	Midazolam	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	<p>Trattamento acuto delle crisi nelle epilessie dell'età pediatrica con elevato rischio di occorrenza di crisi prolungate (durata maggiore di 5 minuti) o di stato di male epilettico</p> <p>Forme idiopatiche Sindrome di Dravet Sindrome di Panayiotopoulos</p> <p>Trattamento acuto delle crisi nelle altre epilessie dell'età pediatrica, dopo un precedente episodio di crisi prolungata (durata maggiore di 5 minuti) o di stato di male epilettico</p> <p>Forme idiopatiche Forme sintomatiche a varia eziologia</p>	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia - Pediatria</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile</p>	93
N06AB03	Fluoxetina	os	RR	A			<p>Hub e Spoke: - Psichiatria</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile</p>	
N06AX21	Duloxetina cloridrato	os	RR	A/C		neuropatia diabetica	<p><u>Per la neuropatia diabetica</u></p> <p>Hub e Spoke: - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la terapia del dolore</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo</p>	4
N06AX21	Duloxetina cloridrato	os	RR	A/C		Trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato	<p>Hub e Spoke: - Psichiatria</p>	
N06AX26	Vortioxetina bromidrato	os	RR	A		Trattamento episodi depressivi maggiori negli adulti	<p>Hub e Spoke: - Psichiatria</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N06AX27	Esketamina	inal	RMR	H		In combinazione con un SSRI o un SNRI, è indicato per adulti con disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento, che non hanno risposto ad almeno due diversi trattamenti con antidepressivi nel corso dell'attuale episodio depressivo da moderato a grave	Hub e Spoke: - Psichiatria	
N06BA04	Metilfenidato (cloridrato)	os	RMR	A-PHT	PT web-based AIFA - Legge 648/96	Indicato come parte di un programma globale di trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti nei casi in cui le sole misure correttive si dimostrano insufficienti. Il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista in disturbi comportamentali in età pediatrica.	Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N06BA07	Modafinil	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Neurologia	
N06BA09	Atomoxetina (cloridrato)	os	RNRL	A-PHT	PT web-based AIFA - Legge 648/96		Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N06BA14	Soliamfetol	os	RRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato per: - migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva in pazienti adulti affetti da narcolessia (con o senza cataplessia). - migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva (Excessive Daytime Sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnoea, OSA) nei quali l'EDS non e' stata trattata in modo soddisfacente con la terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione positiva continua nelle vie aeree (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)	Hub: - Neurologia	
N06BX13	Idebenone	os	RR	C		- Nel trattamento di deficit cognitivo- comportamentali conseguenti a patologie cerebrali sia di origine vascolare che degenerativa - Miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich	Hub: - Neurologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
N06BX14	Idebenone	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	E' indicato per il trattamento della compromissione visiva in pazienti adulti e adolescenti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON)	Hub e Spoke: - Oftalmologia - Neurologia	
N06DA02	Donepezil Cloridrato	os	RRL/RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento della malattia di Alzheimer: - di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20	Centri Demenza Già Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) (DDRC n. 1845 del 21.02.2005 e nota regionale prot. n. 5706 del 26/06/2010)	85
N06DA03	Rivastigmina	os,transderm	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento della malattia di Alzheimer: - di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20	Centri Demenza Già Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) (DDRC n. 1845 del 21.02.2005 e nota regionale prot. n. 5706 del 26/06/2010)	85
N06DA04	Galantamina (bromidato)	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento della malattia di Alzheimer: - di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20	Centri Demenza Già Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) (DDRC n. 1845 del 21.02.2005 e nota regionale prot. n. 5706 del 26/06/2010)	85
N06DX01	Memantina (cloridrato)	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento della malattia di Alzheimer: - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20	Centri Demenza Già Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) (DDRC n. 1845 del 21.02.2005 e nota regionale prot. n. 5706 del 26/06/2010)	85

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N07BB04	Naltrexone Cloridrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC05	Levometadone cloridrato	os	OSP	C		Terapia sostitutiva di mantenimento nella dipendenza da oppioidi negli adulti, in associazione con un adeguato supporto medico, sociale e psicosociale.	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC51	Buprenorfina/naloxone	os	RMR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07XX	Edaravone	ev	OSP			Trattamento di pazienti con diagnosi definita o probabile di sclerosi laterale amiotrofica, selezionati secondo specifici criteri: eta' ≥ 18 anni; punteggio ≥ 2 in ogni item della scala ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRRS-R); funzionalità respiratoria caratterizzata da un valore di Capacità Vitale Forzata (CVF) ≥ 80% del teorico; durata di malattia dall'esordio dei sintomi ≤ 2 anni; riduzione di 1-4 punti nel punteggio ALS Functional Rating Scale-Revised nelle 12 settimane precedenti all'inizio del trattamento.	Hub: - Neurologia (GOM RC-AOU CZ-AO CS) Spoke: - Neurologia (PO VV-ASP VV)	
N07XX02	Riluzolo	os	RRL	A-PHT		sclerosi laterale amiotrofica (SLA)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Neurologia	
N07XX04	Sodio oxibato	os	RNRL	C/H		narcolessia con cataplessia in pazienti adulti	<u>Classe C</u> Neurologia <u>Classe H</u> Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07XX05	Amifampridina	os	RRL	C		Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N07XX06	Tetrabenazina	os	RRL	A			Hub e Spoke: - Neurologia - Psichiatria - Geriatria	
N07XX08	Tafamidis	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'amiloidosi	Hub e Spoke: - Ematologia - Oncologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
N07XX08	Tafamidis	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'amiloidosi da transtiretina wild type o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopia (ATTR-CM)	Hub: - Cardiologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
N07XX11	Pitolisant	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	Indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre l'eccessiva sonnolenza diurna (excessive daytime sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva nel sonno (obstructive sleep apnea, OSA) nei quali l'EDS non è stata trattata in modo soddisfacente dalla terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione continua positiva delle vie aeree (continuous positive airway pressure, CPAP) o nei quali tale terapia non sia stata tollerata.	Hub: - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N07XX12	Patisiran Sodico	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosiATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o stadio 2.	Hub e Spoke: - Medicina Interna - Neurologia	
N07XX15	Inotersen	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi ereditaria da accumulo da transtiretina (HATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2	Hub: - Medicina Interna - Neurologia Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
P01CX01	Pentamidina Isetionato	ev	RRL	A-PHT			Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Pneumologia	
R	SISTEMA RESPIRATORIO							
R03AC04	Fenoterolo	inal	RR	A		trattamento sintomatico degli attacchi asmatici; profilassi dell'asma da sforzo; trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopulmonari	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	
R03AC12	Salmeterolo Xinafoato	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AC13	Formoterolo	inal,os	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AC18	Indacaterolo	os	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AC19	Olodaterolo	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AK06	Salmeterolo Xinafoato/Fluticasone Propionato	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AK07	Budesonide/Formoterolo Fumarato	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AK08	Formoterolo/beclometasone	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AK10	Fluticasone furoato/vilanterolo	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL03	Umeclidinio bromuro/Vilanterolo trifrenatato	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL04	Indacaterolo/glicopirronio bromuro	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL05	Bromuro di acilidinio/Formoterolo	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL06	Tiotropio/Olodaterolo	inal	RRL	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	
R03AL07	Glicopirronio/Formoterolo	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL08	Fluticasone/Umeclidinio/Vilanterolo	inal	RRL	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	
R03AL09	Beclometasone/Formoterolo/glicopirronio bromuro	inal	RRL	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL11	Glicopirronio/Formoterolo/Budesonide	inal	RRL	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03BB04	Tiotropio bromuro cloridrato	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03BB05	Acilidinio bromuro	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03BB06	Glicopirronio bromuro	inal	RR	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03DC03	Montelukast	os	RR	A		Trattamento di "seconda linea" dell'asma moderata persistente, in aggiunta agli steroidi per via inalatoria, quando questi non garantiscano un controllo adeguato della patologia, anche dopo associazione con β -2 agonisti Profilassi dell'asma da sforzo	Hub e Spoke: - Pneumologia - Medicina Generale Ambulatori specialistici territoriali: - Allergologia - Pneumologia - Pediatria - Medicina Per pazienti pediatrici affetti da asma (Nota 336746/2018) - Pediatria	82
R03DX05	Omalizumab	sc,ev	RRL	A-PHT		Asma di accertata natura IgE mediata	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena- ASP Reggio Calabria	
R03DX05	Omalizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Orticaria cronica spontanea	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Allergologia - Pediatria	
R03DX05	Omalizumab	sc	RRL	A-PHT		Indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a diciotto anni) con CRSwNP grave per i quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Allergologia - ORL	
R03DX07	Roflumilast	os	RRL	A-PHT		E' indicato come terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronica ostruttiva grave (BPCO) (FEV1 post-broncodilatatore meno del 50% del teorico) associata a bronchite cronica nei pazienti adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al trattamento broncodilatatore	Hub e Spoke: - Pneumologia - Geriatria - Medicina Generale	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilo refrattario severo in pazienti adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena- ASP Reggio Calabria	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP severa per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03DX10	Benralizumab	sc	RRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Terapia di mantenimento aggiuntiva in pazienti adulti con asma eosinofilo severo non adeguatamente controllato malgrado l'impiego di corticosteroidi per via inalatoria a dosi elevate e β -agonisti a lunga durata d'azione	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena- ASP Reggio Calabria	
R05CB13	Dornase alfa	inal	RNRL	A-PHT			Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R05DA20	Diidrocoideina + acido benzoico	os	RR	A		tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R05DA	Diidrocoideina	os	RR	A		tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R05DB27	Levodropropizina	os	RR	A		tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R06AD02	Prometazina Cloridrato	im,os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AE06	Oxatomide	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AE07	Cetirizina Dicloridrato	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AE09	Levocetirizina dicloridrato	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AX13	Loratadina	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AX17	Ketotifene fumarato acido	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a 6 anni e di peso pari o superiore a 25 kg affetti da fibrosi cistica (FC), che hanno una delle seguenti mutazioni di gating (di classe III) nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R. [Data inizio monitoraggio AIFA 05/05/2015] o che hanno una mutazione R117H CFTR [Data inizio monitoraggio AIFA 12/04/2017 per i pz i età pari o superiore a 18 anni]; [Data inizio monitoraggio 04/01/2022 per i pz di età pari o superiore a 6 anni]	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	In un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a sei e minore di dodici anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Kalydeco» compresse e' indicato in regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Kalydeco» compresse e' indicato in regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono eterozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) per F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Kalydeco» compresse e' indicato in regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure; di funzione residua (genotipo F/RF) oppure; non classificata (genotipo F/non classificato) oppure; non identificata (genotipo F/non identificato).	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		Indicato in associazione con ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg compresse per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari e superiore a sei anni affetti da fibrosi cistica (FC), omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR o eterozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		Indicato in un regime di associazione con ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor compresse, per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure di funzione residua (genotipo F/RF) oppure non classificata (genotipo F/non classificato) oppure non identificata (genotipo F/non identificato)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		In un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a sei e minore di dodici anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX30	Lumacaftor / Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Granulato: indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in bambini di età pari o superiore a 2 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX30	Lumacaftor / ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 6 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX31	Tezacaftor/ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica (FC) di età pari e superiore a dodici anni, omozigoti per la mutazione F508del o eterozigoti per la mutazione F508del e che presentano una delle seguenti mutazioni nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR): P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A → G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789 + 5G → A, 3272-26A → G, e 3849 + 10kbC → T	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX32	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a dodici anni, che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) o eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF).	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX32	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età da sei a minore di dodici anni che hanno almeno una mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX33	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse, per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure di funzione residua (genotipo F/RF) oppure non classificata (genotipo F/non classificato) oppure non identificata (genotipo F/non identificato)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
S	ORGANI DI SENSO							
S01AA12	Tobramicina	loc	RR	C			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie Infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia Centri Fibrosi Cistica	
S01BA15	Fluocinolone acetoneide	intravitr	OSP	H	PT Cartaceo AIFA	Trattamento della compromissione visiva associata all'edema maculare diabetico cronico che non risponde in misura sufficiente alle altre terapie disponibili.	Hub: - Oculistica	
S01BC10	Nepafenac	loc	RR	H			Hub e Spoke: - Oculistica	
S01EB01	Pilocarpina Cloridrato	loc	RR	A			Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Oncologia - Oculistica - Gastroenterologia	
S01LA03	Pegaptanib sodico	intravitr	OSP	H		E' indicato per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD) negli adulti	Hub e Spoke: - Oculistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01LA04	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA04	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA06	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA07	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia patologica (PM)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA05	Aflibercept	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA05	Aflibercept	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA06	Aflibercept	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA06	Brolucizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01XA18	Ciclosporina	loc	RRL	A-PHT		Trattamento di severa cheratocongiuntivite Vernal (VKC) nei bambini al di sopra di 4 anni e negli adolescenti	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
S01XA19	Cellule epiteliali corneali umane autologhe	imp. sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da deficit di cellule staminali limbari da moderato a grave (definito dalla presenza di neovascolarizzazione superficiale della cornea in almeno due quadranti, con coinvolgimento della parte centrale della cornea e grave compromissione dell'acuità visiva), unilaterale o bilaterale, causato da ustioni oculari da agenti fisici o chimici. Per la biopsia sono necessari almeno 1-2 mm2 di tessuto limbare non danneggiato	Centri Malattie Rare (DGR n. 178 del 20.05.2011)	
S01XA22	Ocriplasmina	intravitr	OSP	H			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01XA24	Cenegermin	loc	RNRL	H		Trattamento della cheratite neurotrofica moderata (difetto epiteliale persistente) o severa (ulcera corneale) negli adulti	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01XA27	Voretigenene neparovvec	sottoretinico	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti e pediatrici con perdita della vista dovuta adistrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che abbiano sufficienti cellule retiniche vitali	Hub: - Oculistica	
V	VARI							
V01AA02	Polline di graminacee	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Allergologia - Pediatria - Otorinolaringoiatria - Pneumologia - Immunologia	
V03AB35	Sugammadex	ev	OSP	H		Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti. Per la popolazione pediatrica: sugammadex è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 17 anni.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
V03AB37	Idarucizumab	ev	OSP	H		Indicato nei pazienti adulti trattati con dabigatranetexilato nei casi in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti: negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero DCA 88/2017	
V03AB38	Andexanet alfa	ev	OSP	C		Indicato per pazienti adulti trattati con un inibitore diretto del fattore Xa (Fxa) (apixaban o rivaroxaban), quando è richiesta l'inversione della terapia anticoagulante a causa di emorragie potenzialmente fatali o incontrollate	Hub e Spoke: - Centri DEA 1 e 2 - Pronto Soccorso Elenco sito Ministero della Salute aggiornato al 6 dicembre 2021	
V03AC01	Deferoxamina Mesilato	im,ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia - Servizio Trasfusionale - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria	
V03AC02	Deferiprone	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
V03AC03	Deferasirox	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Ematologia (DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)	
V03AE01	Sodio Polistiren Solfonato	os	RR	A			Hub e Spoke: - Medicina Generale - Nefrologia - Cardiologia - Emodialisi - Nefrologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V03AE02	Sevelamer	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE03	Lantano carbonato idrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE05	Ossiidrossido sucroferrico	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Nefrologia	
V03AE09	Patiromer	os	RRL	A-PHT		Indicato per il trattamento dell'iperkalemia negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Nefrologia - Medicina interna	
V03AE10	Ciclosilicato di sodio e zirconio	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Indicato per il trattamento dell'iperkalemia negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Nefrologia - Medicina interna	
V03AF01	Mesna	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
V03AF03	Calcio Folinato	im,ev,os	RR	A		Recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolicco		11
V03AH01	Diazossido	os	RRL	A			Hub e Spoke: - Medicina Generale - Oncologia - Gastroenterologia - Pediatria	
V04CD01	Metirapone	os	RNRL	A-PHT			Hub: - Medicina Generale - Endocrinologia	
V04CJ01	Tireotropina alfa	im	OSP	H			Hub, Spoke e Ospedali generali - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V10XX02	Ibritumomab tiuxetano	ev	OSP	H		Indicato come terapia di consolidamento dopo l'induzione della remissione in pazienti con linfoma follicolare non pretrattati	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia - Oncoematologia <p>Spoke:</p> <p>Rossano:area dedicata di Ematologia In SC Oncologia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia (PO KR) - Ematologia (PO KR) - Microcitemia (PO KR) <p>(DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)</p>	
V10XX03	Ibritumomab tiuxetano	ev	OSP	H		Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non-Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a rituximab	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ematologia - Oncoematologia <p>Spoke:</p> <p>Rossano:area dedicata di Ematologia In SC Oncologia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia (PO KR) - Ematologia (PO KR) - Microcitemia (PO KR) <p>(DCA n. 102/2020 – Rete Ematologica Regionale)</p>	
V10XX03	Radio-223 dicloruro	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia o in associazione con un analogo dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (Luteinising Hormone-Releasing Hormone, LHRH) è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer,mCRPC), con metastasi ossee sintomatiche e senza metastasi viscerali note, in progressione dopo almeno due precedenti linee di terapia sistemica per il mCRPC (diverse dagli analoghi del LHRH) o non eleggibili ai trattamenti sistemici disponibili per il mCRPC 2. limitare l'uso ai pazienti che sono stati sottoposti a due precedenti trattamenti per il carcinoma prostatico metastatico (cancro della prostata che si è diffuso alle ossa) o che non possono ricevere altri trattamenti.	<p>Hub, Spoke e Ospedali generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia 	
V10XX04	Lutezio-177LU-Oxodotreotide	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (NET-GEP) ben differenziati (G1 e G2), progressivi, non asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la somatostatina.	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Radioterapia 	