

Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo della nota AIFA			
Patologia	Trattamento di I Livello	Trattamento di II Livello	Trattamento di III Livello
Ipercolesterolemia familiare monogenica (FH)	<input type="checkbox"/> Simvastatina <input type="checkbox"/> Pravastatina <input type="checkbox"/> Fluvastatina <input type="checkbox"/> Lovastatina <input type="checkbox"/> Atorvastatina <input type="checkbox"/> Rosuvastatina*	<input type="checkbox"/> EZETIMIBE + STATINE in associazione estemporanea o preconstituita* <small>L'uso della combinazione ezetimibe + simvastatina va limitato ai casi documentati in cui sia clinicamente indicato raggiungere livelli di target di C-LDL non raggiunti dalle singole statine, anche a dosaggi elevati o ad alta potenza</small>	Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari
Iperlipidemia familiare combinata	<input type="checkbox"/> Simvastatina <input type="checkbox"/> Pravastatina <input type="checkbox"/> Fluvastatina <input type="checkbox"/> Lovastatina <input type="checkbox"/> Atorvastatina*	<input type="checkbox"/> Rosuvastatina <input type="checkbox"/> PUFA-N3 <input type="checkbox"/> EZETIMIBE + STATINE in associazione estemporanea o preconstituita* <small>L'uso della combinazione ezetimibe + simvastatina va limitato ai casi documentati in cui sia clinicamente indicato raggiungere livelli di target di C-LDL non raggiunti dalle singole statine, anche a dosaggi elevati o ad alta potenza</small>	
Disbetalipoproteinemia	<input type="checkbox"/> Simvastatina <input type="checkbox"/> Pravastatina <input type="checkbox"/> Fluvastatina <input type="checkbox"/> Lovastatina <input type="checkbox"/> Atorvastatina* <input type="checkbox"/> Fibrati	<input type="checkbox"/> Rosuvastatina <input type="checkbox"/> EZETIMIBE + STATINE in associazione estemporanea o preconstituita* <small>L'uso della combinazione ezetimibe + simvastatina va limitato ai casi documentati in cui sia clinicamente indicato raggiungere livelli di target di C-LDL non raggiunti dalle singole statine, anche a dosaggi elevati o ad alta potenza</small>	Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari
Iperchilomicronemie e gravi ipertrigliceridemie	<input type="checkbox"/> Fibrati <input type="checkbox"/> PUFA-N3	<input type="checkbox"/> Fibrati in associazione a PUFA-N3	

Iperlipidemia in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave	
Per i livelli di Trigliceridi ≥ 500 mg/dl	<input type="checkbox"/> PUFA-N3
Per i livelli di C-LDL ≥ 130 mg/dl	<input type="checkbox"/> EZETIMIBE + Simvastatina (1° scelta) <input type="checkbox"/> altre statine a minima escrezione renale (2° scelta)

Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri di cui al relativo paragrafo	
Farmaci immunosoppressori, antiretrovirali, inibitori aromatasi	<input type="checkbox"/> Statine considerando con la massima attenzione l'interferenza con il antiretrovirali, inibitori aromatasi trattamento antiretrovirale altamente attivo (HAART). <input type="checkbox"/> Fibrati nel caso sia predominante l'iper TG. <input type="checkbox"/> Ezetimibe in monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo.

Farmaco (specialità medicinale) _____
Dose e Posologia (Modo e Tempo di somministrazione) _____
Durata prevista del trattamento _____ <i>(Massimo 1 anno di trattamento)</i>
Data di prescrizione _____
Timbro e firma Medico Prescrittore _____