

ALLEGATO E

SPECIE ARBOREE FORESTALI AUTOCTONE UTILIZZABILI PER NUOVI IMPIANTI DI FORESTAZIONE E IMBOSCHIMENTO IN CALABRIA^(*)

Di seguito le specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboschimento suddivise per fasce altimetriche:

fascia 0-400 metri sul livello del mare

- a) leccio (*Quercus ilex* L.)
- b) sughera (*Quercus suber* L.)
- c) pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- d) roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

fascia 400-800 metri sul livello del mare

- f) leccio (*Quercus ilex* L.)
- g) pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- h) acero campestre (*Acer campestre* L.)
- i) carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)
- j) rovere (*Quercus petraea* Liebl.)
- k) farnetto (*Quercus conferta* Kit.)
- l) ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.)
- m) castagno (*Castanea sativa* Mill.)
- n) sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.)
- o) noce (*Juglans regia* L.),

fascia 800-1200 metri sul livello del mare

- p) cerro (*Quercus cerris* L.),
- q) abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- r) pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- s) castagno (*Castanea sativa* Mill.),
- t) acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- u) acero napoletano (*Acer opalus* Mill.),
- v) ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- ww) farnetto (*Quercus frainetto* Ten.),
- x) frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.),
- y) tiglio (*Tilia cordata* Mill.),
- z) ciliegio (*Prunus avium* L.),
- aa) noce (*Juglans regia* L.),
- bb) pioppo bianco (*Populus alba* L.),

- cc) carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.),
- dd) ciavardello (*Sorbus torminalis* L.)
- ee) nocciolo (*Corylus avellana* L.),

fascia 1200-1600 metri sul livello del mare

- ff) faggio (*Fagus sylvatica* L.),
- gg) pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) (Pollino),
- hh) abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- ii) pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- jj) pioppo tremulo (*Populus tremula* L.),
- kk) ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- ll) acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- mm) acero di Lobelius (*Acer lobelii* Ten.),
- nn) acero di riccio (*Acer platanoides* L.),
- oo) maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medik.),
- pp) frassini minori (*Fraxinus ornus* L. e *Fraxinus angustifolia* Vahl.),

fascia 1600-2000 metri sul livello del mare

- qq) pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) Pollino
- rr) faggio (*Fagus sylvatica* L.)
- ss) abete bianco (*Abies alba* Mill.)
- tt) pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabrica* (Land) E. Murray).

(*) Estratto da Regione Calabria PSR 2014-2020 Misura 8 Intervento 8.3.1)