

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A	<b>APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO</b>							
A02BA01	<b>Cimetidina</b>	os,ev	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BA02	<b>Ranitidina</b>	os,ev	RR			Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BA03	<b>Famotidina</b>	os,ev	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BA04	<b>Nizatidina</b>	os	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		48
A02BB01	<b>Misoprostolo</b>	os	RNR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1
A02BC01	<b>Omeprazolo</b>	os,ev	RR/OSP	A/H		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1, 48
A02BC02	<b>Pantoprazolo</b>	os	RR	A		Scheda Regionale DCA Nota 1-48		1, 48

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A02BC03	Lansoprazolo	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48			1, 48
A02BC04	Rabeprazolo	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48			48
A02BC05	Esomeprazolo	os, ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA Nota 1-48			1, 48
A03AB02	Glicopirronio	os	RRL	A-PHT		Trattamento sintomatico della scialorrea severa (ipersalivazione patologica cronica) in bambini e adolescenti di età pari o superiore a tre anni con patologie neurologiche croniche	Hub e Spoke: - Neurologia - Pediatria  Neuropsichiatria infantile	
A04AA05	Palonosetron	ev	OSP	H			Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
A04AA55	Palonosetron/netupitant	os	RRL	H			Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
A05AA03	Acido colico	os	RNRL	H		Trattamento dei difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari primari causati dal deficit di 3β-idrossi-Δ5-C27-steroidi ossidoreduttasi o deficit di Δ4-3- ossosteroidi-5β-reduttasi in lattanti, bambini e adolescenti da 1 mese a 18 anni di età e negli adulti.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A05AA04	Acido obeticolico	os	RRL	H	PT cartaceo AIFA	Trattamento della colangite biliare primitiva (PBC, primary biliary cholangitis) (nota anche come cirrosi biliare primitiva) in combinazione con acido ursodesossilico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA	<b>Hub:</b> - Medicina Generale - Gastroenterologia	
A05AA04	Acido obeticolico	os	RRL	H	PT cartaceo AIFA	Trattamento della colangite biliare primitiva (PBC, primary biliary cholangitis) (nota anche come cirrosi biliare primitiva) in combinazione con acido ursodesossilico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA	<b>Hub:</b> - Medicina Generale - Gastroenterologia	
A05AX04	Maralixibat	os	RRL	H		Indicato per il trattamento del prurito colestatico in pazienti affetti da sindrome di Alagille (ALGS) di età pari e superiore a due mesi	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A05AX05	Odevixibat sesquidrato	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento della colestasi intraepatica familiare progressiva (progressive familial intrahepatic cholestasis, PFIC) in pazienti di età pari o superiore ai sei mesi.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A06AH01	Metilnaltrexone bromuro	sc	RR	A		La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche:  terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative  Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	90
A06AH03	Naloxegol	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche:  terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative  Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	90

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A06AH05	Naldemedina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche:  terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative  Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche (DCA 70/2022)	90
A07AA11	Rifaximina	os	RR/RRL*	A-PHT		Riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età superiore 0 uguale a 18 anni	<b>Hub, Spoke e Ospedali Generali:</b> - Malattie infettive - Medicina Interna - Gastroenterologia	
A07EA06	Budesonide	os	RRL	A-PHT		Indicato per il trattamento dell'esofagite eosinofila (EE) negli adulti (età superiore a diciotto anni)	<b>Hub eSpoke:</b> - Medicina Interna - Gastroenterologia	
A08AA12	Setmelanotide	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati a sindrome di Bardet-Biedl (BBS), geneticamente confermata negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni  Codice di esenzione MR: RN1380	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A08AA12	Setmelanotide	sc	RRL	H		Indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di sei anni	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	Legge 648/96
A09AA02	Pancrelipasi	os	RR	A		Trattamento dell'insufficienza pancreatica esocrina causata da fibrosi cistica, pancreatite cronica, pancreatetomia, gastrectomia totale e resezioni gastriche parziali (Billroth/II), ostruzione duodenale da neoplasie (es. del pancreas o del coledoco)		
A09AA02	Pancrelipasi 35000	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Terapia sostitutiva con enzimi pancreatici per l'insufficienza pancreatica esocrina dovuta a fibrosi cistica o altre condizioni (p. es. pancreatite cronica, pancreatetomia o cancro pancreatico). Le capsule gastroresistenti sono indicate nei bambini, negli adolescenti e negli adulti.	<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Interna - Oncologia - Gastroenterologia - Pediatria  <b>Centro Regionale Fibrosi Cistica</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10AE04	Insulina Glargine 300	sc	RR	A-PHT		Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE04	Insulina Glargine 100	sc	RR	A-PHT		Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE04	Insulina Glargine Biosimilare 100	sc	RR	A-PHT		Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE06	Insulina degludec	sc	RR	A-PHT		Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE54	Insulina glargine + lixisenatide	sc	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello  MMG/PLS  Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10AE56	Insulina degludec + liraglutide	sc	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello  MMG/PLS  Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD07	Sitagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello  MMG/PLS  Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BD08	<b>Vildagliptin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BD09	<b>Alogliptin + pioglitazone</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BD10	<b>Saxagliptin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BD11	<b>Linagliptin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BD13	<b>Alogliptin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BD15	<b>Dapaglifozin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BD16	<b>Canaglifozin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BD19	<b>Empaglifozin + linagliptin</b>	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello  Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista	100
A10BD19	<b>Empaglifozin + linagliptin</b>	os	RRL	A-PHT	Ricetta DEMA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<b>MMG/PLS</b> Il MMG può effettuare la prescrizione mediante ricetta DEMA, nel periodo di validità del PT (Sistema TS) redatto dallo specialista	100
A10BD20	<b>Empaglifozin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello  <b>MMG/PLS</b>  Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD21	<b>Saxagliptin + dapaglifozin</b>	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello  Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista	100
A10BD21	<b>Saxagliptin + dapaglifozin</b>	os	RRL	A-PHT	Ricetta DEMA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<b>MMG/PLS</b> Il MMG può effettuare la prescrizione mediante ricetta DEMA, nel periodo di validità del PT (Sistema TS) redatto dallo specialista	100
A10BD23	<b>Ertuglifozin + metformina</b>	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello  <b>MMG/PLS</b>  Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD24	<b>Ertuglifozin + sitagliptin</b>	os	RRL	A-PHT	Ricetta DEMA	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<b>MMG/PLS</b> Il MMG può effettuare la prescrizione mediante ricetta DEMA, nel periodo di validità del PT (Sistema TS) redatto dallo specialista	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BD24	Ertuglifozin + sitagliptin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p>Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista</p>	100
A10BH01	Sitagliptin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p>Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BH02	Vildagliptin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p>Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BH03	Saxagliptin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p>Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BH04	Alogliptin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p>Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BH05	Linagliptin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p>Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BJ01	Exenatide	sc	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p>Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BJ02	Liraglutide	sc	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BJ03	Lixisenatide	sc	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BJ05	Dulaglutide	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BJ06	Semaglutide	sc,os	RRL/RR	A	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BK01	Dapaglifozin	os	RR/RRL	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018), Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BK01	Dapaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Insufficienza cardiaca - indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia</p> <p>Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS)</p> <p><b>INRCA Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza</b></p>	
A10BK01	Dapaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Endocrinologia - Cardiologia - Medicina interna - Geriatria - Nefrologia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BK02	Canaglifozin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BK03	Empaglifozin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A10BK03	Empaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica classe NYHA II-III con frazione d'elezione compresa tra 41 e 59%	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Endocrinologia</li> </ul> <p>U.O. Medicina D'Urgenza - PO Pugliese-Ciaccio AOU Catanzaro Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS)</p> <p><b>INRCA Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza</b></p>	
A10BK03	Empaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Malattia renale cronica	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Nefrologia</li> </ul>	
A10BK04	Ertuglifozin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	<p><b>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese</b> (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello</p> <p><b>MMG/PLS</b></p> <p><b>Specialisti:</b> Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo</p>	100
A12AA12	Calcio acetato anidro	os	RR	A			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> </ul>	
A16AA01	Levocarnitina	ev	RR	A-PHT		carezza primaria di carnitina	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Generale</li> </ul>	8

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AA01	Levocarnitina	ev	RR	A-PHT		carezza di carnitina secondaria a trattamento dialitico	<b>Hub e Spoke:</b> - Nefrologia - Emodialisi	8
A16AA04	Mercaptamina bitartrato	os	RNRL	A-PHT		Trattamento della cistinosi nefropatica manifesta. La cisteamina riduce l'accumulo della cistina in alcune cellule (ad esempio leucociti e cellule muscolari ed epatiche) di pazienti con cistinosi nefropatica e, se il trattamento è iniziato precocemente, ritarda la comparsa dell'insufficienza renale	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AA05	Acido carginico	os	RNRL	A-PHT			<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiologia - Pediatria - Medicina Generale	
A16AA06	Betaina anidra	os	RNRL	A-PHT			<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Pediatria - Medicina Generale - Epatologia - Nefrologia	
A16AA07	Metreleptina	ev	RRL	H		Indicato in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva per il trattamento delle complicanze da deficit di leptina in pazienti affetti da lipodistrofia (LD): • con diagnosi confermata di LD generalizzata congenita (sindrome di Berardinelli-Seip) o di LD generalizzata acquisita (sindrome di Lawrence) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 2 anni; • con diagnosi confermata di LD parziale familiare o di LD parziale acquisita (sindrome di Barraquer-Simons) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 12 anni, per i quali le terapie standard non sono riuscite a raggiungere un controllo metabolico adeguato	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Endocrinologo - Pediatria	
A16AB02	Imiglucerasi	ev	OSP	H		Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine, in pazienti con diagnosi confermata di Malattia di Gaucher non neuropatica (Tipo 1) o neuropatica cronica (Tipo 3), i quali evidenzino inoltre significative manifestazioni cliniche non neurologiche della malattia	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB04	Agalsidasi beta	ev	OSP	H		Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Fabry (carezza di a-galattosidasi A)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AB05	Laronidasi	ev	RR	H		Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopolisaccaridosi I (MPS I; deficit di a-L-iduronidasi), per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche della patologia	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB07	Alglucosidasi alfa	ev	OSP	H		Terapia enzimatica sostitutiva (ERT) a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Pompe (deficit di a-glicosidasi acida). Indicato negli adulti e nei pazienti pediatrici di qualsiasi eta'	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB09	Idursulfasi	ev	RR	H		Trattamento a lungo termine dei pazienti con sindrome di Hunter (mucopolisaccaridosi II, MPS II)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB10	Velaglucerasi alfa	ev	RR	H		Terapia enzimatica sostitutiva (TES) a lungo termine in pazienti affetti da malattia di Gaucher di tipo 1	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB14	Sebelipasi alfa	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato per la terapia enzimatica sostitutiva (TES) a lungo termine in pazienti affetti da deficit di lipasi acida lisosomiale (LAL) ad esordio precoce (entro il primo anno di vita) e a rapida progressione	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB15	Velmanase alfa	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento di manifestazioni non neurologiche in pazienti affetti da alfa-mannosidosi da lieve a moderata	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB17	Cerliponase alfa	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento della patologia ceroidolipofusinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), nota anche come carenza di tripeptidil-peptidasi 1 (TPP-1)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AB18	Vestronidasi alfa	ev	OSP	H		Indicato per la cura di manifestazioni non neurologiche di mucopolisaccaridosi VII (MPS VII; sindrome di Sly).	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB19	Pegvaliase	sc	RRL	H		Indicato per il trattamento di pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU), di eta' pari e superiore ai sedici anni, che hanno un controllo inadeguato della fenilalanina ematica (livelli ematici di fenilalanina maggiori di 600 micromol/L) nonostante il trattamento precedente con le opzioni terapeutiche disponibili	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB20	Pegunigalsidasi alfa	ev	RR	H		Indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti adulti con diagnosi confermata di malattia di Fabry (deficit di alfa-galattosidasi)  Codice di esenzione MR: RCG080	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB21	Atidarsagene autotemcel	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato per il trattamento della leucodistrofia metacromatica (MLD) caratterizzata da mutazioni bialleliche del gene arilsulfatasi A (ARSA) che comportano una riduzione dell'attività enzimatica di ARSA: - nei bambini con forme infantili tardive o giovanili precoci, senza manifestazioni cliniche della malattia, - nei bambini con la forma giovanile precoce, con manifestazioni cliniche precoci della malattia, che conservano la capacità di camminare autonomamente e prima dell'inizio del declino cognitivo	<b>IRCCS San Raffaele di Milano</b> Pediatria Immunoematologica	
A16AB22	Avalglucosidasi alfa	ev	RR	H		Indicato per la terapia enzimatica sostitutiva (enzyme replacement therapy, ERT) a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Pompe (deficit di a- glucosidasi acida)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB25	olipudasi	ev	RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche del deficit di sfingomielinasi acida (ASMD) di tipo A/B o B in pazienti pediatrici e adulti	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX03	Sodio fenilbutirrato	os	RNRL	A-PHT			<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Generale - Pediatria - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AX04	Nitisinone	os	RR	A-PHT			<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX04	Nitisinone	os	RR	A-PHT		Trattamento di pazienti adulti con alcaptonuria (AKU)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX05	Zinco acetato	os	RNRL	A-PHT			<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Generale - Pediatria - Epatologia - Neurologia - Neuropsichiatria	
A16AX06	Miglustat	os	RRL	A-PHT		Trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX07	Sapropterina	os	RRL	A-PHT	<b>PT cartaceo AIFA</b>	Trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato una risposta a tale trattamento	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX08	Teduglutide	sc	RRL	H		Trattamento di pazienti di 1 anno di età e oltre affetti da sindrome dell'intestino corto (SBS). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito dell'intervento	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX10	Eliglustat	os	RRL	A-PHT		Trattamento a lungo termine di pazienti adulti con malattia di Gaucher di tipo 1 (GD1) che sono metabolizzatori lenti (poor metabolisers, PMs), metabolizzatori intermedi (intermediate metabolisers, IMs) o metabolizzatori estensivi (extensive metabolisers, EMs) per CYP2D6.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AX12	<b>Trientina tetraidrocloridrato</b>	os	RNRL	A-PHT		Indicato per il trattamento del morbo di Wilson in adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 5 anni intolleranti alla terapia con D-penicillamina	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX14	<b>Migalastat</b>	os	RRL	A-PHT		Trattamento a lungo termine negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni, con una diagnosi accertata di malattia di Fabry (carenza dell'a-galattosidasiA) e caratterizzati da una mutazione suscettibile	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX16	<b>Givosiran</b>	sc	RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento della porfiria epatica acuta (AHP) in adulti e adolescenti di età pari e superiore ai dodici anni.	<b>Hub:</b> - Medicina - Epatologia - Ematologia	
A16AX18	<b>Lumasiran</b>	sc	RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato per il trattamento dell'iperossaluria primitiva di tipo 1 (PH1) in tutte le fasce d'età	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
<b>B</b>	<b>SISTEMA SANGUE ED EMOPOIESI</b>							
B01AA03	<b>Warfarin</b>	os	RR	A	<b>Sistema TS</b>	La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97	<b>MMG</b>  <b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)	97

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AA07	Acenocumarolo	os	RR	A	Sistema TS	La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Centri trombotici ed emostasi</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</li> </ul>	97
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	<p>GU n. 183 del 06.08.2016</p> <p>GU n. 295 del 19.12.2016</p>	Legge 648/96
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	<p>GU n. 183 del 06.08.2016</p> <p>GU n. 302 del 28.12.2016</p>	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB04	<b>Dalteparina Sodica</b>	sc	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA ≥ 3)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB05	<b>Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare</b>	sc,ev	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 295 del 19.12.2016	Legge 648/96
B01AB05	<b>Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare</b>	sc,ev	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB05	<b>Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare</b>	sc,ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA ≥ 3) (Legge 648/96)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB06	<b>Nadroparina Calcica</b>	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 295 del 19.12.2016	Legge 648/96
B01AB06	<b>Nadroparina Calcica</b>	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB06	<b>Nadroparina Calcica</b>	sc	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA $\geq$ 3)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB07	<b>Parnaparina</b>	sc	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB07	<b>Parnaparina</b>	sc	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA $\geq$ 3)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB08	Reviparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB08	Reviparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	Profiliassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA $\geq$ 3) (Legge 648/96)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB09	Danaparoid	ev	RR	H		Trattamento di disturbi tromboembolici in pazienti che necessitano di anticoagulazione parenterale urgente a causa dello sviluppo o di anamnesi di HIT	<b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia - Medicina Interna - Chirurgia - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB09	<b>Danaparoid</b>	ev	RR	H		Prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) in situazioni in cui non deve essere usata l'eparina, compresi pazienti con trombocitopenia indotta da eparina (HIT)	<b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia - Medicina Interna - Chirurgia - Ematologia	
B01AB10	<b>Tinzaparina</b>	sc	RR	A-PHT		1. Profilassi della tromboembolia venosa (TEV) in pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico, in particolare ortopedico, generale o oncologico. 2. Profilassi della tromboembolia venosa in pazienti adulti non chirurgici, immobilizzati a causa di una condizione clinica acuta, ivi incluse: insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria acuta, infezioni gravi, neoplasia attiva nonché esacerbazioni di malattie reumatiche. 3. Prevenzione della coagulazione nei circuiti extracorporei durante l'emodialisi e l'emofiltrazione negli adulti. 4. Trattamento della trombosi e della malattia tromboembolica venosa (TEV), ivi inclusi la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare negli adulti. 5. Trattamento prolungato della tromboembolia venosa e prevenzione delle recidive in pazienti adulti con neoplasia attiva. Per alcuni pazienti con embolia polmonare (per esempio quelli con instabilità emodinamica grave), può essere indicato un trattamento alternativo, quale l'intervento chirurgico o la trombolisi.		
B01AB12	<b>Bemiparina sodica</b>	sc	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB12	<b>Bemiparina sodica</b>	sc	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA EBPM</b>	Profiliassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA ≥ 3)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AC09	<b>Epoprostenolo</b>	ev	RRL	H			<b>Hub:</b> - Cardiologia (AO CS, AOU CZ)  <b>Spoke:</b> - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	
B01AC11	<b>Iloprost Sale Di Trometamolo</b>	ev	RRL	A-PHT		Ipertensione polmonare	<b>Hub:</b> - Cardiologia (AO CS, AOU CZ , GOM RC) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC)  <b>Spoke:</b> - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)  - Cardiologia Riabilitativa (AOU CZ) - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AC22	<b>Prasugrel</b>	os	RR	A-PHT	<b>PT Cartaceo AIFA</b>	Sindrome coronarica acuta	<b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia	
B01AC24	<b>Ticagrelor</b>	os	RR	A-PHT	<b>PT Cartaceo AIFA</b>	In associazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta (SCA) o storia di infarto miocardico (IM) ed un alto rischio di sviluppare un evento aterotrombotico	<b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia - Medicina Interna  - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona) Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS)	
B01AC25	<b>Cangrelor</b>	ev	OSP	H		In co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti adulti con cardiopatia coronarica sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI, percutaneous coronary intervention) che non hanno ricevuto un inibitore orale del recettore P2Y12 prima della procedura di PCI e nei quali la terapia con gli inibitori del recettore P2Y12 per via orale non è fattibile o auspicabile	<b>Hub:</b> - Cardiologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AC27	<b>Selexipag</b>	os	RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in Classe Funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette.	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiologia - Pneumologia - Reumatologia	
B01AD02	<b>Alteplase</b>	ev	OSP	H			<b>Hub e Spoke:</b> - Neurologia - Cardiologia - Emodinamica	
B01AE07	<b>Dabigatran etexilato</b>	os	RR	A	<b>Sistema TS</b>	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)	<b>MMG</b>  <b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova - ASP RC	97

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AE07	<b>Dabigatran etexilato</b>	os	RRL	A	<b>PT web-based AIFA</b>	Trattamento e Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Medicina D'Urgenza</li> </ul> <p>Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC</p>	
B01AF01	<b>Rivaroxaban</b>	os	RR	A	<b>Sistema TS</b>	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Centri trombotici ed emostasi</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</li> <li>- Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC</li> </ul>	97
B01AF01	<b>Rivaroxaban</b>	os	RRL	A	<b>PT web-based AIFA</b>	Trattamento e Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Medicina D'Urgenza</li> </ul> <p>Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AF02	Rivaroxaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 mg/ml - granuli per sospensione orale - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei neonati a termine, nei lattanti e bambini piccoli, nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale"</li> <li>• 15 mg - compressa rivestita con film - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso compreso tra 30 kg e 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale"</li> <li>• 20 mg - compressa rivestita con film - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso superiore a 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale"</li> </ul>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pediatria</li> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Ematologia</li> </ul>	
B01AF02	Rivaroxaban	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	<p>Rivaroxaban somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia ( coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (peripheral artery disease, PAD) sintomatica</p>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>Chirurgia cardiovascolare</li> <li>Angiologia</li> </ul>	
B01AF02	Apixaban	os	RR	A-PHT	Sistema TS	<p>Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)</p> <p>La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97</p>	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Centri trombotici ed emostasi</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</li> <li>Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC</li> </ul>	97

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AF02	<b>Apixaban</b>	os	RRL	A-PHT	<b>PT web-based AIFA</b>	Trattamento e Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Medicina D'Urgenza</li> </ul> <p>Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC</p>	
B01AF03	<b>Edoxaban</b>	os	RR	A-PHT	<b>Sistema TS</b>	<p>Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)</p> <p>La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97</p>	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Centri trombotici ed emostasi</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</li> <li>- Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC</li> </ul>	97
B01AF04	<b>Edoxaban</b>	os	RRL	A-PHT	<b>PT web-based AIFA</b>	Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti.	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Medicina D'Urgenza</li> </ul> <p>Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AX07	<b>Caplacizumab</b>	ev	RRL	H		Trattamento negli adulti degli episodi di porpora tromboticatomboocitopenica (PTT) acquisita, in associazione a plasmaferesi (plasma exchange, PE) e immunosoppressione.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
B02AB02	<b>Alfa1-antitripsina</b>	ev	RNRL	H		Terapia cronica sostitutiva in soggetti con carenza congenita di inibitore dell'alfa1-proteinasi	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD01	<b>Fattore IX, II, VII, X della coagulazione, prot. c, prot. s.</b>	ev	OSP	H			<b>Hub:</b> - Centri di Emofilia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD02	<b>Efmoroctocog</b>	ev	RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	<b>Moroctocog Alfa - (Fattore VIII di Coagulazione, Ricombinante)</b>	ev	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	<b>Octocog alfa</b>	ev	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD02	<b>Fattore VIII Di Coagulazione Del Sangue Umano Liofilizzato</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	<b>Turoctocog alfa</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	<b>Turoctocog alfa pegol</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti a partire da 12 anni affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII).	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD02	<b>Lonoctocog</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito del fattore VIII). Può essere utilizzato in pazienti di tutti i gruppi di età.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	<b>Rurioctocog Alfa Pegol</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti dai 12 anni in poi affetti da emofilia A	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	<b>Damoctocog Alfa Pegol</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti dai 12 anni in poi affetti da emofilia A	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD03	Complesso protrombinico attivato-fattore VIII	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	Fattore IX Di Coagulazione Del Sangue Umano Liofilizzato	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD04	nonacog beta pegilato - fattore IX di coagulazione ricombinante	ev	RR	A-PHT		Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti da 12 anni in su affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD04	<b>Eftrenonacog</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD04	<b>Albutreponacog alfa</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e la profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia B (carezza congenita di fattore IX); può essere usato per tutti i gruppi d'età.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD04	<b>Nonacog gamma</b>	ev	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX), adatto a pazienti di tutte le fasce di età.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD05	<b>Fattore VII della coagulazione sangue umano liofilizzato</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD06	<b>Fattore Von Willebrand umano</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	<b>Nonacog alfa (Fattore IX di Coagulazione, Ricombinante)</b>	ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX), adatto a pazienti di tutte le fasce di età.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01BD11	<b>Catridecacog</b>	ev	OSP	H			Hub: - Centri di Emofilia	
B01BD15	<b>Valoctogene roxaparovec</b>	ev	OSP	H		Trattamento dell'emofilia A grave (deficit congenito di fattore VIII) in pazienti adulti senza anamnesi di inibitori del fattore VIII e senza anticorpi rilevabili anti-virus adeno-associato del sierotipo 5 (AAV5)	U.O. Emofilia e Patologie della Coagulazione - Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Trasfusionale - Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dulbecco" - Catanzaro	
B02BD14	<b>Susoctocog alfa</b>	ev	OSP	H		Negli adulti per il trattamento degli episodi emorragici in pazienti con emofilia acquisita causata da anticorpi nei confronti del fattore VIII.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BX04	<b>Romiplostim</b>	sc	RR	H		Indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) (PTI) cronica che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline)	<p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p> <p><b>Spoke:</b> - Ematologia (KR) - Microcitemia (KR)</p>	
B02BX05	<b>Eltrombopag</b>	ev,os	RR	H		Indicato in pazienti di età superiore ad 1 anno per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)	<p><b>Hub:</b> - Ematologia - Oncoematologia Pediatrica</p> <p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p> <p><b>Spoke:</b> - Microcitemia (POKR)</p>	
B02BX05	<b>Eltrombopag</b>					Indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche	<p><b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b></p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BX06	<b>Emicizumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A severa (deficit congenito di fattore VIII, FVIII < 1%) senza inibitori del fattore VIII. Il farmaco può essere usato in tutte le fasce d'età	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX06	<b>Emicizumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII); senza inibitori del fattore VIII che presentano malattia moderata (FVIII $\geq$ 1% e $\leq$ 5%) con fenotipo emorragico severo	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX07	<b>Lusutrombopag</b>	os	RNRL	H		Trattamento della trombocitopenia severa in pazienti adulti affetti da malattia epatica cronica sottoposti a procedure invasive	<b>Hub:</b> - Ematologia - Medicina Interna - Gastroenterologia  <b>Spoke:</b> Gastroenterologia (PO KR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BX08	<b>Avatrombopag</b>	os	RR	H		Trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) primaria cronica nei pazienti adulti refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX08	<b>Avatrombopag</b>	os	RR	H		Trattamento della trombocitopenia grave, nei pazienti adulti con malattia epatica cronica (CLD) e programmati per essere sottoposti a una procedura invasiva	<b>Hub e Spoke:</b> - Ematologia - Medicina Interna - Gastroenterologia	
B02BX09	<b>Fostamatinib</b>	os	RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) cronica in pazienti adulti refrattari a trattamenti di prima linea quali corticosteroidi e immunoglobuline in vena e refrattari o che presentano controindicazioni ad almeno uno tra tpo-ra e rituximab	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03AC	<b>Derisomaltosio ferrico</b>	ev	OSP	H		Indicato negli adulti per il trattamento della carenza di ferro nelle seguenti condizioni: - quando le preparazioni di ferro per via orale sono inefficaci o non possono essere utilizzate; - quando vi è l'esigenza clinica di somministrare ferro rapidamente.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
B03XA01	<b>Eritropoietina alfa originator e biosimilare</b>	ev,sc	RNRL	A-PHT	<b>PT online webcare</b>		<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiocirurgia</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Medicina</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Anestesia</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> </ul>	
B03XA01	<b>Eritropoietina beta</b>	ev,sc	RNRL	A-PHT	<b>PT online webcare</b>		<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiocirurgia</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Medicina</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Anestesia</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA01	Eritropoietina zeta	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare		<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiocirurgia</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Medicina</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Anestesia</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodioalisi</li> </ul>	
B03XA01	Eritropoietina teta	ev,sc	RNRL	A	PT online webcare		<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiocirurgia</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Medicina</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Anestesia</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodioalisi</li> </ul>	
B03XA02	Darbepoietina Alfa	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare		<p><b>Hube Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiocirurgia</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Anestesia</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodioalisi</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA03	Metossipolietilenglicole-epoetina beta	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare		<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiocirurgia</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Anestesia</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodioalisi</li> </ul>	
B03XA05	Roxadustat	os	RNRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica (MRC)	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nefrologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Ematologia</li> </ul>	
B03XA06	Luspatercept	sc	RNRL	A	PT web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente dovuta a sindrome mielodisplastica (SMD) a rischio molto basso, basso e intermedio, che presentano sideroblasti ad anello con risposta insoddisfacente o non idonei a terapia basata su eritropoietina.	<p><b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA06	Luspatercept	sc	RNRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente, associata a beta-talassemia.	Rete Talassemia Regionale DCA n. 206/2023 Centro Hub e Centri Spoke di II livello	
B05AA01	Albumina Umana Soluzione	ev	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 15	In seguito a paracentesi evacuativa nella cirrosi epatica grave	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terapia Intensiva</li> <li>- Rianimazione</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Cardiologia</li> <li>- Malattie infettive</li> <li>- Pneumologia</li> <li>- Servizi trasfusionali</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> </ul> <p>Ambulatorio di Gastroenterologia della Struttura Polispecialistica Gallico - Reggio Calabria - ASP Reggio Calabria</p>	15
B05AA01	Albumina Umana Soluzione	ev	RR	A/C	Scheda Regionale DCA Nota 15	Grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento, non responsive a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terapia Intensiva</li> <li>- Rianimazione</li> <li>- Chirurgia</li> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Cardiologia</li> <li>- Malattie infettive</li> <li>- Pneumologia</li> <li>- Servizi trasfusionali</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Epatologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Nefrologia</li> <li>- Emodialisi</li> </ul>	15

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B06AC01	Inibitore umano della C1-esterasi	ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B06AC01	Inibitore umano della C1-esterasi	ev,sc	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Prevenzione degli attacchi di angioedema ereditario (HAE) ricorrenti negli adolescenti e negli adulti con deficit di inibitore della C1-esterasi	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B06AC02	Icatibant acetato	sc	RR	H		Indicato per la terapia sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario (AEE) negli adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni, con carenza di inibitore esterasi C1	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B06AC05	Lanadelumab	sc	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA			
B06AC06	Bertralstat	os	RRL	h	PT Cartaceo AIFA	Prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario (HAE) in pazienti adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età Codice di esenzione MR: RC0190	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
<b>C</b>	<b>SISTEMA CARDIOVASCOLARE</b>							
C01DX22	Vericiguat	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica in pazienti adulti con ridotta frazione di eiezione stabilizzati dopo un recente evento di riacutizzazione che abbia richiesto una terapia per via endovenosa	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria  Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS)	
C01BD07	Dronedarone	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Indicato per il mantenimento del ritmo sinusale a seguito di cardioversione con esito soddisfacente in pazienti adulti clinicamente stabili con fibrillazione atriale (FA) parossistica o persistente. Dato il suo profilo di sicurezza deve essere prescritto solo dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento	Hub e Spoke: - Cardiologia - Cardiocirurgia - Medicina e Chirurgia d'accettazione urgenza (MCAE)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C01EB18	Ranolazina	os	RR	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Indicato negli adulti come terapia aggiuntiva nel trattamento sintomatico dei pazienti con angina pectoris stabile non adeguatamente controllati con le terapie antianginose di prima linea, come i betabloccanti e/o i calcioantagonisti, o che non le tollerano	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Medicina Generale</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Medicina Interna</li> </ul>	
C01EB21	Regadenoson	ev	OSP	C		<p>Medicinale solo per uso diagnostico. Vasodilatatore coronarico selettivo da utilizzarsi negli adulti come agente per stress farmacologico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'imaging di perfusione miocardica (myocardial perfusion imaging, MPI) con radionuclidi in pazienti incapaci di sottoporsi a un adeguato sforzo fisico.</li> <li>• la misurazione della riserva frazionale di flusso (FFR) di una singola stenosi dell'arteria coronaria durante l'angiografia coronarica invasiva, quando non sono previste misurazioni ripetute dell'FFR</li> </ul>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Nucleare</li> </ul>	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		Ipertensione Arteriosa Polmonare	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Pneumologia</li> <li>- Reumatologia (solo GOM RC)</li> <li>- Medicina Generale (solo AOU CZ)</li> </ul> <p>Poliniclinico Madonna della Consolazione (ASP RC)</p>	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		Sclerodermia	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> </ul>	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		Ulcere digitali	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C02KX02	Ambrisentan	os	RRL	A-PHT		Ipertensione Arteriosa Polmonare	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Pneumologia (GOM RC)</li> <li>- Reumatologia (GOM RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Castrovillari, Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</li> </ul>	
C02KX02	Ambrisentan	os	RRL	A-PHT		Sclerodermia	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> </ul>	
C02KX04	Macitentan	os	RRL	A-PHT		Ipertensione Arteriosa Polmonare	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Pneumologia (GOM RC)</li> <li>- Reumatologia (GOM RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Castrovillari, Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</li> </ul>	
C02KX05	Riociguat	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Pneumologia</li> <li>- Cardiocirurgia</li> <li>- Reumatologia (GOM RC)</li> </ul>	
C03DA05	Finerenone	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	<p>Trattamento dei pazienti adulti con malattia renale cronica (stadi 3 e 4 con albuminuria) associata a diabete mellito di tipo 2, in trattamento con ACEi/ARB alla massima dose tollerata e che presentino una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) controindicazione o intolleranza agli inibitori SGLT2;</li> <li>2) comprovata evidenza di persistente albuminuria e/o rapido declino funzionale renale (perdita di eGFR <math>\geq</math> 3 mL/min/anno), nonostante il trattamento con inibitori SGLT2</li> </ol>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Nefrologia</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C03XA01	<b>Tolvaptan</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>Scheda multifarmaco semplificata AIFA</b>	Indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 2 a 4 precoce (GFR $\geq$ 25 mL/min) all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione.	<b>Hub:</b> - Nefrologia	
C03XA01	<b>Tolvaptan</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento di pazienti adulti con iponatremia endocrina secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH)	<b>Hub e Spoke:</b> - Endocrinologia - Nefrologia - Oncologia	
C07AA05	<b>Propranololo Cloridrato</b>	os	RR/RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>		<b>Hub:</b> - Pediatria - Neonatologia - Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Vascolare - Dermatologia - Cardiologia Pediatrica - Chirurgia Plastica	
C07AB14	<b>Landiololo Cloridrato</b>	ev	OSP	C		Tachicardia sopraventricolare e per il rapido controllo della frequenza ventricolare in pazienti con fibrillazione atriale o flutter atriale in circostanze peroperatorie, postoperatorie o di altro genere, dove si giudichi necessario il controllo a breve termine della frequenza ventricolare con un farmaco di breve durata d'azione.	<b>Hub e Spoke:</b> -Cardiologia	
C07AB14	<b>Landiololo Cloridrato</b>	ev	OSP	C		Tachicardia sinusale non compensatoria laddove, secondo il giudizio del medico, la frequenza cardiaca accelerata richieda un intervento specifico	<b>Hub e Spoke:</b> -Cardiologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C08CA16	<b>Clevidipina</b>	ev	OSP	H		Indicato per la rapida riduzione della pressione arteriosa durante la fase perioperatoria	<b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia interventistica - Cardiocirurgia	
C09BX05	<b>Ramipril/Bisoprololo</b>	os	RR	A		per i dosaggi da 2,5 mg/2,5 mg, 5 mg/2,5 mg, 5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg e 10 mg/10 mg: Indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione e/o dell'ipertensione con coesistente sindrome cronica coronarica: - in pazienti con malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronopatia o ictus o malattia vascolare periferica) oppure - diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare e/o scompenso cardiaco cronico con ridotta funzione sistolica ventricolare sinistra (prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dalla fase acuta di infarto miocardico in pazienti con segni clinici di scompenso cardiaco, quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto). In pazienti adulti adeguatamente controllati con ramipril e bisoprololo somministrati contemporaneamente allo stesso livello di dose		
C09BX05	<b>Ramipril/Bisoprololo</b>	os	RR	A		per il dosaggio da 2,5 mg/1,25 mg: Ramipril è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento della sindrome coronarica cronica (in pazienti con una storia di infarto del miocardio e/o rivascolarizzazione) e/o insufficienza cardiaca cronica con ridotta funzionalità sistolica ventricolare sinistra in pazienti adulti adeguatamente controllati con ramipril e bisoprololo somministrati in concomitanza allo stesso dosaggio		
C09DX04	<b>Sacubitril/valsartan</b>	os	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Cardiologia - Geriatria  U.O. Medicina D'Urgenza - PO Pugliese-Ciaccio AOU Catanzaro	
C10AA01	<b>Simvastatina</b>	os	RR	A	<b>Scheda Regionale DCA Nota 13</b>			13

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AA02	<b>Lovastatina</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AA03	<b>Pravastatina</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AA04	<b>Fluvastatina</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AA05	<b>Atorvastatina</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AA07	<b>Rosuvastatina</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AB02	<b>Bezafibrato</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AB04	<b>Gemfibrozil</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AB05	<b>Fenofibrato</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AX06	<b>Omega 3 trigliceridi inclusi altri esteri ed acidi</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13
C10AX09	<b>Ezetimibe</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13			13

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AX12	Lomitapide	os	RNRL	A-PHT			<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Medicina Generale</li> </ul>	
C10AX13	Evolocumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	<p><b>Ipercolesterolemia e dislipidemia mista</b> Indicato nei pazienti adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o da dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in associazione ad una statina o ad una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti che non raggiungono livelli di LDL-C target con la dose massima tollerata di una statina, oppure</li> <li>- in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso di statine è controindicato.</li> </ul> <p><b>Ipercolesterolemia familiare omozigote</b> Indicato in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti negli adulti e negli adolescenti di almeno 12 anni di età con ipercolesterolemia familiare omozigote.</p> <p><b>Malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata</b> Indicato negli adulti con malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata (infarto del miocardio, ictus o arteriopatia periferica) per ridurre il rischio cardiovascolare riducendo i livelli di C-LDL, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in associazione alla dose massima tollerata di statina con o senza altre terapie ipolipemizzanti oppure,</li> <li>- in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso di statine è controindicato.</li> </ul>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina interna</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Diabetologia</li> </ul>	
C10AX14	Alirocumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	<p><b>Ipercolesterolemia primaria e dislipidemia mista</b> Praluent è indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote o non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in associazione ad una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per il colesterolo LDL (C-LDL) con la dose massima tollerata di statine, oppure</li> <li>- in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata.</li> </ul> <p><b>Malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata</b> Praluent è indicato negli adulti con malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata per ridurre il rischio cardiovascolare riducendo i livelli di C-LDL, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in associazione alla dose massima tollerata di statina con o senza altre terapie ipolipemizzanti oppure,</li> <li>- in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso delle statine è controindicato.</li> </ul>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina interna</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Diabetologia</li> </ul>	
C10AX15	Acido bempedoico	os	RR	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	<p>Indicato negli adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in associazione a una statina o con una statina in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti nei pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi di LDL-C con la dose massima tollerata di una statina oppure</li> <li>• in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o nei quali ne è controindicato l'uso.</li> </ul>	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina interna,</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Diabetologia</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AX16	Inclisiran	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: in associazione a una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per l'LDL-C con la dose massima tollerata di una statina, oppure: in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina interna</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Endocrinologia</li> </ul> <p>Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS)</p>	
C10AX18	Volanesorsen	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato come coadiuvante della dieta in pazienti adulti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare (FCS) confermata geneticamente e ad alto rischio di pancreatite, in cui la risposta alla dieta e alla terapia di riduzione dei trigliceridi è stata inadeguata	<p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
C10AB05	Atorvastatina/Ezetimibe	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	<p><u>Classe A:</u> In aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in pazienti adulti per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, incluso l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista), già adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi</p>		13
C10AB06	Rosuvastatina/Ezetimibe	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	<p><u>Classe A:</u> In aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in pazienti adulti per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, incluso l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista), già adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi</p>		13
C10BA10	Acido bempedoico/ezetimibe	os	RR	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	<p>Indicato negli adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in combinazione con una statina nei pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi di colesterolo-lipoproteina a bassa densità (low density lipoprotein-cholesterol,LDL-C) con la dose massima tollerata di una statina oltre a ezetimibe;</li> <li>• in monoterapia in pazienti intolleranti alle statine o nei quali ne è controindicato l'uso, e che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di LDL-C solo con ezetimibe; nei pazienti già in trattamento con l'associazione di acido bempedoico ed ezetimibe sotto forma di compresse distinte con o senza statina</li> </ul>	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Medicina interna</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Diabetologia</li> </ul>	
D	<b>DERMATOLOGICI</b>							

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D03BA	Enzimi proteolitici	loc	OSP	H		Rimozione dell'escara in ustioni profonde a spessore parziale o completo	Centro Grandi Ustionati	
D03AX13	Estratto di corteccia di betulla	loc	RRL	H		Trattamento di lesioni a spessore parziale associate a epidermolisi bollosa (EB) distrofica e giunzionale nei pazienti di età pari o superiore a sei mesi	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
D06BB10	Imiquimod 5%	loc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA		<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Ginecologia - Oncologia - Dermatologia	
D06BB10	Imiquimod 3,75%	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	95
D06BX03	Tirbanibulina	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	Trattamento cutaneo della cheratosi attinica, non ipercheratosica, non ipertrofica (Olsen di grado 1) del viso o del cuoio capelluto, negli adulti	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	95
D07AB19	Desametasone	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	88
D07AC01	Betametasone Valerato	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	88

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D07AC06	<b>Diflucortolone Valerato</b>	loc	RR	C/A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	88
D07AC14	<b>Metilprednisolone Aceponato</b>	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	88
D07AD01	<b>Clobetasolo Propionato</b>	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	88
D07AD02	<b>Alcinonide</b>	loc	RR	A		Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	88
D11AH01	<b>Tacrolimus</b>	loc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	
D11AH08	<b>Dupilumab</b>	sc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Trattamento dell'esofagite eosinofila in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni, con un peso di almeno 40 kg, non adeguatamente controllati da, intolleranti a, o che non sono candidati per la terapia farmacologica convenzionale, inclusa la budesonide autorizzata per la medesima indicazione, secondo le modalità previste dai singoli RCP	<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Interna - Gastroenterologia	
D11AH08	<b>Dupilumab</b>	sc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Trattamento di adulti con prurigo nodulare (PN) grave eleggibili per la terapia sistemica che presentano tutte le seguenti caratteristiche: valutazione del prurito con scala NRS $\geq 7$ , presenza di un numero di noduli $\geq 20$ e IGA = 4	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D11AH08	Dupilumab	sc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	<p>Trattamento aggiuntivo di mantenimento a carico del SSN è limitato ai pazienti adulti, agli adolescenti e ai bambini, e di età pari o superiore a 6 anni con asma grave con infiammazione di tipo 2 che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eosinofili ematici <math>\geq</math> 150/mmc OPPURE ossido nitrico esalato <math>&gt;</math>25 ppm;</li> <li>• almeno due esacerbazioni d'asma trattate con steroidi sistemici o che hanno richiesto il ricovero nonostante la massima terapia inalatoria (dose alta per età <math>&gt;</math>12 aa, dose medio-alta per età fra 6 e 11 aa) nei 12 mesi precedenti, OPPURE ha ricevuto, nell'ultimo anno, una terapia continuativa con steroidi per via orale per almeno 6 mesi per età <math>&gt;</math> 18 anni, e per almeno 1 mese per età compresa fra i 6 e i 17 anni, in aggiunta alla terapia inalatoria</li> </ul>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pneumologia</li> <li>- Allergologia</li> <li>- Immunologia</li> <li>- Pediatria</li> </ul>	
D11AH08	Dupilumab	sc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Trattamento della dermatite atopica severa nei bambini di età compresa tra sei mesi e i cinque anni eleggibili per la terapia sistemica	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermatologia</li> </ul>	
D11AH08	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, negli adulti eleggibili per la terapia sistemica	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermatologia</li> <li>- Allergologia</li> </ul>	
D11AH05	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni eleggibili per la terapia sistemica	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermatologia</li> <li>- Allergologia</li> <li>- Pediatria</li> </ul>	
D11AH08	Abrocitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermatologia</li> </ul>	
D11AH09	Ruloxitinib	loc	RNRL	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Indicato per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e BSA affetta da vitiligine compresa tra 0,5% e 10% negli adulti e negli adolescenti a partire dai dodici anni di età	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermatologia</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D11AH06	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	PT cartaceo AIFA	Indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni come trattamento aggiuntivo di mantenimento per l'asma grave con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli eosinofili ematici e/o del FeNO, non adeguatamente controllati con ICS (corticosteroidi per via inalatoria) a dosaggio alto e un altro prodotto medicinale per il trattamento di mantenimento	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria	
D11AH07	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) grave per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non fornisce un controllo adeguato della malattia	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Allergologia - Immunologia - ORL	
D11AH07	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	Dermatite atopica bambini di età compresa tra 6 e 11 anni eleggibili per la terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia - Allergologia - Pediatria	
D11AH07	Tralokinumab	sc	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adolescenti (12- 17 anni) che sono candidati alla terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	
D11AH07	Tralokinumab	sc	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in adulti che sono candidati alla terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	
D11AX18	Diclofenac in ialuronato	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto Per localizzazioni al tronco e/o al cuoio capelluto	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	95
D11AX19	Alitreionina	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Eczema cronico severo	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia	
G	<b>SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI</b>							

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G02AD06	<b>Misoprostolo</b>	vag/os	OSP	C		Indicato per l'induzione del travaglio	<b>Hub, Spoke:</b> - Ostetricia - Ginecologia	
G02CB03	<b>Cabergolina</b>	os	RNR	A			<b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Geriatria - Neurologia - Neuropsichiatria - Psichiatria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03BA03	<b>Testosterone (enantato/undecanoato)</b>	os,im,loc	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	ipogonadismi maschili primitivi e secondari caratterizzati da ridotte concentrazioni di testosterone totale (< 12 nmoli/L o 350 ng/dL) in presenza di sintomi tipici (riduzione del desiderio e potenza sessuale, osteoporosi, riduzione forza muscolare, obesità viscerale, alterazioni del tono dell'umore)	<p><u>Testosterone os e im</u></p> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Medicina generale</li> <li>- Urologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Fisiopatologia della riproduzione (A.O. Cosenza)</li> </ul>	36
G03BA03	<b>Testosterone (enantato/undecanoato)</b>	os,im,loc	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>		<p><u>Testosterone loc</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Urologia</li> <li>- Andrologia</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03BB01	<b>Mesterolone</b>	os	RNRL	C			<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Urologia</li> </ul>	
G03GA02	<b>Menotropina</b>	im	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA Nota 74</b>	<p>MEROPUR Iperstimolazione ovarica controllata per l'induzione dello sviluppo follicolare multiplo durante tecniche di riproduzione assistita (ART) [ad esempio: fertilizzazione in vitro/trasferimento embrionale (FIVET), trasferimento di gameti all'interno delle tube (GIFT) e iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI)]</p> <p>MERIOFERT Induzione dell'ovulazione: per l'induzione dell'ovulazione in donne con amenorrea o con anovulazione che non hanno risposto al trattamento con clomifene citrato.</p>	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b></p> <p><b>CENTRI I LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS</li> <li>- C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS</li> <li>- Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ</li> <li>- Urogyn Biotec Srl - Catanzaro</li> <li>- Genesis - Cosenza</li> <li>- Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</li> </ul> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS)</li> <li>- C.I.S. Medicina della Riproduzione - Lamezia Terme (CZ)</li> <li>- Gatic Sas - Gioia Tauro (RC)</li> <li>- Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</li> </ul> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</li> </ul> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ginecologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Urologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA04	Urofollitropina	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	<p><b>Sterilità femminile:</b> Induzione dell'ovulazione, in associazione con gonadotropina corionica, in pazienti affette da sindrome dell'ovaio policistico; amenorrea o stati anovulatori da insufficienza della fase follicolare; altri stati di infertilità associata ad un aumentato rapporto LH/FSH.</p> <p>Indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte ad induzione dell'ovulazione nei programmi di fertilizzazione in vitro (IVF) ed altre tecniche di riproduzione assistita (FIVET-GIFT-ZIFT)</p> <p><b>Sterilità maschile:</b> Induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo, in associazione alla gonadotropina corionica umana (hCG)</p>	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b> <b>CENTRI I LIVELLO:</b> - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b> - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - C.I.S. Medicina della Riproduzione - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b> - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p><b>Hub e Spoke:</b> - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	<p><b>Nella donna adulta:</b> - Anovulazione (inclusa la sindrome dell'ovaio policistico) in donne che non rispondono al trattamento con clomifene citrato. - Stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte a tecniche di riproduzione assistita (Assisted Reproductive Technology, ART), come la fertilizzazione in vitro (In Vitro Fertilisation, IVF), trasferimento di gameti all'interno delle tube o trasferimento di zigoti all'interno delle tube. - In associazione ad una preparazione a base di ormone luteinizzante (Luteinising Hormone, LH), è raccomandato per la stimolazione dello sviluppo follicolare e dell'ovulazione in donne con grave insufficienza di LH ed FSH. Negli studi clinici tali pazienti venivano identificate in base a livelli sierici di LH endogeno &lt;1,2 UI/L.</p> <p><b>Nell'uomo adulto:</b> La follitropina alfa è indicata nella induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo congenito o acquisito, in associazione alla gonadotropina corionica umana (human Chorionic Gonadotropin, hCG)</p>	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b> <b>CENTRI I LIVELLO:</b> - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b> - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - C.I.S. Medicina della Riproduzione - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b> - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p><b>Hub e Spoke:</b> - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA06	Follitropina beta	im	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	<p><b>Nelle donne adulte:</b> Indicato nel trattamento dell'infertilità femminile nelle seguenti condizioni cliniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anovulazione (inclusa la sindrome policistica dell'ovaio, PCOS) in donne che non hanno risposto al trattamento con clomifene citrato.</li> <li>Iperstimolazione controllata delle ovaie, per indurre lo sviluppo di follicoli multipli, nei protocolli di riproduzione assistita [per es. fecondazione in vitro/trasferimento dell'embrione (IVF/ET), trasferimento intratubarico del gamete (GIFT) e iniezione intracitoplasmatica di sperma (ICSI)].</li> </ul> <p><b>Negli uomini adulti:</b> insufficiente spermatogenesi da ipogonadismo ipogonadotropo</p>	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b> <b>CENTRI I LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS</li> <li>C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS</li> <li>Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ</li> <li>Urogyn Biotec Srl - Catanzaro</li> <li>Genesis - Cosenza</li> <li>Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - CdS Scilla (RC) - ASP RC</li> </ul> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS)</li> <li>C.I.S. Medicina della Riproduzione - Lamezia Terme (CZ)</li> <li>Gatic Sas - Gioia Tauro (RC)</li> <li>Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</li> </ul> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</li> </ul> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ginecologia</li> <li>Andrologia</li> <li>Urologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA07	Lutropina alfa	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	<p>In associazione con una preparazione a base di ormone follicolo stimolante (Follicle Stimulating Hormone, FSH), è raccomandato per la stimolazione dello sviluppo follicolare in donne adulte con grave insufficienza di ormone luteinizante (Luteinising Hormone, LH) ed FSH.</p>	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b> <b>CENTRI I LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS</li> <li>C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS</li> <li>Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ</li> <li>Urogyn Biotec Srl - Catanzaro</li> <li>Genesis - Cosenza</li> <li>Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - CdS Scilla (RC) - ASP RC</li> </ul> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS)</li> <li>C.I.S. Medicina della Riproduzione - Lamezia Terme (CZ)</li> <li>Gatic Sas - Gioia Tauro (RC)</li> <li>Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</li> </ul> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</li> </ul> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ginecologia</li> <li>Andrologia</li> <li>Urologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA08	Coriogonadotropina alfa	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	<p>Indicato nel trattamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne adulte sottoposte a superovulazione in preparazione a tecniche di riproduzione assistita come la fecondazione in vitro (IVF): viene somministrato per indurre la maturazione finale del follicolo e la luteinizzazione dopo la stimolazione della crescita follicolare.</li> <li>- Donne adulte anovulatorie o oligo-ovulatorie: ovitrelle viene somministrato per indurre l'ovulazione e la luteinizzazione in donne anovulatorie o oligo-ovulatorie dopo la stimolazione della crescita follicolare.</li> </ul>	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b> <b>CENTRI I LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione</u> - AO CS</li> <li>- <u>C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione</u> - Castrovillari (CS) - ASP CS</li> <li>- <u>Centro di procreazione medicalmente assistita</u> - Tiriolo (CZ) - ASP CZ <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Urogyn Biotec Srl</u> - Catanzaro</li> <li>- <u>Genesis</u> - Cosenza</li> </ul> </li> <li>- <u>Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)</u> - Cds Scilla (RC) - ASP RC</li> </ul> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia</u> - Rende (CS)</li> <li>- <u>C.I.S. Medicina della Riproduzione</u> - Lamezia Terme (CZ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Gatic Sas</u> – Gioia Tauro (RC)</li> <li>- <u>Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l."</u> Montaurò (CZ)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio</u> - AOU Catanzaro</li> </ul> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ginecologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Urologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA08	Corifollitropina alfa	sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	<p>Indicato per la stimolazione ovarica controllata (Controlled Ovarian Stimulation - COS) in associazione ad un antagonista dell'ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH) per lo sviluppo follicolare multiplo nelle donne che partecipano ad un programma di Tecniche di Riproduzione Assistita (Assisted Reproductive Technology - ART).</p> <p>LONG ACTING</p>	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b> <b>CENTRI I LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione</u> - AO CS</li> <li>- <u>C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione</u> - Castrovillari (CS) - ASP CS</li> <li>- <u>Centro di procreazione medicalmente assistita</u> - Tiriolo (CZ) - ASP CZ <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Urogyn Biotec Srl</u> - Catanzaro</li> <li>- <u>Genesis</u> - Cosenza</li> </ul> </li> <li>- <u>Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)</u> - Cds Scilla (RC) - ASP RC</li> </ul> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia</u> - Rende (CS)</li> <li>- <u>C.I.S. Medicina della Riproduzione</u> - Lamezia Terme (CZ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Gatic Sas</u> – Gioia Tauro (RC)</li> <li>- <u>Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l."</u> Montaurò (CZ)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio</u> - AOU Catanzaro</li> </ul> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ginecologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Urologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA10	<b>Follitropina delta</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA Nota 74</b>	Stimolazione ovarica controllata per lo sviluppo di follicoli multipli nelle donne sottoposte a tecniche di riproduzione assistita (assisted reproductive technologies,ART), come la fecondazione in vitro (in vitro fertilisation, IVF) o un ciclo di iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (intracytoplasmic sperm injection, ICSI).	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b></p> <p><b>CENTRI I LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS</li> <li>- C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS</li> <li>- Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ</li> <li>- Urogyn Biotec Srl - Catanzaro</li> <li>- Genesis - Cosenza</li> <li>- Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - CdS Scilla (RC) - ASP RC</li> </ul> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS)</li> <li>- C.I.S. Medicina della Riproduzione - Lamezia Terme (CZ)</li> <li>- Gatic Sas – Gioia Tauro (RC)</li> <li>- Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</li> </ul> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</li> </ul> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ginecologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Urologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA30	<b>Follitropina alfa/Lutropina alfa</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA Nota 74</b>	Indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare in donne adulte con grave insufficienza di LH ed FSH	<p><b>Centri Procreazione Medicalmente Assistita</b></p> <p><b>CENTRI I LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS</li> <li>- C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS</li> <li>- Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ</li> <li>- Urogyn Biotec Srl - Catanzaro</li> <li>- Genesis - Cosenza</li> <li>- Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - CdS Scilla (RC) - ASP RC</li> </ul> <p><b>CENTRI II LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS)</li> <li>- C.I.S. Medicina della Riproduzione - Lamezia Terme (CZ)</li> <li>- Gatic Sas – Gioia Tauro (RC)</li> <li>- Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</li> </ul> <p><b>CENTRI III LIVELLO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</li> </ul> <p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ginecologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Urologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03XB02	<b>Ulipristal</b>	os	RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento intermittente (fino a un max di 4 cicli) dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva. Durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e resezione di setti endouterini per via isteroscopica	<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Ginecologia</p> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Ginecologo</p>	51
G03XB02	<b>Ulipristal</b>	os	RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento pre-operatorio di sintomi, da moderati a gravi, di fibromi uterini		

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03XC01	Raloxifene	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<p><b>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Recupero e Riabilitazione Funzionale</li> <li>- Nefrologia</li> </ul>	79
G03XC02	Bazedoxifene	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<p><b>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Recupero e Riabilitazione Funzionale</li> <li>- Nefrologia</li> </ul>	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BD04	Oxibutinina Cloridrato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Incontinenza urinaria da urgenza	<b>Hub, Spoke:</b> - Urologia - Pediatria - Neurologia - Oncologia	87
G04BE01	Alprostadil	intracaver	RNR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di alprostadil per iniezione intracavernosa a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da lesioni complete del midollo spinale, e ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico qualora vi sia mancata risposta, intolleranza o contro-indicazione agli inibitori della PDES, secondo un piano terapeutico redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia  <b>Hub:</b> - Cardiologia - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC)  <b>Spoke:</b> - Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	75

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di inibitori della PDES a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Pneumologia (GOM RC)</li> <li>- Reumatologia (GOM RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Castrovillari)</li> </ul> <p>Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018</p>	75
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC)</li> <li>- Pneumologia (AO RC)</li> <li>- Reumatologia (AO RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Castrovillari)</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE03	<b>Sildenafil citrato</b>	os	RR/RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC)</li> <li>- Pneumologia (AO RC)</li> <li>- Reumatologia (AO RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Caastrovillari)</li> </ul>	
G04BE08	<b>Tadalafil</b>	os	RRL/RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	La prescrizione di inibitori della PDES a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>-Pneumologia (GOM RC)</li> <li>- Reumatologia (GOM RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Caastrovillari e PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Caastrovillari)</li> </ul>	75

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE08	<b>Tadalafil</b>	os	RRL/RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC)</li> <li>- Pneumologia (AO RC)</li> <li>- Reumatologia (AO RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Caastrovillari)</li> </ul>	
G04BE08	<b>Tadalafil</b>	os	RRL/RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>- Pneumologia (AO RC)</li> <li>- Reumatologia (AO RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Caastrovillari)</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE09	Vardenafil cloridrato triidrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di inibitori della PDES a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia</li> <li>-Pneumologia (GOM RC)</li> <li>- Reumatologia (GOM RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR)</li> <li>- Pneumologia (PO Castrovillari)</li> </ul>	75
G04BE10	Avanafil	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	La prescrizione di inibitori della PDES a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urologia</li> <li>- Andrologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Neurologia</li> </ul>	75
<b>H</b>	<b>PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI</b>							
H01AC01	Somatropina	im,sc	RRL	A-PHT	PT online webcare	<a href="https://www.aifa.gov.it/nota-39">https://www.aifa.gov.it/nota-39</a>	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diabetologia (AOU CZ, AO RC)</li> <li>- Endocrinologia (AOU CZ, AO RC)</li> <li>- Pediatria (AO CS, AOU CZ, AO RC)</li> </ul> <p><b>Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pediatria (PO KR, PO Locri, PO Castrovillari, PO Lamezia Terme, PO Paola/Cetraro, PO Corigliano/Rossano)</li> </ul>	39

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H01AC08	<b>Somatrogon</b>	sc	RRL	A-PHT		Trattamento di bambini e adolescenti a partire dai tre anni di età con disturbi della crescita dovuti a una secrezione insufficiente dell'ormone somatotropo	<b>Hub e Spoke:</b> - Endocrinologia - Pediatria	39
H01AX01	<b>Pegvisomant</b>	sc	RNRL	A-PHT			<b>Hub e Spoke:</b> - Endocrinologia	
H01BA01	<b>Argipressina</b>	ev	OSP	C		Indicato per il trattamento dell'ipotensione refrattaria alle catecolamine conseguente a shock settico in pazienti di età superiore ai 18 anni. E' presente un'ipotensione refrattaria alle catecolamine se la pressione arteriosa media non può essere stabilizzata ai valori ottimali nonostante un adeguato reintegro del volume e la somministrazione di catecolamine	<b>Hub e Spoke:</b> - Cardiologia	
H01BA02	<b>Desmopressina Acetato</b>	os,ev,im	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>		<b>Hub, Spoke:</b> - Emodialisi - Ematologia - Servizi Trasfusionali	
H01CA01	<b>Gonadorelina</b>	ev,sc	RR	C			<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Endocrinologia - Pediatria - Urologia - Andrologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H01CA01	Gonadorelina	nas	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Pediatria - Urologia - Andrologia	
H01CB02	Octreotide Acetato	sc,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Oncologia - Ematologia - Pediatria	
H01CB03	Lanreotide Acetato	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Oncologia - Ematologia - Pediatria	
H01CB05	Pasireotide	sc	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Malattia di Cushing	Hub: - Endocrinologia - Neurologia - Medicina Interna	
H01CC04	Linzagolix colina	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento dei sintomi da moderati a severi dei fibromi dell'utero nelle donne adulte in età riproduttiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Ginecologia  Ambulatori specialistici territoriali: - Ginecologo	51

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H01CC54	<b>relugolix, estradiolo e noretisterone acetato</b>	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento dei sintomi da moderati a severi dei fibromi uterini in donne adulte in età fertile	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Ginecologia  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Ginecologo	51
H02AB09	<b>Idrocortisone Emisuccinato Sodico</b>	os,im,ev	RRL/RR	A-PHT/C		Indicato per l'insufficienza surrenalica nei bambini da 0 a 18 anni	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Endocrinologia - Pediatria	
H02AB09	<b>Idrocortisone Emisuccinato Sodico</b>	os	RRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento dell'iperplasia surrenalica congenita (CAH, congenital adrenal hyperplasia ) negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni e negli adulti.	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
H02CA02	<b>Osilodrostat</b>	os	RNRL	A-PHT		Trattamento della Sindrome di Cushing endogena negli adulti	<b>Hub:</b> - Endocrinologia - Medicina interna	
H05AA02	<b>Teriparatide</b>	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche	<b>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H05BX01	<b>Cinacalcet</b>	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Oncologia - Endocrinologia - Nefologia - Emodialisi	
H05BX02	<b>Paracalcitolo</b>	ev,os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Prevenzione e trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti e pediatrici di età compresa tra i dieci e i sedici anni associato a malattia renale cronica negli stadi 3 e 4 e per la prevenzione ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti associato a malattia renale cronica di stadio 5 in pazienti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Oncologia - Endocrinologia - Nefologia - Emodialisi	
H05BX04	<b>Etelcalcetide</b>	ev	RRL	A-PHT		Trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (SHPT) in pazienti adulti con malattia renale cronica (CKD) in emodialisi.	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Nefologia - Dialisi	
<b>J</b>	<b>ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO</b>							
J01CA10	<b>Mezlocillina Sodica Monoidrata</b>	im	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01CA12	Piperacillina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01CA12	Piperacillina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		
J01CE08	Benzilpenicillina Benzatinica	im	RR	A-PHT		Profilassi della malattia reumatica in soggetti con infezioni delle prime vie respiratorie sostenute da streptococchi del gruppo A. Profilassi delle recidive della malattia reumatica  Sifilide	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: -Malattie Infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia - Dermatologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatra - Urologia	92

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01CE08	<b>Benzilpenicillina Benzatinica</b>	im	RR	A-PHT		Profilassi delle recidive delle malattie reumatiche	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Malattie Infettive</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Pneumologia</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Otorinolaringoiatra</li> <li>- Urologia</li> </ul>	92
J01CE09	<b>Benzilpenicillina Benzatinica</b>	im	RR	A-PHT		Sifilide	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Malattie Infettive</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Pneumologia</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Dermatologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Otorinolaringoiatra</li> <li>- Urologia</li> </ul>	92
J01CR01	<b>Ampicillina/Sulbactam</b>	im,ev	RR	A	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	<p>trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari</p> <p>trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi</p>		55

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01CR05	Piperacillina Sodica/Tazobactam Sodico	ev,im	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DD02	Ceftazidima	im,ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H		In adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 3 mesi per il trattamento delle seguenti infezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• infezione intra-addominale complicata (cIAI)</li> <li>• infezione complicata del tratto urinario (cUTI), inclusa pielonefrite polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)</li> </ul>	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DD52	<b>Ceftazidima/avibactam</b>	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di pazienti adulti con batteriemia che si verifica in associazione, o si sospetta sia associata, a una delle infezioni sopra elencate	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DD52	<b>Ceftazidima/avibactam</b>	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di pazienti adulti con batteriemia che si verifica in associazione, o si sospetta sia associata, a una delle infezioni sopra elencate	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DD52	<b>Ceftazidima/avibactam</b>	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di infezioni intraddominale complicata	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DD52	<b>Ceftazidima/avibactam</b>	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Polmonite acquisita in ospedale	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DD52	<b>Ceftazidima/avibactam</b>	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 3 mesi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DE01	<b>Cefepime Dicloridrato Monoidrato</b>	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DF01	<b>Aztreonam</b>	inal	RNRL	C		<p>La prescrizione a carico del SSN è limitata:</p> <p>al trattamento iniziato in ambito ospedaliero</p> <p>La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio</p> <p>al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica</p> <p>Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche</p>		56
J01DH51	<b>Imipenem + Cilastatina</b>	ev,im	OSP	C/H		<p>La prescrizione a carico del SSN è limitata:</p> <p>al trattamento iniziato in ambito ospedaliero</p> <p>La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio</p> <p>al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica</p> <p>Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche al trattamento iniziato in ambito ospedaliero</p>		56
J01DH52	<b>Meropenem/vaborbactam</b>	ev	OSP	H		<p>Trattamento di pazienti adulti con accertate o sospette gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE): infezione accertata del tratto urinario complicata (cUTI), compresa pielonefrite; infezione accertata o sospetta intra-addominale complicata (cIAI); polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione (VAP) accertata o sospetta; batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate; trattamento di infezioni accertate dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate</p>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <p>- Malattie infettive</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DH56	<b>Imipenem/cilastatina/relebactam</b>	ev	OSP	H		<p>Indicato nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trattamento della polmonite acquisita in ospedale (HAP), compresa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), negli adulti;</li> <li>- Trattamento della batteriemia che si manifesta in associazione o che si sospetta sia associata a HAP o VAP, negli adulti;</li> <li>- Trattamento delle infezioni causate da organismi aerobi Gram-negativi negli adulti con opzioni di trattamento limitate</li> </ul>	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive</p>	
J01DH56	<b>Imipenem/cilastatina/relebactam</b>	ev	OSP	H		<p>La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche</p>	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive</p>	
J01DI01	<b>Ceftobiprololo</b>	ev	OSP	H		<p>Polmonite acquisita in ospedale (HAP) esclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica</p>	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DI01	<b>Ceftobipolo</b>	ev	OSP	H		Polmonite acquisita in comunità	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J01DI02	<b>Ceftarolina fosamil</b>	ev	OSP	H	<b>Scheda di Prescrizione cartacea AIFA</b>	Trattamento delle seguenti infezioni nei neonati, nei lattanti, nei bambini, e negli adolescenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI)</li> <li>• Polmonite acquisita in comunità (CAP) esclusivamente nei casi in cui sia fallito un precedente trattamento antibiotico</li> </ul> Si devono tenere in considerazione le indicazioni ufficiali sull'impiego appropriato degli agenti antibatterici	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DI04	<b>Cefiderocol</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato per il trattamento delle infezioni dovute a organismi aerobi gram-negativi negli adulti con opzioni terapeutiche limitate	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DI54	<b>Ceftolozano/tazobactam</b>	ev	OSP	H		Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DI54	<b>Ceftolozano/tazobactam</b>	ev	OSP	H		Trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:1- Infezioni intra-addominali complicate con eziologia documentata/sospetta da batteri Gram- negativi, resistenti ai trattamenti di prima linea	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DI54	<b>Ceftolozano/tazobactam</b>	ev	OSP	H		Pielonefrite acuta eziologia documentata/sospetta batteri Gram-negativi, resistenti trattamenti di prima linea.	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DI54	<b>Ceftolozano/tazobactam</b>	ev	OSP	H		Infezioni complicate del tratto urinario con eziologia documentata/sospetta da batteri gram-negativi, resistenti ai trattamenti di prima linea.	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01GB01	<b>Tobramicina</b>	im,ev	RR	A	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB01	<b>Tobramicina</b>	im,ev	RNRL	A-PHT			<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive - Medicina generale - Pediatria - Pneumologia - Centri Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01GB03	<b>Gentamicina</b>	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB06	<b>Amikacina Solfato</b>	im,ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB07	<b>Netilmicina</b>	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01MA23	<b>Delafloxacin</b>	os	RNRL	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI) quando si considera inappropriato l'uso di altri agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di tali infezioni	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p> <p><b>Nota Regionale Prot. n. 128767 del 20.02.2024</b> <b>Centri Prescrittori QUOFENIX Integrazione</b></p>	
J01MA23	<b>Delafloxacin</b>	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI) quando si considera inappropriato l'uso di altri agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di tali infezioni	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p> <p><b>Nota Regionale Prot. n. 128767 del 20.02.2024</b> <b>Centri Prescrittori QUOFENIX Integrazione</b></p>	
J01XA02	<b>Teicoplanin</b>	im,ev	RR	A		<p>La prescrizione a carico del SSN è limitata:</p> <p>al trattamento iniziato in ambito ospedaliero</p> <p>La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio</p> <p>al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica</p> <p>Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche</p>		56

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01XA04	<b>Dalbavancina</b>	ev	OSP	H		Negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI)	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J01XA05	<b>Oritavancina</b>	ev	OSP	H	<b>Scheda di Prescrizione cartacea AIFA</b>	Indicato per il trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J01XB01	<b>Colistimetato Sodico</b>	im,ev,inal	RNR	C			<b>Centro Regionale Fibrosi Cistica</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01XX01	<b>Fosfomicina Sale Di Trometamolo</b>	os	RR	A/C		<p>Trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini, neonati inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osteomielite</li> <li>• infezioni complicate delle vie urinarie</li> <li>• infezioni nosocomiali delle vie respiratorie inferiori <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningite batterica</li> </ul> </li> <li>• batteriemia che si manifesta in associazione o che si ritiene eventualmente associata a una qualsiasi delle infezioni sopracitate</li> </ul>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie infettive</li> </ul>	
J01XX01	<b>Fosfomicina sodica</b>	ev	OSP	H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie infettive</li> </ul>	
J01XX08	<b>Linezolid</b>	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Ematologia</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01XX11	<b>Tedizolid fosfato</b>	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento di infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti. La rimborsabilità è limitata alle sole infezioni complicate della cute e dei tessuti molli quando si sospetta o si ha la certezza che l'infezione sia causata da batteri Gram positivi sensibili.	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J02AC03	<b>Voriconazolo</b>	os,ev	RNRL	A-PHT/H			<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia	
J02AC04	<b>Posaconazolo</b>	os	RNRL	A-PHT			<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J02AC05	<b>Isavuconazolo</b>	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Ematologia</li> </ul>	
J04AB04	<b>Rifabutina</b>	os	RR	A		<p>La prescrizione a carico del SSN è limitata:</p> <p>al trattamento iniziato in ambito ospedaliero</p> <p>La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio</p> <p>al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica</p> <p>Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche</p>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Pneumologia</li> </ul>	56
J04AK05	<b>Bedaquilina</b>	os	RNRL	H		<p>Tubercolosi polmonare multiresistente quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità</p>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Pneumologia</li> </ul> <p>Ambulatorio di Infettivologia – Epatologia e Valutazione Trapianto Fegato del Distretto di Lamezia - ASP Catanzaro</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J04AK06	<b>Delamanid</b>	os	RNRL	H		Opportuna terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistenti ai farmaci nei pazienti adulti quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Pneumologia</li> </ul> <p>Ambulatorio di Infettivologia – Epatologia e Valutazione Trapianto Fegato del Distretto di Lamezia - ASP Catanzaro</p>	
J04AK08	<b>Pretomanid</b>	os	RNRL	H		Indicato in combinazione con bedaquilina e linezolid, negli adulti, per il trattamento della tubercolosi (TB) polmonare a estesa farmacoresistenza (extensively drug resistant, XDR) o intollerante al trattamento o multifarmacoresistente (multidrug-resistant, MDR) non responsiva.	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Pneumologia</li> </ul> <p>Ambulatorio di Infettivologia – Epatologia e Valutazione Trapianto Fegato del Distretto di Lamezia - ASP Catanzaro</p>	
J05AB01	<b>Aciclovir</b>	os,ev	RR/OSP	A/H		<p>Virus Herpes simplex</p> <p>Virus varicella-zoster (VZV)</p> <p>La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.</p>		84

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AB09	<b>Famciclovir</b>	os	RR	A		<p>Virus Herpes simplex</p> <p>Virus varicella-zoster (VZV)</p> <p>La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.</p>		84
J05AB11	<b>Valaciclovir (cloridrato)</b>	os	RR	C/A-PHT		<p>Virus Herpes simplex</p> <p>Virus varicella-zoster (VZV)</p> <p>La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.</p>		84
J05AB14	<b>Valganciclovir (cloridrato)</b>	os	RR	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	<p>Trattamento di induzione e mantenimento della retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti con sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS)</p>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Centro Trapianti</li> <li>- Epatologia</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AB14	<b>Valganciclovir (cloridrato)</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Prevenzione della malattia da CMV in adulti e bambini (dalla nascita ai 18 anni di età) negativi al CMV, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo.	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Malattie Infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia	
J05AB14	<b>Valganciclovir (cloridrato)</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Estensioni Legge 648/96: trattamento "pre-emptive" dell'infezione da CMV in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Malattie Infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia	
J05AB15	<b>Brivudina</b>	os	RR	A		Virus Herpes simplex Virus varicella-zoster (VZV)  La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.		84

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AB16	<b>Remdesivir</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento della malattia da coronavirus 2019 Trattamento precoce della malattia da coronavirus 2019	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J05AE01	<b>Saquinavir</b>	os	RNRL	H			<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J05AE03	<b>Ritonavir</b>	os	RNRL	H			<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive  DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AE07	<b>Fosamprenavir</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AE08	<b>Atazanavir</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AE09	<b>Tipranavir</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AE10	<b>Darunavir</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AE30	<b>Nirmatrelvir/ritonavir</b>	os	RNR	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AF01	<b>Zidovudina</b>	os,ev	RNRL	A/H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AF05	Lamivudina	os	RR/RNRL	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico	HBV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>PO Materdomini AOU CZ</b> - Malattie Infettive - Epatologia - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale</p> <p><b>AO CS</b> - Gastroenterologia - Malattie Infettive</p> <p><b>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</b> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive</p> <p><b>GOM RC</b> - Malattie Infettive</p> <p><b>ASP KR</b> - Medicina Generale - Malattie Infettive</p> <p><b>ASP CZ</b> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</p> <p><b>ASP VV</b> - Malattie Infettive</p>	
J05AF06	Abacavir Solfato	os	RNRL	H			<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive</p>	
J05AF07	Tenofovir Disoproxil	os	RNRL	H			<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Malattie Infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia</p> <p>DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AF08	<b>Adefovir Dipivoxil</b>	os	RNRL	A-PHT			<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive</p> <p>DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV</p>	
J05AF09	<b>Emtricitabina</b>	os	RNRL	H			<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive</p>	
J05AF10	<b>Entecavir</b>	os	RNRL	A-PHT			<p><b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AF11	<b>Telbivudina</b>	os	RNRL	A-PHT			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie infettive</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Gastroenterologia</li> </ul>	
J05AF13	<b>Tenofovir alafenamide fumarato</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>PT Cartaceo AIFA</b>	HBV in adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg).	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	
J05AJ01	<b>Raltegravir</b>	os	RNRL	H			<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AJ03	<b>Dolutegravir</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AJ04	<b>Cabotegravir</b>	os, ev	RNRL	H		HIV	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AG01	<b>Nevirapina</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AG03	<b>Efavirenz</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AG04	<b>Etravirina</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AG05	<b>Rilpivirina</b>	os/*ev	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AG05	Rilpivirina	os/*ev	RNRL	H		HIV	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AG06	Doravirina	os	RNRL	H		Indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AP01	Ribavirina	os,inal	RNRL	A		HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>PO Materdomini AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> <li>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</li> <li>- Ambulatorio di Medicina Generale</li> </ul> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>PO Pugliese-Giaccio AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> <li>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</li> </ul> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP09	Sofosbuvir	os	RNRL	C	Registro web-based AIFA	HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>PO Materdomini AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> </ul> <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <p>- Ambulatorio di Medicina Generale</p> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</p> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	
J05AP09	Dasabuvir	os	RNRL	A		HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> </ul> <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <p>- Ambulatorio di Medicina Generale</p> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>AO CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</p> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP54	Elbasvir/Grazoprevir	os	RNRL	A	Registro web-based AIFA	HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>PO Materdomini AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> </ul> <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <p>- Ambulatorio di Medicina Generale</p> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</p> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	
J05AP55	Sosfosbuvir/Velpatasvir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>PO Materdomini AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> </ul> <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <p>- Ambulatorio di Medicina Generale</p> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> </ul> <p>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</p> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP56	Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> <li>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</li> <li>- Ambulatorio di Medicina Generale</li> </ul> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>AO CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> <li>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</li> </ul> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	
J05AP57	Glecaprevir/Pibrentasvir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> <li>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</li> <li>- Ambulatorio di Medicina Generale</li> </ul> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>AO CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> <li>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</li> </ul> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	
J05AR01	Lamivudina/Zidovudina	os	RNRL	H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR02	Abacavir/Lamivudina	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR04	Abacavir/Lamivudina/Zidovudina	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR06	Emtricitabina/Efavirenz/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR08	Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR09	Cobocistat/Elvitegravir/Emtricitabina/tenofovir	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR10	Lopinavir/Ritonavir	os	RNRL	H		HIV	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR13	<b>Abacavir/Dalutegravir/Lamivudina</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR14	<b>Cobicistat/Darunavir</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR15	<b>Atazanavir/Cobicistat</b>	os	RNRL	H		In associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di soggetti adulti infetti da HIV-1 senza mutazioni note associate a resistenza ad atazanavir.	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR17	<b>Emtricitabina/tenofovir alafenamide</b>	os	RNRL	H		In associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1).	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J05AR18	<b>Cobicista/emtricitabina/Elvitegravir/tenofovir alafenamide</b>	ev	RNRL	H		Trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) infetti da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza alcuna mutazione nota associata a resistenza alla classe degli inibitori dell'Integrasi, a emtricitabina o a tenofovir.	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J05AR19	<b>Rilpivirina/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide</b>	os	RNRL	H		Trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza alcuna mutazione nota associata a resistenza alla classe degli inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI), a tenofovir o a emtricitabina e con una carica virale ≤ 100.000 copie/mL di HIV-1 RNA.	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR20	<b>Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide</b>	os	RNRL	H		Trattamento degli adulti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza evidenza presente o passata di resistenza virale alla classe degli inibitori dell'integrasi, a emtricitabina o a tenofovir	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR21	<b>Dolutegravir/Rilpivirina</b>	os	RNRL	H		Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti in soppressione virologica (HIV-1 RNA <50 copie/ml), in un regime antiretrovirale stabile da almeno sei mesi, con nessuna storia di fallimento virologico e con nessuna resistenza nota o sospetta a qualsiasi inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa o inibitore dell'integrasi.	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR22	<b>Cobocistat/Darunavir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide</b>	os	RNRL	H		Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg).	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR24	<b>Doravirina/Lamivudina/Tenofovir disoproxil</b>	os	RNRL	H		Trattamento di adulti con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI, lamivudina o tenofovir	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J05AR24	<b>Doravirina/Lamivudina/Tenofovir disoproxil</b>	os	RNRL	H		Indicato per il trattamento di adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI, lamivudina o tenofovir e che hanno manifestato tossicità che preclude l'uso di altri regimi che non contengono tenofovir disoproxil	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	
J05AR25	<b>Dolutegravir/Lamivudina</b>	os	RNRL	H		Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 HIV-1), negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 40 kg, con nessuna resistenza nota o sospetta verso la classe degli inibitori dell'integrasi o verso lamivudina	<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX07	<b>Enfuvirtide</b>	sc	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AX09	<b>Maraviroc</b>	os	RNRL	H			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AX10	<b>Maribavir</b>	os	RRL	A-PHT		Trattamento dell'infezione e/o della malattia da citomegalovirus (CMV) refrattaria (con o senza resistenza) a una o più terapie precedenti, tra cui ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet in pazienti adulti che hanno subito un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o trapianto di organo solido (SOT)	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> -Malattie infettive - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX14	<b>Daclatasvir</b>	os	RNRL	A		HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>PO Materdomini AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> <li>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</li> <li>- Ambulatorio di Medicina Generale</li> </ul> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> <li>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</li> </ul> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	
J05AX18	<b>Letermovir</b>	os, ev	RRL/OSP	A-PHT/H	<b>Registro web-based AIFA</b>	<p>Profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)</p>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie infettive</li> <li>- Ematologia</li> </ul>	
J05AX28	<b>bulevirtide</b>	ev	RNRL	A-PHT		<p>Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite delta (HDV) in pazienti adulti positivi a HDV-RNA plasmatico (o sierico) con malattia epatica compensata</p>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie infettive</li> </ul> <p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> </ul> <p>Ambulatorio di Infettivologia – Epatologia e Valutazione Trapianto Fegato del Distretto di Lamezia - ASP Catanzaro</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX29	<b>Fostemsavir</b>	os	RNRL	H		Indicato in associazione con altri antiretrovirali, per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 resistente a molti farmaci, per i quali non è altrimenti possibile stabilire un regime antivirale soppressivo	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AX31	<b>Lenacapavir</b>	os	RNRL	H		in associazione con altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento degli adulti con infezione da HIV-1 multifarmaco-resistente per i quali non è possibile instaurare un regime antivirale soppressivo alternativo, per il carico orale prima della somministrazione dell'iniezione di lenacapavir a rilascio prolungato	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AX31	<b>Lenacapavir</b>	sc	RNRL	H		in associazione con altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento degli adulti con infezione da HIV-1 multifarmaco-resistente per i quali non è possibile instaurare un regime antivirale soppressivo alternativo	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX65	Ledipasvir/Sofosbuvir	os	RNRL	C		HCV	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <p><b>PO Materdomini AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Epatologia</li> <li>- Fisiopatologia Digestiva</li> <li>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</li> <li>- Ambulatorio di Medicina Generale</li> </ul> <p><b>AO CS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastroenterologia</li> <li>- Endoscopia Digestiva</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>GOM RC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP KR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Malattie Infettive</li> </ul> <p><b>ASP CZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale</li> <li>- Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia</li> <li>- Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</li> </ul> <p><b>ASP VV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> </ul>	
J06BA01	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Extravascolare	sc	RNRL	H		Immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti con infezioni severe o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace e documentato difetto di anticorpi specifici (PSAF, proven specific antibody failure) o livello sierico di IgG < 4 g/l	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Malattie infettive</li> <li>- Ematologia</li> </ul>	
J06BA02	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Intravascolare	ev	OSP	H		<p>Terapia sostitutiva in pazienti adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni di età) per il trattamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della produzione di anticorpi.</li> <li>• Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC), ove gli antibiotici per uso profilattico abbiano fallito o siano controindicati.</li> <li>• Ipogammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM) .</li> <li>• Ipogammaglobulinemia in pazienti prima e dopo allotrapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT, hematopoieticstemcelltransplantation).</li> </ul>	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Malattie infettive</li> <li>- Ematologia</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J06BA02	<b>Immunoglobulina Umana normale per somministr. Intravascolare</b>	ev	OSP	H		Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP)	Hub: - Neurologia	
J06BA02	<b>Immunoglobulina Umana ad alto titolo</b>	ev	OSP	H		Poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
J06BB01	<b>Immunoglobulina Umana Rho</b>	ev,im	OSP/RR	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Servizi Trasfusionali - Ematologia - Ginecologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J06BC03	Palivizumab	im	RRL	A			Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J06BD01	Bezlotoxumab	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Da solo o in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
L	<b>FARMACI ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI</b>							
L01AA05	Clorimetina	cut, ev	RRL	H		Trattamento topico del linfoma cutaneo a cellule T tipo micosi fungoide (CTCL tipo-MF) in pazienti adulti	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello  Hub: - Dermatologia	
L01AX03	Temozolomide	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01BA04	<b>Pemetrexed</b>	ev	OSP	H		Mesotelioma pleurico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01BA04	<b>Pemetrexed</b>	ev	OSP	H		Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01BB05	<b>Fludarabina Fosfato</b>	ev,os	RNRL	A-PHT			<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01BB07	<b>Nelarabina</b>	ev	OSP	H		indicata per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T-LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01BC06	<b>Capecitabina</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA</b> <b>PT generico</b>		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01BC07	<b>Azacitidina</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Terapia di mantenimento in pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) che abbiano conseguito una remissione completa (CR) o una remissione completa con recupero incompleto dell'emocromo (CRI) dopo terapia d'induzione associata o meno a trattamento di consolidamento e che non siano candidabili, o decidano di non sottoporsi, al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT)	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01BC07	<b>Azacitidina</b>	ev,im	OSP	H		Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con LMA con blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01BC08	<b>Decitabina</b>	ev	RNRL	H		Trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LAM) "de novo" o secondaria in base alla classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01BC52	<b>Fluorouracile/Acido Salicilico</b>	cut	RRL	A	<b>Scheda Regionale DCA Nota 95</b>	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	95
L01BC53	<b>Tegafur/gimeracil/oteracil</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01BC58	<b>Decitabina e Cedazuridina</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (AML, acute myeloid leukaemia) di nuova diagnosi non idonei alla chemioterapia di induzione standard	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01BC59	<b>Trifluridina/tipiracil</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico coloretale (CRC), già precedentemente trattati o non considerati candidati per il trattamento con altre terapie disponibili, tra cui chemioterapia a base di fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-VEGF ed anti-EGFR	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01BC59	<b>Trifluridina/tipiracil</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma gastrico metastatico incluso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che sono stati precedentemente trattati con almeno due precedenti regimi di trattamento sistemico per malattia avanzata	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01CA04	<b>Vinorelbina Bitartrato</b>	ev	OSP	H		Carcinoma polmonare non a piccole cellule Carcinoma mammario metastatico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali</b> - Oncologia	
L01CA04	<b>Vinorelbina Bitartrato</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Carcinoma polmonare non a piccole cellule Carcinoma mammario localmente avanzato e metastatico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01CA05	<b>Vinflunina</b>	ev	OSP	H		in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule transizionali del tratto uroteliale avanzato o metastatico dopo fallimento di un precedente regime contenente platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01CD01	<b>Paclitaxel</b>	ev	OSP	H		Indicazioni oncologiche	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01CD04	<b>Cabazitaxel</b>	ev	OSP	H		in combinazione con prednisone o prednisolone è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01CE01	<b>Topotecan Cloridrato</b>	ev/os	OSP/RNRL	H/A	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante (SCLC) per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea	<b>Formulazione qs Hub e Spoke:</b> - Oncologia	
L01CE02	<b>Irinotecan base anidra (come sale sucrosofato in formulazione liposomiale pegilata)</b>	ev	OSP	H		Trattamento dell'adenocarcinoma metastatico del pancreas, in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e leucovorin (LV), in pazienti adulti in progressione dopo una terapia a base di gemcitabina	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01CE02	<b>Irinotecan Cloridrato Triidrato</b>	ev	OSP	H		Trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon-retto	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01CX01	<b>Trabectedina</b>	ev	OSP	H		indicato nel trattamento dei pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato dopo il fallimento della terapia con antracicline e ifosfamide o che non sono idonei a ricevere tali agenti. I dati sull'efficacia si basano soprattutto su pazienti con liposarcoma e leiomiomasarcoma	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01CX01	<b>Trabectedina</b>	ev	OSP	H		In associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), è indicato per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01DB11	<b>Pixantrone Dimaleato</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin (LNH) a cellule B aggressive, recidivati più volte o refrattari. Il beneficio del trattamento con pixantrone non è stato dimostrato quando è usato come chemioterapia in quinta linea o successiva, in pazienti refrattari all'ultima terapia.	<b>Hub:</b> <b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b>	
L01EA01	<b>Imatinib</b>	os	RNRL	A-PHT			<b>Hub:</b> <b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b>	
L01EA02	<b>Dasatinib</b>	os	RNRL	H		Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica di nuova diagnosi Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo e LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia Leucemia Mieloide Cronica in fase cronica o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EA03	<b>Nilotinib</b>	os	RNRL	H		Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica di nuova diagnosi	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA04	<b>Bosutinib</b>	os	RNRL	H		Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica, in fase accelerata e in fase blastica trattati in precedenza con uno o più inibitori della Tirosin kinasi e per i quali l'imatinib, nilotinib e il dasatinib non sono considerate opzioni terapeutiche appropriate	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA05	<b>Ponatinib</b>	os	RNRL	H		Indicato in pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica in fase cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), accelerata o blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA05	<b>Ponatinib</b>	os	RNRL	H		Indicato in pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica in fase cronica con cromosoma Philadelphia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA05	<b>Ponatinib</b>	os	RNRL	H		in pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EA06	<b>Asciminib</b>	os	RNRL	H		Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica (LMC-CP Ph+) precedentemente trattati con due o più inibitori tirosin-chinasici	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01EB04	<b>Osimertinib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EB04	<b>Osimertinib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EB04	<b>Osimertinib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato in monoterapia per il trattamento adiuvante dopo resezione completa del tumore in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IB-IIIA il cui tumore presenta delezioni dell'esone 19 o mutazione sostitutiva dell'esone 21 (L858R) del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EC01	<b>Vemurafenib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	GU n. 129 del 4/6/2013 Vemurafenib è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600  GU n. 230 del 01/10/2016 Cobimetinib è indicato in associazione a vemurafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	<p>Indicato in associazione con cobimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600</p> <p>GU n.256 del 3/11/2015</p>	<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia</p>	
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	<p>Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600.</p>	<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia</p>	
L01EC02	Dabrafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	<p>Glioma a basso grado: in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad 1 anno affetti da glioma a basso grado (LGG) con una mutazione BRAF V600E che necessitano di una terapia sistemica</p> <p>Glioma ad alto grado: in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad 1 anno affetti da glioma ad alto grado (HGG) con una mutazione BRAF V600E che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento radioterapico e/o chemioterapico</p>	<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia</p>	
L01EC02	Dabrafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	<p>Melanoma inoperabile o metastatico: Dabrafenib in monoterapia o in associazione con trametinib e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.</p>	<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia</p>	
L01EC02	Dabrafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	<p>Trattamento adiuvante del melanoma: Dabrafenib in associazione con trametinib è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600, dopo resezione completa.</p>	<p><b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EC03	<b>Encorafenib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in associazione con binimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EC03	<b>Encorafenib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in associazione con cetuximab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon retto (CRC) positivo alla mutazione BRAF V600E, che hanno ricevuto precedente terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01ED01	<b>Crizotinib</b>	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01ED03	<b>Alectinib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in stadio avanzato precedentemente trattati con crizotinib.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01ED03	<b>Alectinib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	In monoterapia è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01ED05	Lorlatinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) non trattati in precedenza con un inibitore di ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED05	Lorlatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule ( Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è progredita dopo trattamento con alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi (TKI) ALK, oppure dopo trattamento con crizotinib e almeno un altro TKI ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EE01	Trametinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Glioma a basso grado: in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad 1 anno affetti da glioma a basso grado (LGG) con una mutazione BRAF V600E che necessitano di una terapia sistemica  Glioma ad alto grado: in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad 1 anno affetti da glioma ad alto grado (HGG) con una mutazione BRAF V600E che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento radioterapico e/o chemioterapico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EE01	Trametinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	In associazione a dabrafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EE04	Selumetinib		RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Indicato in monoterapia per il trattamento del neurofibroma plessiforme (PN) inoperabile, sintomatico in pazienti pediatrici con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) a partire dai tre anni di età	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EE04	Selumetinib	os				Trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600, dopo resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EF01	Palbociclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) - in associazione ad un inibitore dell'aromatasi - in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EF02	Ribociclib	os	RNL	H	Registro web-based AIFA	In associazione a un inibitore dell' aromatasi o a fulvestrant, e' indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), come terapia iniziale a base endocrina o in donne che hanno in precedenza ricevuto una terapia endocrina. In donne in pre- o peri-menopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EH01	Lapatinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EH03	Tucatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione a trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella localmente avanzato o metastatico HER2-positivo che abbiano ricevuto almeno 2 precedenti regimi di trattamento anti-HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EJ02	<b>Fedratinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento della splenomegalia correlata alla malattia o dei sintomi in pazienti adulti con mielofibrosi primaria, mielofibrosi postpolicitemia vera o mielofibrosi post-trombocitemia essenziale che sono naïve agli inibitori della chinasi Janus-associata (JAK) o che sono stati trattati con ruxolitinib	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL01	<b>Ibrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL01	<b>Ibrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfocitica Cronica (CLL) precedentemente non trattata. in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con CLL che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL01	<b>Ibrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL01	<b>Ibrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in associazione con venetoclax è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia linfatica cronica (CLL) precedentemente non trattata	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EL02	<b>Acalabrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) non trattata in precedenza.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL02	<b>Acalabrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL03	<b>Zanubrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da macroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o come trattamento di prima linea per pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL03	<b>Zanubrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma della zona marginale (MZL) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia a base di anticorpi anti-CD20;	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL03	<b>Zanubrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EL05	<b>Pirtobrutinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari (mantle cell lymphoma, MCL) recidivante o refrattario che sono stati precedentemente trattati con un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Bruton's tyrosine kinase, BTK)	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EM03	<b>Alpelisib</b>	os	RNL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in associazione a fulvestrant per il trattamento delle donne in post-menopausa, e degli uomini, affetti da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con mutazione di PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina come monoterapia	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EN02	<b>Pemigatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di adulti affetti da colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico, con fusione o riarrangiamento del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), che ha manifestato una progressione dopo almeno una linea precedente di terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EN04	<b>Futibatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico, con fusione o riarrangiamento del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), che hanno manifestato una progressione dopo almeno una linea di terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX05	<b>Regorafenib</b>	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma metastatico del colon-retto	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX05	<b>Regorafenib</b>	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'epatocarcinoma (Hepato Cellular Carcinoma, HCC) precedentemente trattato con sorafenib	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX07	<b>Cabozantinib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX07	<b>Cabozantinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione a nivolumab, è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato in pazienti adulti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX07	<b>Cabozantinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) negli adulti che sono stati precedentemente trattati con sorafenib	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX07	<b>Cabozantinib</b>	os	RNRL	H		Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma differenziato della tiroide (DTC) localmente avanzato o metastatico, refrattario o non eleggibile allo iodio radioattivo (RAI) che sono progrediti durante o dopo una precedente terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX08	<b>Lenvatinib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Indicato negli adulti per il trattamento del carcinoma indifferenziato della tiroide (DTC)(follicolare, papillare, a cellule di Hurthle) progressivo, localmente avanzato o metastatico, refrattario allo iodio radioattivo (RAI)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX08	<b>Lenvatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	indicato come monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (Hepatocellular Carcinoma, HCC) avanzato o non operabile negli adulti che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX08	<b>Lenvatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di adulti affetti da carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato in associazione a pembrolizumab, come trattamento di prima linea	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX08	<b>Lenvatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in associazione a pembrolizumab è indicato in pazienti adulti per il trattamento del carcinoma dell'endometrio (Endometrial Carcinoma, EC) avanzato o ricorrente, che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo il trattamento precedente con una terapia contenente platino in qualsiasi contesto e che non siano candidati all'intervento chirurgico o alla radioterapia curativi	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX09	<b>Nintedanib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato negli adulti per il trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)	<b>Hub e Spoke:</b> - Pneumologia - Medicina Interna  - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)  <b>Centro Regionale Fibrosi Cistica</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX09	<b>Nintedanib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in associazione con docetaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX09	<b>Nintedanib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo	<b>Hub e Spoke:</b> - Pneumologia - Reumatologia - Immunologia - Medicina Interna	
L01EX12	<b>Larotrectinib solfato</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi che presentino una fusione di geni del Recettore Tirocin-Chinasico Neurotrofico (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK), - che abbiano una malattia localmente avanzata, metastatica oppure nel caso in cui la resezione chirurgica possa determinare una severa morbidità - che non dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX13	<b>Gilteritinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) recidivante o refrattaria che presentano una mutazione del gene FLT3.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EX14	<b>Entrectinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dodici anni con tumori solidi che esprimono una fusione dei geni del recettore tirocin-chinasico neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia localmente avanzata, metastatica o la cui resezione chirurgica potrebbe comportare una severa morbidità e che non sono stati trattati in precedenza con un inibitore di NTRK, che non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti	<b>Hub:</b> - Oncologia (con i requisiti riportati in G.U. n. 214/2021)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX14	<b>Entrectinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1- positivo non precedentemente trattati con inibitori di ROS1	<b>Hub:</b> - Oncologia (con i requisiti riportati in G.U. n. 214/2021)	
L01EX18	<b>Avapritinib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da mastocitosi sistemica aggressiva (ASM), mastocitosi sistemica associata a neoplasia ematologica (SM-AHN) o leucemia mastocitaria (MCL), in seguito ad almeno una terapia sistemica. Mastocitosi Sistemica codice di esenzione Malattia Rara: RD0081;  In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con Tumori stromali gastrointestinali (GIST) non resecabili o metastatici che presentano la mutazione del recettore alfa del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGFRA) D842V	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L01EX19	<b>Ripretinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con tumore stromale gastrointestinale (GIST) avanzato che hanno ricevuto un trattamento precedente con tre o più inibitori della chinasi, incluso imatinib	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX21	<b>Tepotinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche associate a skipping dell'esone 14 (METex14) del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale, che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX17	<b>Capmatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, che presenta alterazioni genetiche associate al salto ( skipping ) dell'esone 14 del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale (METex14) e che richiede una terapia sistemica a seguito di un precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX22	<b>Selpercatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX23	<b>Pralsetinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene REarranged during Transfection (RET) non precedentemente trattati con un inibitore di RET	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01EX22	<b>Selpercatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Cancro della tiroide avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con sorafenib e/o lenvatinib;	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FA01	<b>Rituximab/Rituximab biosimilare</b>	ev,sc	OSP	H		Indicazioni ematologiche	<b>Hub:</b> Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	
L01FA01	<b>Rituximab/Rituximab biosimilare</b>	ev,sc	OSP	H	<b>Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici</b>	Indicazioni reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio - ASP KR	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FA01	Rituximab/Rituximab biosimilare	ev,sc	OSP	H		Trattamento di pazienti con pemfigo volgare (PV) da moderato a grave	Hub: - Dermatologia	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con Lenalidomide e Desametasone, o bortezomib e Desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con Lenalidomide e Desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con bortezomid, melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FC01	<b>Daratumumab</b>	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con bortezomib, talidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FC01	<b>Daratumumab</b>	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con ciclofosfamide, bortezomib e desametasone per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi sistemica da catene leggere (AL) di nuova diagnosi	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L01FC01	<b>Daratumumab</b>	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente linea di terapia contenente un inibitore del proteasoma e lenalidomide, e che erano refrattari alla lenalidomide, o che abbiano ricevuto almeno due precedenti linee di terapia contenenti lenalidomide e un inibitore del proteasoma, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo l'ultima terapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FD02	<b>Pertuzumab</b>	ev	OSP	H		Carcinoma mammario in fase iniziale è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FD02	<b>Pertuzumab</b>	ev	OSP	H		È indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FD02	<b>Pertuzumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma mammario in fase iniziale. "Perjeta" è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FD04	<b>Trastuzumab deruxtecan</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-positivo non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-HER2 nel setting metastatico o hanno presentato una progressione di malattia durante un trattamento (neo)adiuvante o entro sei mesi dalla sua interruzione	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FD04	<b>Trastuzumab deruxtecan</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FD04	<b>Trastuzumab deruxtecan</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non resecabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro 6 mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule squamose dell'esofago, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico, con espressione tumorale del PDL1 $\geq$ 1%	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato a metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento in monoterapia del carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento del carcinoma squamoso della testa e del collo ricorrente o metastatico negli adulti in progressione durante o dopo terapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e trattamento con brentuximab vedotin	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma dell'esofago istotipo squamoso, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico dopo precedente chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con Ipilimumab indicati per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile ad istologia non epitelioide	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti In associazione ad Ipilimumab è indicato, negli adulti, per il trattamento del melanoma metastatico in presenza di metastasi cerebrali asintomatiche o con PD-L1 < 1%	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma a cellule renali (RCC): in associazione a cabozantinib è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato;	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma del colon-retto (CRC) con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H): in associazione ad ipilimumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colonretto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina;	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF01	<b>Nivolumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastroesofagea (GE) o dell'esofago: in associazione a chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastroesofagea o dell'esofago, HER2 negativo, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio positivo combinato (CPS)≥ 5.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia nel Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico (cHL) recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e brentuximab vedotin (BV), o che non siano eleggibili al trapianto e abbiano fallito il trattamento con BV	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia nel trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 3 anni affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando ASCT non è un'opzione di trattamento.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia nel trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico negli adulti che hanno ricevuto una precedente chemioterapia contenente platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di prima linea del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti in associazione a carboplatino e paclitaxel o nabpaclitaxel	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato negli adulti in associazione ad axitinib	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia e' indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon-retto con elevata instabilita' dei microsatelliti (MSI-H, microsatellite instability-high) o con deficit di riparazione del mismatch (dMMR, mismatch repair deficient) negli adulti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia o in associazione a chemioterapia contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU), è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, metastatico o ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS $\geq 1$	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma al III Stadio e con coinvolgimento dei linfonodi che sono stati sottoposti a resezione completa	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a chemioterapia con o senza bevacizumab, indicato nel trattamento del carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS maggiore o uguale a 1	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a chemioterapia, indicato nel trattamento del carcinoma mammario triplo negativo localmente ricorrente non resecabile o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS = 10 e che non hanno ricevuto una precedente chemioterapia per malattia metastatica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a lenvatinib, indicato nel trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente negli adulti con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF04	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a chemioterapia contenente platino e fluoropirimidina, indicato nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma dell'esofago localmente avanzato non resecabile o metastatico o adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea HER-2 negativo negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 10	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a lenvatinib, indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato negli adulti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia indicato nel trattamento adiuvante di adulti con carcinoma a cellule renali M1 NED a seguito di nefrectomia e resezione di lesioni metastatiche	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a chemioterapia come trattamento neoadiuvante e poi continuato in monoterapia come trattamento adiuvante dopo intervento chirurgico, indicato nel trattamento di adulti con carcinoma mammario triplo negativo localmente avanzato o in fase iniziale ad alto rischio di recidiva	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia indicato nel trattamento adiuvante di adulti con melanoma in stadio IIB, IIC e che sono stati sottoposti a resezione completa	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Pembrolizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia indicato nel trattamento dei seguenti tumori MSI-H (alta instabilità dei microsatelliti) o dMMR ( deficit del mismatch repair ) negli adulti con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• carcinoma del colon-retto non resecabile o metastatico dopo precedente terapia di associazione a base di fluoropirimidina;</li> <li>• carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia;</li> <li>• carcinoma gastrico, dell'intestino tenue o delle vie biliari, non resecabile o metastatico, con progressione della malattia durante o dopo almeno una precedente terapia</li> </ul>	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF04	<b>Avelumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule di Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC) metastatico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF04	<b>Avelumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, UC) localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF05	<b>Atezolizumab</b>	ev/sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con carboplatino ed etoposide, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule;  in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con Atezolizumab i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono essere stati sottoposti anche a terapia a bersaglio molecolare	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF05	<b>Atezolizumab</b>	ev/sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con nab-paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario triplo negativo (triple-negative breastcancer, TNBC) non resecabile localmente avanzato o metastatico i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 $\geq 1\%$ e che non sono stati sottoposti a precedente chemioterapia per malattia metastatica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF05	<b>Atezolizumab</b>	ev/sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con bevacizumab, indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile non sottoposti a precedente terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF05	<b>Atezolizumab</b>	ev/sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia, indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) metastatico, i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 = 50% sulle cellule tumorali (TC) o = 10% sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore (IC) e sono negativi per mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF05	<b>Atezolizumab</b>	ev/sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con carboplatino ed etoposide, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule; in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con Atezolizumab i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono essere stati sottoposti anche a terapia a bersaglio molecolare	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF05	<b>Atezolizumab</b>	ev/sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio iniziale	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF06	<b>Cemiplimab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato (mCSCC o laCSCC) che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF06	<b>Cemiplimab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare localmente avanzato o metastatico (laBCC o mBCC) la cui malattia è progredita o che sono intolleranti a un inibitore del pathway di Hedgehog (HH)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Dermatologia	
L01FF06	<b>Cemiplimab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) con espressione di PD-L1 (in $\geq 50\%$ delle cellule tumorali), senza aberrazioni EGFR, ALK o ROS1, che presentano: NSCLC localmente avanzato e non sono candidati per la chemioradioterapia definitiva, oppure NSCLC metastatico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF06	<b>Cemiplimab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma della cervice uterina recidivante o metastatico con progressione di malattia durante o dopo un precedente trattamento con chemioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF06	<b>Cemiplimab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con NSCLC che esprimono PD-L1 (in $\geq 1\%$ delle cellule tumorali), senza aberrazioni di EGFR, ALK o ROS1, che presentano: NSCLC localmente avanzato che non sono candidati per la chemioradioterapia definitiva, oppure NSCLC metastatico;	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF07	<b>Dostarlimab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, con deficit del sistema di Mismatch Repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), progredito durante o dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FG01	<b>Bevacizumab</b>	ev	OSP	H		In associazione con paclitaxel e cisplatino o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere sottoposte a Terapia a base di platino, per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FG01	<b>Bevacizumab</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	<b>Hub e Spoke:</b> - Oculistica	98

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FG01	<b>Bevacizumab</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Edema maculare diabetico (DME)	<b>Hub e Spoke:</b> - Oculistica	98
L01FX04	<b>Ipilimumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non reseccabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX04	<b>Ipilimumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a nivolumab e' indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole;	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX04	<b>Ipilimumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione a nivolumab e due cicli di chemioterapia a base di platino e' indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR o traslocazioni di ALK	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX04	<b>Ipilimumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione sono indicati per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non reseccabile ad istologia non epitelioide	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX04	<b>Ipilimumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma del colon-retto (CRC) con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H); in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colonretto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina;	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX05	<b>Brentuximab vedotin</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (sALCL)	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX06	<b>Brentuximab vedotin</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in combinazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ in Stadio IV	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX07	<b>Brentuximab vedotin</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da Linfoma cutaneo a cellule T (CTCL) CD30 positivo, sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX08	<b>Elotuzumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX08	<b>Elotuzumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due linee di terapia precedenti comprendenti lenalidomide e un inibitore del proteasoma e con progressione della malattia durante l'ultima terapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX09	<b>Mogamulizumab</b>	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da micosi fungoide (MF) o Sindrome di Sézary (SS) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia sistemica.	<b>Hub:</b> <b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b>	
L01FX12	<b>Tafasitamab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a lenalidomide, seguito da Tafasitamab in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario e non idonei a trapianto autologo di cellule staminali (Autologous Stem Cell Transplant, ASCT)	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX13	<b>Enfortumab vedotin</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro uroteliale (UC) localmente avanzato o metastatico che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia contenente platino e un inibitore del recettore di morte programmata 1 o un inibitore del ligando di morte programmata 1	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX14	<b>Polatuzumab vedotin</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non precedentemente trattato con fattore di indice prognostico (IPI) 3-5	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX14	<b>Polatuzumab vedotin</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a bendamustina e rituximab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante/refrattario non candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX15	<b>Belantamab Mafodotin</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo nei pazienti adulti, che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia risulta refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38 e che hanno mostrato progressione di malattia all'ultima terapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX17	<b>Sacituzumab govitecan</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX18	<b>Amivantamab</b>	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) avanzato con mutazioni da inserzione nell'esone 20 attivanti (exon20ins) del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR), dopo il fallimento della chemioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX20	<b>Tremelimumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma epatocellulare: in associazione a durvalumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare avanzato o non resecabile	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX22	<b>Loncastumab tesirine</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma ad alto grado a cellule B ( high-grade ) recidivanti o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX25	<b>Mosunetuzumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario che sono stati sottoposti ad almeno due terapie sistemiche precedenti	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX28	<b>Glofitamab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FY01	<b>Pertuzumab/Trastuzumab</b>	sc	OSP	H		indicato per l'uso in associazione con chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01X	<b>brexucabtagene autoleucel</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (mantle cell lymphoma, MCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica che includano un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Bruton's tyrosine kinase, BTK)	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H			Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		Carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		Carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		Carcinoma gastrico metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC05	Gemtuzumab/Ozogamicin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In combinazione a terapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a 15 anni con leucemia mieloide acuta (LMA) CD33-positiva de novo, precedentemente non trattata, ad eccezione della leucemia promielocitica acuta (LPA)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC06	<b>Cetuximab</b>	ev	OSP	H		carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XC06	<b>Cetuximab</b>	ev	OSP	H		carcinoma a cellule squamose di testa e collo	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XC08	<b>Panitumumab</b>	ev	OSP	H		carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XC09	<b>Catumaxomab</b>	ip	OSP	H		Trattamento peritoneale dell'ascite maligna in pazienti con carcinomi EpCAM-positivi quando la terapia standard non sia disponibile o non sia più attuabile	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XC14	<b>Trastuzumab Emtansine</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento adiuvante di pazienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2- positivo con malattia invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC14	Trastuzumab Emtansine	ev	OSP	H		In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, localmente avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano, somministrati separatamente o in associazione. I pazienti devono, o essere stati sottoposti in precedenza a terapia per la malattia localmente avanzata o metastatica, oppure aver sviluppato recidiva di malattia nel corso di o entro sei mesi dal completamento della terapia adiuvante	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Leucemia linfatica cronica (LLC)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a Bendamustina, seguito da obinutuzumab in mantenimento è indicato nel trattamento di pazienti con Linfoma follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione di malattia durante o fino a sei mesi dopo il trattamento con rituximab o un regime contenente rituximab (linee successive alla prima)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione a chemioterapia, come terapia di mantenimento nei soggetti che ottengono una risposta, è indicato per il trattamento di pazienti con LF avanzato non pretrattato	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC16	Dinutuximab beta	ev	OSP	H		Trattamento del neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire dai 12 mesi di età che sono stati precedentemente sottoposti a chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta parziale, seguita da terapia mieloablata e trapianto di cellule staminali	Hub: - Oncologia - Oncoematologia pediatrica  GOM Reggio Calabria: - UOC Centro Trapianti Midollo Osseo	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC16	<b>Dinutuximab beta</b>	ev	OSP	H		Trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di prima linea, senza cosomministrazione di IL-2	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XC19	<b>Blinatumomab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XC19	<b>Blinatumomab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superior a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XC19	<b>Blinatumomab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B positiva per il cromosoma Philadelphia devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi (TKI) e non devono avere opzioni di trattamento alternative	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XC21	<b>Ramucirumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine. In monoterapia è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC26	<b>Inotuzumab Ozogamicin</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+ ), devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)	<b>Hub:</b> <b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b>	
L01XC27	<b>Olaratumab</b>	ev	OSP	H		In combinazione con doxorubicina per il trattamento di pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in fase avanzata che non sono candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico o radioterapico e che non sono stati precedentemente trattati con doxorubicina.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Durvalumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Carcinoma delle vie biliari: in associazione a gemcitabina e cisplatino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma delle vie biliari (BTC) non resecabile o metastatico.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Durvalumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Carcinoma epatocellulare: in associazione a tremelimumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FF02	<b>Durvalumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, non resecabile, negli adulti il cui tumore presenta un'espressione di PD-L1 $\geq$ 1% sulle cellule tumorali e la cui malattia non è progredita a seguito di chemio-radioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	<b>Durvalumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione con etoposide e carboplatino o cisplatino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01FX24	<b>Teclistamab</b>	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, compresi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano evidenziato progressione della malattia durante l'ultima terapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FX27	<b>Epcoritamab</b>	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	in monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01FY02	<b>Nivolumab/relatlimab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	indicato per il trattamento di prima linea del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con espressione tumorale del PD-L1 < 1%	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XC38	<b>Isatuximab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato, in associazione a pomalidomide e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con MM recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma (PI) e con progressione della malattia durante l'ultima terapia.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC38	<b>Isatuximab</b>				<b>Registro web-based AIFA</b>	in combinazione con carfilzomib e desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una e non più di 3 linee di terapia precedenti. Sono esclusi dalla rimborsabilità i pazienti con "primary refractory disease" e i pazienti pretrattati con carfilzomib o refrattari/intolleranti ad un precedente trattamento con anticorpi monoclonali anti-CD38.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XE02	<b>Gefitinib</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l'EGFR-TK	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE03	<b>Erlotinib cloridrato</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE03	<b>Erlotinib cloridrato</b>	os	RNRL	H		Carcinoma pancreatico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE04	<b>Sunitinib maleato</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE04	<b>Sunitinib maleato</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma renale metastatico (MRCC)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE04	<b>Sunitinib maleato</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Tumori neuroendocrini pancreatici (pNET)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE05	<b>Sorafenib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Epatocarcinoma (HCC)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE05	<b>Sorafenib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma a cellule renali (RCC)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE05	<b>Sorafenib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma tiroideo differenziato	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE09	<b>Temsirolimus</b>	ev	OSP	H			Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XE11	<b>Pazopanib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE12	<b>Vandetanib</b>	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma Midollare della Tiroide (MTC)	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XE13	<b>Afatinib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti naive agli inibitori tirosinchinasi del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XE17	<b>Axitinib</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EJ01	<b>Ruxolitinib</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	indicato per il trattamento di pazienti di età pari o superiore ai 12 anni con malattia del trapianto contro l'ospite acuta o con malattia del trapianto contro l'ospite cronica che presentano una risposta inadeguata al trattamento con corticosteroidi o altre terapie sistemiche	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EJ01	<b>Ruxolitinib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EJ01	<b>Ruxolitinib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XE28	<b>Ceritinib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)	<b>Hub:</b> - Oncologia	
L01XE28	<b>Ceritinib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib	<b>Hub:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE38	<b>Cobimetinib</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	In associazione a vemurafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE39	<b>Midostaurina</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina ad alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento con Rydapt come agente singolo per pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva	<b>Hub:</b> <b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b>	
L01XE41	<b>Binimetinib</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	In associazione con encorafenib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XE43	<b>Brigatinib</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un inibitore di ALK.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Medicina Interna - Pneumologia	
L01XE43	<b>Brigatinib</b>	os	RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC, ALK positivo, in stadio avanzato, precedentemente trattati con Crizotinib	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Medicina Interna - Pneumologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE50	Abemaciclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di donne con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico, positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2): in associazione con un inibitore delle aromatasi o fulvestrant come terapia endocrina iniziale o in donne che hanno ricevuto una precedente terapia endocrina. Nelle donne in pre- o peri-menopausa, la terapia endocrina deve essere combinata con un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE50	Abemaciclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma mammario in fase iniziale. In associazione alla terapia endocrina è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale, positivo al recettore ormonale (HR), negativo al recettore del fattore di crescita umano epidermico di tipo 2 (HER2), linfonodopositivo, ad alto rischio di recidiva. Nelle donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina con inibitore dell'aromatasi deve essere associata a un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XF01	Tretionina	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XF03	Bexarotene	os	RNRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia o in associazione con la terapia endocrina per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con cancro della mammella allo stadio iniziale ad alto rischio, HER2-negativo, e con mutazioni nella linea germinale BRCA1/2, precedentemente trattati con chemioterapia neoadiuvante o adiuvante	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XK01	<b>Olaparib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale sieroso di alto grado, di carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primitivo, BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), che sono in risposta (risposta completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XK01	<b>Olaparib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia, per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo FIGO) BRCA1/2- mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che sono in risposta (completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XK01	<b>Olaparib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento in monoterapia di pazienti adulti con cancro della mammella, localmente avanzato o metastatico, HER2 negativo, e con mutazioni della linea germinale BRCA1/2. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con un'antraciclina e un taxano nel setting (neo)adiuvante o metastatico, a meno che i pazienti fossero stati non eleggibili per questi trattamenti. I pazienti con cancro della mammella e recettore ormonale (HR)-positivo, devono inoltre aver progredito durante o dopo una precedente terapia endocrina o devono essere considerati non eleggibili per la terapia endocrina	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XK01	<b>Olaparib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un deficit di ricombinazione omologa (homologous recombination deficiency, HRD), definito dalla presenza di una mutazione BRCA1/2 e/o di instabilità genomica.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XK01	<b>Olaparib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato, in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione e con mutazioni nei geni BRCA1/2 (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), in progressione dopo precedente trattamento che includeva un nuovo agente ormonale	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XK02	<b>Niraparib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio FIGO III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia di prima linea a base di platino per le pazienti BRCA mutate.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XK04	<b>Rucaparib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino sensibile di carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle tube di Falloppio o peritoneale primario, in risposta (risposta completa o parziale) dopo chemioterapia a base di platino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XJ02	<b>Sonidegib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare (BCC) in stadio localmente avanzato che non sono suscettibili di intervento chirurgico curativo o radioterapia	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Dermatologia	
L01XJ03	<b>Glasdegib maleato</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato, in associazione a citarabina a basse dosi, per il trattamento della leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi de novo oppure secondaria, in pazienti adulti non candidabili alla chemioterapia di induzione standard	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XL03	<b>Axicabtagene ciloleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B refrattario o recidivante (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (primary mediastinal large B-cell lymphoma, PMBCL), dopo due o più linee di terapia sistemica	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XL03	<b>Axicabtagene ciloleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare (LF) r/r dopo tre o più linee di terapia sistemica;	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XL03	<b>Axicabtagene ciloleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma a cellule B ad alto grado (high-grade B cell lymphoma, HGBL) refrattario alla chemioimmunoterapia di prima linea o recidivante entro dodici mesi dal completamento della chemioimmunoterapia di prima linea	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XL06	<b>Brexucabtagene autoleucel, brexu-cel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti di età pari o superiore a ventisei anni con leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) a precursori di cellule B recidivante o refrattaria	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XL07	<b>Idacabtagene vicleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia all'ultima terapia	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX05	<b>Idrossiurea o Idrossicarbamide</b>	os	RNRL	C		Indicato per la prevenzione delle crisi dolorose vaso-occlusive ricorrenti inclusa la sindrome acuta toracica in pazienti adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 2 anni affetti da anemia falciforme sintomatica	<b>Hub:</b> - Ematologia - Pediatria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX23	<b>Mitotane</b>	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX24	<b>Peg-asparaginasi</b>	ev	OSP	H		Come componente di una terapia di associazione antineoplastica per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) nei pazienti pediatrici dalla nascita a diciotto anni e negli adulti.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX27	<b>Arsenico triossido</b>	ev	OSP	H		Induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da leucemia promielocitica acuta (LPA) di nuova diagnosi a rischio basso/intermedio (conta leucocitaria $\leq 10 \times 10^9/\text{mcl}$ ) in combinazione con acido all-trans retinoico (ATRA) caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene Leucemia Promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa)	uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
L01XX32	<b>Bortezomib</b>	ev	OSP	H		In monoterapia in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desamteasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX33	<b>Bortezomib</b>	ev	OSP	H		In associazione con melafalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX34	<b>Bortezomib</b>	ev	OSP	H		In associazione con desametasone o con desametasone e talidomide è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX35	<b>Bortezomib</b>	ev	OSP	H		In associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX35	<b>Anagrelide cloridrato</b>	os	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA</b> <b>PT generico</b>		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XX41	<b>Eribulina mesilato</b>	ev	RNRL/OSP	H		E' indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, che hanno mostrato una progressione dopo almeno due regimi chemioterapici per malattie avanzate. La terapia precedente deve aver previsto l'impiego di un'antraciclina e di un taxano, in contesto adiuvante o metastatico, a meno che i pazienti non siano idonei a ricevere questi trattamenti	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XX41	<b>Eribulina mesilato</b>	ev	RNRL/OSP	H		E' indicato per il trattamento di pazienti adulti con liposarcoma inoperabile, sottoposti a precedente terapia contenente antracicline (eccetto se non idonei) per malattia avanzata o metastatica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX43	<b>Vismodegib</b>	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	Carcinoma basocellulare	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Dermatologia	
L01XX44	<b>Afibercept</b>	ev	OSP	H		In combinazione con chemioterapia a base di irinotecan/5-fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) è indicato nei pazienti adulti con carcinoma coloretale metastatico (MCR) resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatino	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XX45	<b>Carfilzomib</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	In associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX46	<b>Carfilzomib</b>	ev	OSP	H		In associazione con daratumumab e desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX47	<b>Idelalisib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX47	<b>Idelalisib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemioimmunoterapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX50	<b>Ixazomib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia  Si ricorda che è ammesso alla rimborsabilità solamente il trattamento di Ixazomib, in combinazione con lenalidomide e desametasone, in pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario che non si siano dimostrati refrattari a lenalidomide o ad un inibitore del proteasoma e che abbiano ricevuto $\geq 2$ precedenti linee di terapia o almeno 1 precedente linea di terapia con citogenetica sfavorevole [del (17); t (4;14); t(14;16)]	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX52	<b>Venetoclax</b>	os	RNRL	H		Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL- chronic lymphocytic leukaemia) in presenza della delezione 17p o della mutazione TR53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX52	<b>Venetoclax</b>	os	RNRL	H		Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX52	<b>Venetoclax</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In combinazione con obinutuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) non trattati in precedenza	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX52	<b>Venetoclax</b>	os	RNRL	H		In combinazione con azacitidina è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (AML - acute myeloid leukaemia) di nuova diagnosi non idonei alla chemioterapia intensiva	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX60	<b>Talazoparib</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA1/2, affetti da carcinoma mammario HER2-negativo localmente avanzato o metastatico. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con una antraciclina e/o un taxano nel contesto (neo)adiuvante, localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dei pazienti non idonei per tali trattamenti. I pazienti con carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali (HR) devono essere stati precedentemente trattati con terapia endocrina o ritenuti non idonei alla terapia endocrina	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XX66	<b>Selinexor</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	in associazione a bortezomib e desametasone (Svd) per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una terapia precedente e refrattari alla lenalidomide	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX66	<b>Selinexor</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	in associazione a desametasone (Sd) per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti sottoposti ad almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia è refrattaria ad almeno due inibitori del proteasoma, a due agenti immunomodulatori e a un anticorpo monoclonale anti-CD38, che abbiano dimostrato progressione di malattia durante l'ultima terapia	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L01XX67	<b>Tagraxofusp</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN)	<b>Hub:</b> <b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX71	<b>Tisagenlecleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva;</li> </ul>	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX71	<b>Tisagenlecleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare (LF) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX71	<b>Tisagenlecleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica.</li> </ul>	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX73	<b>Sotorasib</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia per il trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) in stadio avanzato, con mutazione KRAS G12C e in progressione dopo almeno una precedente linea di terapia sistemica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L01XX88	<b>Lisocabtagene maraleucel</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL) e linfoma follicolare di grado 3B (FL3B) recidivati o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica	<b>CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC</b> (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XY01	<b>Daunorubicina/citarabina</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta correlata a terapia (t-AML) o AML con alterazioni correlate a mielodisplasia (AML-MRC)	<b>Hub:</b> <b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b>	
L01FY01	<b>Pertuzumab/Trastuzumab</b>	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in associazione con chemioterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva;</li> <li>• in associazione con docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, metastatico o localmente recidivato non operabile, non trattati in precedenza con terapia anti- HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica</li> </ul>	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L02AB01	<b>Megestrol Acetato</b>	os	RNR	A		neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata o da AIDS		28
L02AB02	<b>Medrossiprogesterone (Acetato)</b>	os,im	RNR	A		neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata o da AIDS		28
L02AB03	<b>Fulvestrant</b>	im	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma mammella localmente avanzato o metastatico	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02AE01	<b>Buserelina Acetato</b>	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva	<b>Hub, Spoke, Ospedali generali e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia	51
L02AE02	<b>Leuprorelina Acetato</b>	im,sc	RR/RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva Pubertà precoce	<b>Hub, Spoke, Ospedali generali e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia	51
L02AE03	<b>Goserelin Acetato</b>	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva	<b>Hub, Spoke, Ospedali generali e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia	51
L02AE04	<b>Triptorelina</b>	sc,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva Pubertà precoce	<b>Hub, Spoke, Ospedali generali e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia	51
L02BB04	<b>Enzalutamide</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	E' indicato per il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione (CRPC), asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Urologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	E' indicato per il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico ormono-sensibile (metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC) in associazione con terapia di deprivazione androgenica.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (castration resistant prostate cancer, CRPC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB05	Apalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Indicato negli uomini adulti per il trattamento del carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC) in combinazione con terapia di deprivazione androgenica (ADT), con diagnosi di malattia a basso volume o ad alto volume e non candidabili a trattamento con docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB06	Darolutamide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC) in associazione a docetaxel e a terapia di deprivazione androgenica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02BB06	<b>Darolutamide</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione (nmCRPC) che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Urologia	
L02BX02	<b>Degarelix</b>	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Endocrinologia - Oncologia - Urologia	
L02BX03	<b>Abiraterone acetato</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	E' indicato assieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Urologia	
L02BX03	<b>Abiraterone acetato</b>	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	E' indicato assieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti la cui malattia è progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetacel	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Urologia	
L02BX04	<b>Relugolix</b>	os	RR	A-PHT		Indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico in stadio avanzato sensibile agli ormoni	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia - Urologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03	<b>Frazione cellulare arricchita di cellule autologhe CD34+</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti con immunodeficienza grave combinata da deficit di adenosina deaminasi (ADA-SCID), per i quali non sia disponibile un idoneo donatore consanguineo di cellule staminali HLA (antigene leucocitario umano)- compatibili		
L03AA02	<b>Filgrastim originator</b>	ev,sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AA02	<b>Filgrastim biosimilare</b>	ev,im,sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AA10	<b>Lenograstim</b>	ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AA13	<b>Pegfilgrastim</b>	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AA14	<b>Lipegfilgrastim</b>	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Ematologia - Malattie Infettive - Oncologia	
L03AB01	<b>Interferone Alfa Naturale</b>	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	<b>Hub e Spoke:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB01	<b>Interferone Alfa Naturale</b>	im,sc	RRL	A		Per le altre indicazioni	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB04	<b>Interferone Alfa 2a</b>	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	<b>Hub e Spoke</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB05	<b>Interferone Alfa 2a</b>	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AB05	<b>Interferone Alfa 2b</b>	im,sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	<b>Hub e Spoke</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB06	<b>Interferone Alfa 2b</b>	im,sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB07	<b>Interferone Beta 1a</b>	im	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB08	<b>Interferone Beta 1b</b>	im	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011) Sclerosi Multipla secondariamente progressiva con malattia in fase attiva evidenziata da recidive	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB10	<b>Interferone Alfa 2b Pegilato</b>	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	<b>Hub e Spoke:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AB10	Interferone Alfa 2b Pegilato	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB11	Interferone Alfa-2A Pegilato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le epatiti	<b>Hub e Spoke:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB12	Interferone Alfa-2A Pegilato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Per le altre indicazioni	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB13	Peg-interferone Beta 1A	sc	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB15	Ropeginterferone alfa-2b	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento della policitemia vera senza splenomegalia sintomatica, in monoterapia nei pazienti adulti.	<b>Hub:</b> - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AX13	<b>Glatiramer</b>	sc	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AX15	<b>Mifamurtide</b>	ev	OSP	H		E' indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non metastatico ad alto grado resecabile in seguito a resezione chirurgica macroscopicamente	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
L03AX16	<b>Plerixafor</b>	os,sc	OSP	H		E' indicato in combinazione con il fattore stimolante le colonie dei granulociti (G-CSF) per incrementare la mobilitazione delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti adulti con linfoma e mieloma multiplo con una scarsa mobilitazione cellulare	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L04AA03	<b>Immunoglobuline equine anti-linfociti T</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato per l'uso negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 2 anni per il trattamento dell'anemia aplastica acquisita da moderata a grave di eziologia immunologica nota o sospetta, nell'ambito della terapia immunosoppressiva standard in pazienti che non sono idonei al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o per i quali non è disponibile un donatore di HSC idoneo	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA06	<b>Acido micafenolico</b>	os	RNRL	A-PHT		Profilassi del rigetto acuto	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Generale - Nefrologia - Pediatria - Immunologia - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA10	<b>Sirolimus</b>	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Centri di Trapianto - Emodialisi - Nefrologia	
L04AA10	<b>Sirolimus</b>	os	RNR	A-PHT		Trattamento di pazienti affetti da linfangioleiomiomatosi sporadica con malattia polmonare moderata o funzione polmonare in diminuzione	<b>Pneumologia AOU CZ</b>	
L04AA13	<b>Leflunomide</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia - Medicina Generale - Reumatologia	
L04AA18	<b>Everolimus</b>	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiocirurgia - Nefrologia - Malattie infettive - Gastroenterologia - Epatologia	
L04AA23	<b>Natalizumab</b>	ev	OSP	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR)	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA24	<b>Abatacept</b>	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio - ASP KR	
L04AA25	<b>Eculizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	E' indicato per il trattamento di adulti e bambini affetti da: emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA25	<b>Eculizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	Sindrome emolitico uremica atipica (SEUa)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA27	<b>Eculizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di adulti affetti da disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) in pazienti positivi agli anticorpi anti-acquaporina 4 (AQP4) con decorso recidivante della malattia	<b>Hub:</b> - Neurologia	
L04AA28	<b>Eculizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da miastenia gravis generalizzata refrattaria (MGg) in pazienti positivi agli anticorpi anti recettore dell'acetilcolina (AChR)	<b>Hub:</b> - Neurologia  <b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA26	<b>Belimumab</b>	ev,sc	OSP/RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	E' indicato come terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, con un alto grado di attività della malattia (ad es. anti-ds DNA positivi e basso complemento) nonostante la terapia standardcx	<b>Hub e Spoke:</b> - Reumatologia - Medicina Interna - Immunologia - Ambulatori di Reumatologia	
L04AA28	<b>Belimumab</b>	ev,sc	OSP/RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In combinazione con terapie immunosoppressive di fondo per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica attiva	<b>Hub e Spoke:</b> - Reumatologia - Medicina Interna - Nefrologia - Immunologia	
L04AA27	<b>Fingolimod</b>	os	RRL	A-PHT	<b>Scheda di prescrizione cartacea AIFA</b>	Indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre: pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia disease modifying; oppure pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA28	<b>Belatacept</b>	ev	OSP	C		In combinazione con corticosteroidi e acido micofenolico (MPA), è indicato per la profilassi del rigetto del trapianto negli adulti riceventi trapianto renale.	<b>Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Generale - Nefrologia - Immunologia	
L04AA31	<b>Teriflunomide</b>	os	RRL	A	<b>Scheda di prescrizione cartacea AIFA</b>	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	65

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA32	<b>Apremilast</b>	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR)</p>	
L04AA33	<b>Vedolizumab</b>	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale</p>	
L04AA34	<b>Alemtuzumab</b>	ev	OSP	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR)	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA36	<b>Ocrelizumab</b>	ev	OSP	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base alle caratteristiche cliniche o radiologiche	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA38	<b>Ozanimod</b>	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) con malattia in fase attiva, come definito da caratteristiche cliniche o di imaging.	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA40	<b>Cladribina</b>	os	RNRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA41	<b>Imlifidase</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di desensibilizzazione di pazienti adulti altamente sensibilizzati che necessitano di trapianto di rene con un crossmatch positivo contro un donatore deceduto disponibile. L'uso di «idefix» deve essere riservato ai pazienti che hanno poche probabilità di essere sottoposti a trapianto nell'ambito del sistema di allocazione dei reni disponibili, compresi i programmi di assegnazione di priorità per i pazienti altamente sensibilizzati	<b>Centri abilitati al Trapianto del Rene</b> (Rete Ospedaliera DCA n. 78/2024 - Allegato 4 Tabella C) UU.OO. Nefrologia dell'AO Cosenza e del GOM Reggio Calabria	
L04AA40	<b>Siponimod</b>	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attività infiammatoria.	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA43	<b>Ravulizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa) che sono naive agli inibitori del complemento o che sono stati trattati con eculizumab per almeno tre mesi e hanno evidenziato una risposta a eculizumab	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA43	<b>Ravulizumab</b>	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da NMOSD (Spettro dei Disturbi della NeuroMielite Ottica) positivi agli anticorpi anti-acquaporina 4 (AQP4)	<b>Hub:</b> - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA43	Ravulizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	<p>Terapia aggiuntiva alla terapia standard per il trattamento di pazienti adulti affetti da MGg e positivi agli anticorpi anti-recettore dell'acetilcolina (AChR)</p> <p>Codice di esenzione MR: RFG101</p>	<p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AA43	Ravulizumab	ev	OSP	H		<p>Indicato nel trattamento di pazienti adulti e pediatrici con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia;</li> <li>• in pazienti clinicamente stabili dopo trattamento con eculizumab per almeno gli ultimi 6 mesi</li> </ul>	<p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AA47	Inebilizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	<p>In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) sieropositivi per le immunoglobuline G antiaquaporina-4 (IgG AQP4), in seconda linea rispetto a rituximab, limitatamente ai pazienti che abbiano riportato almeno un attacco acuto di NMOSD nell'anno precedente, che hanno richiesto una terapia di salvataggio (ad esempio steroidi, plasmaferesi, somministrazione endovenosa di immunoglobuline) e che presentino un punteggio alla scala EDSS (Expanded Disability Severity Scale) <math>\leq</math> 8,0</p>	<p><b>Hub:</b> - Neurologia</p>	
L04AA50	Ponesimod	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	<p>Trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita sulla base di caratteristiche cliniche o radiologiche</p>	<p><b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017</p>	
L04AA51	anifrolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	<p>Terapia aggiuntiva per il trattamento di pazienti adulti affetti da lupus eritematoso sistemico (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, in forma da moderata a severa, nonostante la terapia standard</p>	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Reumatologia - Medicina Interna - Immunologia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA52	<b>Ofatumumab</b>	sc	RRL	H		Trattamento in combinazione con clorambucile o bendamustina di pazienti con LLC che non sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AA53	<b>Ofatumumab</b>	sc	RRL	H	<b>Scheda di prescrizione cartacea AIFA</b>	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o radiologiche	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA54	<b>Pegcetacoplan</b>	sc	RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento di pazienti adulti con emoglobinuria parossistica notturna (EPN) che rimangono anemici dopo trattamento con un inibitore di C5 per almeno TRE mesi	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA58	<b>Efgartigimod alfa</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	in aggiunta alla terapia standard per il trattamento dei pazienti adulti con miastenia gravis generalizzata (gMG) che sono positivi all'anticorpo antirecettore dell'acetilcolina (AChR)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AB01	<b>Etanercept/Etanercept biosimilare</b>	sc	RRL	H	<b>Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici</b>	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)  <u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AB02	Infliximab/Infliximab biosimilare	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria</p>	
L04AB05	Certolizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)</p>	
L04AB06	Golimumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AB04	<b>Adalimumab/Adalimumab biosimilare</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)  <u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)  <u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria	
L04AB05	<b>Adalimumab/Adalimumab biosimilare</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Uveite	<b>Hub:</b> - Oculistica	
L04AB07	<b>Adalimumab/Adalimumab biosimilare</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	Uveite pediatrica		
L04AB08	<b>Adalimumab/Adalimumab biosimilare</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Idrosadenite Suppurativa		

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC03	Anakinra	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)	
L04AC03	Anakinra	ev	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Febbre mediterranea familiare (FMF). Se appropriato, Anakinra deve essere somministrato in associazione con colchicina	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AC03	Anakinra	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Trattamento di soggetti adulti ospedalizzati con polmonite da COVID-19 moderata/severa (con pO <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> >150, in ossigenoterapia e non sottoposti a C-PAP o ventilazione meccanica) e con livelli di plasma Soluble Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor (suPAR) ≥ 6ng/ml.	Malattie Infettive e Centri indicati per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19	
L04AC05	Ustekinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)  <u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)  <u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AC07	Tocilizumab	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Sindromi da Febbre Periodica Autoinfiammatoria (TRAPS, MKD, FMF)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)	
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Malattia di Still	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AC10	Secukinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)  <u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR)	
L04AC11	Siltuximab	ev	OSP	H		Trattamento di malattia di Castleman multicentrica (MCD) che sono negativi per il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e per l'herpes virus-8 umano (HHV8)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC12	<b>Brodalumab</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC13	<b>Ixekizumab</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)  <u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)	
L04AC14	<b>Sarilumab</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)	
L04AC16	<b>Guselkumab</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)  <u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)	
L04AC17	<b>Tildrakizumab</b>	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC18	Risankizumab	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale</p>	
L04AC19	Satralizumab	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	In monoterapia o in associazione a terapia immunosoppressiva (TIS), per il trattamento dei disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD), in pazienti adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di età con sieropositività per le IgG antiacquaporina- 4 (AQP4-IgG)	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AC21	Bimekizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	In monoterapia o in combinazione con metotressato, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (disease-modifying antirheumatic drugs, DMARDs)	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia - Reumatologia - Medicina Generale	
L04AC21	Bimekizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p>	
L04AC24	Mirikizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico	<p><u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AD02	Tacrolimus	os,ev	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Profilassi del rigetto da trapianto nei pazienti che ricevono trapianto allogenico di fegato, rene o cuore. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri medicinali immunosoppressori.	<b>Hub e Spoke:</b> - Centri di Trapianto - Nefrologia - Emodialisi - Cardiologia - Cardiocirurgia - Malattie Infettive - Gastroenterologia	
L04AD03	Voclosporina	os	RRL	A-PHT		In associazione a micofenolato mofetile, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica (NL) attiva di classe III, IV o V (comprese le classi miste III/V e IV/V)	<b>Hub e Spoke:</b> - Reumatologia - Medicina Interna - Nefrologia	
L04AF01	Tofacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)  <u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)  <u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AF02	Baricitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)	
L04AF02	Baricitinib	os	RNRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Trattamento dell'alopecia areata severa nei pazienti adulti	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AF02	Baricitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
L04AF03	Upadacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	Area Reumatologia Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia  - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)  Area Dermatologia Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia  Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)  Area Gastroenterologica Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina generale	
L04AF03	Upadacitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
L04AF04	Filgotinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Trattamento dell'artrite reumatoide, in monoterapia o in associazione a metotrexato (MTX), in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o piu' farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD).	Area Reumatologia Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AF04	Filgotinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	Trattamento della colite ulcerosa in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno avuto una perdita di risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un medicinale biologico	<u>Area Gastroenterologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AF07	Deucravacitinib	os	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa in adulti candidati alla terapia sistemica	<u>Area Dermatologia</u> <b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AF08	Ritlecitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	Alopecia areata severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Dermatologia	
L04AJ04	Sutimlimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'anemia emolitica di grado da moderato a grave (Hbs 10 g/dl) in pazienti adulti affetti da CAD primaria unfit, non-responder o ricaduti dopo un precedente trattamento con rituximab	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
L04AJ05	Avacopan	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione ad un regime a base di rituximab o ciclofosfamide, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangioite (GPA) o poliangioite microscopica (MPA) in fase attiva e severa  Codice di esenzione MR: RG0070 granulomatosi con poliangioite (GPA)  Codice di esenzione MR: RG0020 poliangioite microscopica (MPA)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AX02	<b>Talidomide</b>	os	RR	H	Registro web-based AIFA		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX04	<b>Lenalidomide</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	E' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX05	<b>Lenalidomide</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti con anemia trasfusione dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-I, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX06	<b>Lenalidomide</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX07	<b>Lenalidomide</b>	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	In associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AX05	<b>Pirfenidone</b>	os	RR/RNRL	H	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Trattamento di fibrosi polmonare idiopatica da lieve a moderata	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Pneumologia - Medicina Interna</p> <p>- Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</p> <p><b>Centro Regionale Fibrosi Cistica</b></p>	
L04AX06	<b>Pomalidomide</b>	os	RNRL	H		in associazione a desametasone è indicato nel trattamento di pazienti adulti con amiloide AL sottoposti a precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib che non abbiano determinato una risposta ematologica completa o parziale molto buona (definita come dFLC <40 mg/L nei soggetti con dFLC basale >50 mg/L o come dFLC <10 mg/L nei soggetti con dFLC basale tra 20 e 50 mg/L).	<p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AX06	<b>Pomalidomide</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In associazione con desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia	<p><b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b></p>	
L04AX06	<b>Pomalidomide</b>	os	RNRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In associazione con bortezomib e desametasone, e' indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia comprendente lenalidomide	<p><b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b></p>	
L04AX07	<b>Dimetilfumarato</b>	os	RR/RRL	A-PHT	<b>Scheda di prescrizione cartacea AIFA</b>	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	<p><b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017</p>	65

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AX08	<b>Dimetilfumarato</b>	os	RR/RRL	A		Trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che necessitano di terapia farmacologica sistemica	<b>Hub e Spoke:</b> - Dermatologia	
<b>M</b>	<b>SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO</b>							
M01AB01	<b>Indometacina</b>	os,ev,im,loc	RR	A/C		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AB05	<b>Diclofenac</b>	os,loc,im	RR	A/C		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AB14	<b>Proglumetacina</b>	os	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AB55	<b>Diclofenac Sodico/Misoprostolo</b>	os	RR	A		Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M01AC01	<b>Piroxicam</b>	os,im	RR	A		<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;</li> <li>- Dolore neoplastico;</li> <li>- Attacco acuto di gotta.</li> </ul>		66
M01AE01	<b>Ibuprofene</b>	os	OTC/RR	C/A		<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;</li> <li>- Dolore neoplastico;</li> <li>- Attacco acuto di gotta.</li> </ul>		66
M01AE02	<b>Naprossene</b>	os	RR	A/C		<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;</li> <li>- Dolore neoplastico;</li> <li>- Attacco acuto di gotta.</li> </ul>		66
M01AE03	<b>Ketoprofene</b>	ev,os	RR	A		<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;</li> <li>- Dolore neoplastico;</li> <li>- Attacco acuto di gotta.</li> </ul>		66
M01AE09	<b>Flurbiprofene</b>	os	RR	A		<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;</li> <li>- Dolore neoplastico;</li> <li>- Attacco acuto di gotta.</li> </ul>		66

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M01AE12	<b>Oxaprozina</b>	os	RR	A		<p>Artropatie su base connettivica;  - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;  - Dolore neoplastico;  - Attacco acuto di gotta.</p>		66
M01AX17	<b>Nimesulide</b>	os	RR	A		<p>Artropatie su base connettivica;  - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria;  - Dolore neoplastico;  - Attacco acuto di gotta</p> <p>Trattamento di breve durata del dolore acuto</p>		66
M04AA04	<b>Febuxostat</b>	os	RR	A		<p>Trattamento dell'iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti.</p>		91
M05BA02	<b>Acido Clodronico Sale Disodico</b>	im	RR	A/C		<p>Trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo</p>	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b>  - Oncologia  - Ematologia  - Medicina Interna  - Ortopedia</p>	42
M05BA03	<b>Acido Pamidronico Sale Disodico</b>	ev	RNRL	H			<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b>  - Oncologia  - Ematologia  - Medicina Interna  - Ortopedia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BA04	<b>Acido Alendronico Sale Sodico</b>	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<b>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
M05BA04	<b>Acido Alendronico Sale Sodico</b>	os	RR	A	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Indicato negli adulti per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee;	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Oncologia - Medicina Interna - Ortopedia	
M05BA06	<b>Acido Ibandronico</b>	os,ev	RNRL	A-PHT		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<b>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
M05BA06	<b>Acido Ibandronico</b>	os,ev	RNRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Indicato negli adulti per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee;	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Oncologia - Medicina Interna - Ortopedia	
M05BA07	<b>Acido Risedronico</b>	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<b>Hub, Spoke:</b> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Ortopedia - Fisiatria - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia - Reumatologia	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BA08	Acido Zolendronico Monoidrato	ev	RNRL/OSP	H		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<p><b>Hub, Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Recupero e Riabilitazione Funzionale</li> <li>- Nefrologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortopedia</li> <li>- Fisiatria</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Reumatologia</li> </ul>	79
M05BA08	Acido Zolendronico Monoidrato	ev	RNRL/OSP	H			<p><u>Acido Zolendronico 5 mg (fino a 4 unità-sacche o flaconcini)</u></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Ortopedia</li> </ul> <p><u>Acido Zolendronico 4 mg (fino a 4 unità-sacche o flaconcini)</u></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oncologia</li> <li>- Ematologia</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Urologia</li> </ul> <p>OSP: 5 mg (unità superiori a 4) OSP: 4 mg (unità superiori a 4)</p>	
M05BB03	Acido Alendronico (aledronato sodico triidrato e colecalciferolo)	os	RR	A		Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<p><b>Hub, Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Recupero e Riabilitazione Funzionale</li> <li>- Nefrologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortopedia</li> <li>- Fisiatria</li> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Reumatologia</li> </ul>	79
M05BX04	Denosumab	sc	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	<p><b>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Ortopedia</li> <li>- Reumatologia</li> <li>- Ginecologia</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Endocrinologia</li> <li>- Recupero e Riabilitazione Funzionale</li> <li>- Nefrologia</li> </ul>	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BX04	<b>Denosumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>PT web-based AIFA</b>	Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso	<b>Hub e Spoke:</b> - Oncologia - Ematologia	
M05BX04	<b>Denosumab</b>	sc	RRL	A-PHT		Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbidità	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
M05BX05	<b>Burosumab</b>	sc	RNL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento dell'ipofosfatemia X-linked (XLH) con evidenza radiografica di malattia ossea, nei bambini di età pari o superiore ad un anno e negli adolescenti con sistema scheletrico in crescita	<b>Hub:</b> - Nefrologia - Endocrinologia - Pediatria	
M05BX05	<b>Burosumab</b>	ev	RRL	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento dell'ipofosfatemia X-linked, nei bambini e adolescenti di età compresa tra uno e diciassette anni con evidenza radiografica di malattia ossea, e negli adulti	<b>Hub:</b> - Nefrologia - Endocrinologia - Pediatria	
M05BX06	<b>Romozosumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento dell'osteoporosi severa in donne in post-menopausa ad alto rischio di frattura: - donne in menopausa con osteoporosi documentata, in prevenzione secondaria ( ≥1 frattura vertebrale moderata o grave oppure ≥2 fratture vertebrali lievi oppure ≥2 fratture non vertebrali da fragilità in anamnesi oppure una frattura femorale nei 2 anni prima) e con rischio di frattura a 10 anni ≥20% (determinato con calcolatore validato);- impossibilità a proseguire trattamenti alternativi efficaci (intolleranza, inefficacia o scadenza del periodo di impiego autorizzato); assenza di pregressi eventi cardio e cerebrovascolari e/o assenza di rischio cardiovascolare elevato (definito come rischio ≥20% secondo le carte del rischio del progetto CUORE per paz. < 70 anni, secondo valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare come da RCP per paz. ≥= 70 anni).	<b>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BX07	<b>Vosoritide</b>	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'acondroplasia in pazienti di eta' compresa tra i cinque e i quattordici anni al momento dell'inizio della terapia e le cui epifisi non siano chiuse. La diagnosi di acondroplasia deve essere confermata mediante opportuna analisi genetica	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M05BX07	<b>Vosoritide</b>	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'acondroplasia in pazienti di eta' compresa tra i cinque e i quattordici anni al momento dell'inizio della terapia e le cui epifisi non siano chiuse. La diagnosi di acondroplasia deve essere confermata mediante opportuna analisi genetica	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M09AB02	<b>Collagenasi di clostridium histolyticum</b>	im	RL/OSP	H		E' indicato nel trattamento della contrattura di Dupuytren in pazienti adulti con corda palpabile	- Ortopedia (specializzata nella chirurgia della mano)	
M09AB02	<b>Collagenasi di clostridium histolyticum</b>	im	RL/OSP	H		E' indicato nel trattamento di uomini adulti affetti da malattia di Peyronic con placca palpabile e curvatura di almeno 30 gradi all'inizio della terapia	- Ortopedia (specializzata nella chirurgia della mano)	
M09AX03	<b>Ataluren</b>	os	RNRL	H		Trattamento della distrofia muscolare di Duchenne dovuta a mutazione nonsense nel gene della distrofina (nonsense mutationDuchenneMuscular Dystrophy, nmDMD) nei pazienti deambulanti di età pari o superiore a 5 anni. L'efficacia non è stata dimostrata nei pazienti non deambulanti	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M09AX07	Nusinersen	intrat	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale 5q	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M09AX09	Onasemnogene Abeparovvec	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 Kg e diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio dei sintomi nei primi 6 mesi di vita, oppure diagnosi di SMA 5q (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a tre copie del gene SMN2)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M09AX09	Onasemnogene Abeparovvec	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 kg; diagenosiclinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi di vita, oppure diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a due copie del gene SMN2)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M09AX10	Risdiplam	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti a partire da 2 mesi di età, con una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o aventi da una a quattro copie di SMN2	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N	<b>SISTEMA NERVOSO</b>							
N01AX03	Ketamina	ev	OSP	H		Come unico anestetico per manovre chirurgiche e diagnostiche. Nonostante sia più indicato per interventi brevi, KETAMINA MOLTENI può essere usato, con dosi addizionali, per interventi di maggiore durata. Qualora si desideri rilasciamento della muscolatura scheletrica, si usi un miorellassante e si tenga sotto controllo la respirazione. Per indurre l'anestesia prima di somministrare altri anestetici generali. Come supplemento ad altri anestetici.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N02AE01	<b>Buprenorfina (Cloridrato)</b>	os,im,ev,td	RMR	A/H		Trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un contesto di trattamento medico, sociale e psicologico	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N02BG10	<b>Delta-9-tetraidrocannabinolo/cannabidiolo</b>	inal	RNRL	H		E' indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM) che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia	<b>PDTA Sclerosi Multipla</b> DCA n. 140 del 19/10/2017	
N02CD01	<b>Erenumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	<b>Rete Regionale delle Cefalee</b> DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	
N02CD02	<b>Galcanezumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	<b>Rete Regionale delle Cefalee</b> DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	
N02CD03	<b>Fremanezumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	<b>Rete Regionale delle Cefalee</b> DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	
N02CD05	<b>Eptinezumab</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Indicato per la profilassi dell'emicrania negli adulti, con almeno quattro giorni di emicrania al mese	<b>Rete Regionale delle Cefalee</b> DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	
N02CD07	<b>Atogepant</b>	os	RRL	A-PHT	<b>Registro web-based AIFA</b>	Profilassi dell'emicrania negli adulti che hanno almeno quattro giorni di emicrania al mese	<b>Rete Regionale delle Cefalee</b> DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N03AF03	Rufinamide	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N03AF04	Eslicarbazepina acetato	os	RRL	A-PHT		In monoterapia	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N03AF04	Eslicarbazepina acetato	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	In aggiunta	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N03AX10	Felbamato	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Neurologia - Pediatria - Psichiatria  Ambulatori specialistici territoriali: - Neurologo - Pediatra	
N03AX12	Gabapentin	os	RR	A		Dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes, neuropatia associata a malattia, dolore post-ictus o da lesione midollare, polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risultati inefficaci, neuropatia diabetica	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore  Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	4
N03AX12	Gabapentin	os	RR	A		Trattamento della epilessia	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore  Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		Dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herper, neuropatia associata a malattia, dolore post-ictus o da lesione midollare, polineuropatie, multilineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risulti inefficace, neuropatia diabetica	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Diabetologia</li> <li>- Centri per la Terapia del Dolore</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internista</li> <li>- Diabetologo</li> <li>- Neurologo</li> <li>- Oncologo</li> </ul>	4
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		Trattamento della epilessia	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologia</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Diabetologia</li> <li>- Centri per la Terapia del Dolore</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internista</li> <li>- Diabetologo</li> <li>- Neurologo</li> <li>- Oncologo</li> </ul>	
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		Trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> </ul>	
N03AX21	Retigabina	os	RR	A		E' indicato come trattamento aggiuntivo delle crisi parziali farmaco-resistenti con o senza generalizzazione secondaria nei pazienti di età pari o superiore ai 18 anni affetti da epilessia, quando altre associazioni appropriate di farmaci si siano dimostrate inadeguate o non siano state tollerate	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologia</li> </ul>	
N03AX22	Perampanel	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologo</li> </ul>	
N03AX23	Brivaracetam	os/ev	RR/OSP	A-PHT/C	PT Cartaceo AIFA	Terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neurologia</li> <li>- Neuropsichiatria infantile</li> </ul>	
N03AX24	Cannabidiolo	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox Gastaut (LGS) nei pazienti a partire da due anni di età'	<p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N03AX24	<b>Cannabidiolo</b>	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Dravet (DS) nei pazienti a partire da due anni di età	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N03AX24	<b>Cannabidiolo</b>	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Indicato come terapia aggiuntiva per le crisi epilettiche associate a sclerosi tuberosa complessa (TSC) nei pazienti a partire da due anni di età	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N03AX25	<b>Cenobamato</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Indicato come terapia aggiuntiva delle crisi convulsive a insorgenza focale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti affetti da epilessia che non sono stati adeguatamente controllati nonostante una storia di trattamento con almeno due medicinali antiepilettici.	<b>Hub e Spoke:</b> - Neurologia	
N03AX26	<b>Fenfluramina</b>	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet e alla sindrome di Lennox-Gastaut come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici per pazienti di età pari o superiore ai due anni che abbiano mostrato una risposta insufficiente o assente ad almeno due farmaci antiepilettici  Codice di esenzione MR: Sindrome di Dravet: RF0061 Codice di esenzione MR: Sindrome di Lennox-Gastaut: RF0130	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N03AX26	<b>Fenfluramina</b>	os	RNRL	A-PHT		Trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici per pazienti di età pari o superiore ai 2 anni	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N04BA03	<b>Levodopa/Carbidopa/Entacapone</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Neurologia  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Neurologo	
N04BA07	<b>Foslevodopa e foscarbidopa</b>	sc	RR	H		Indicato per il trattamento della malattia di Parkinson in stadio avanzato rispondente a levodopa, con gravi fluttuazioni motorie e ipercinesia o discinesia, quando le combinazioni disponibili di medicinali antiparkinsoniani non hanno dato risultati soddisfacenti	<b>Hub e Spoke:</b> - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N04BC06	<b>Cabergolina</b>	os	RNL/RNR	A/C	Scheda Regionale DCA PT generico		<u>Classe C</u> <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Geriatria - Neurologia - Psichiatria	
N04BC07	<b>Apomorfina</b>	sc	RNRL	H		Trattamento delle fluttuazioni motorie (fenomeni "on-off") in pazienti affetti da malattia di Parkinson che non sono sufficientemente controllati da medicinali anti-Parkinson per uso orale	<b>Hub:</b> Neurologia	
N04BD02	<b>Rasagilina mesilato</b>	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatra - Geriatria -Neurologia <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Geriatra - Neurologo - Psichiatra	
N04BX01	<b>Tolcapone</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Geriatria -Neurologia	
N04BX02	<b>Entacapone</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Geriatria -Neurologia	
N04BX04	<b>Opicapone</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	Terapia aggiuntiva alle associazioni di levodopa/inibitori della DOPA decarbossilasi (DOPA decarboxylase inhibitors, DDCl) in pazienti adulti con malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie di fine dose che non sono stabilizzate con queste associazioni		
N05AE04	<b>Ziprasidone Cloridrato</b>	os	RR	A-PHT			<b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N05AE05	Lurasidone	os	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 13 anni di età	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile</li> </ul>	
N05AH01	Loxapina	inal	OSP	H	PT Cartaceo AIFA	E' indicato per il controllo rapido dello stato di agitazione da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare. I pazienti devono ricevere il trattamento abituale immediatamente dopo il controllo dei sintomi acuti di agitazione	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> </ul>	
N05AH02	Clozapina	os	RNRL	A-PHT			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014)</li> <li>- Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie</li> <li>- Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</li> </ul>	
N05AH03	Olanzapina	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014)</li> <li>- Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie</li> <li>- Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</li> </ul>	
N05AH03	Olanzapina	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H	Scheda di monitoraggio dei pazienti con disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza in trattamento con antipsicotici	<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p><b>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> </ul>	
N05AH04	Quetiapina (fumarato)	os	RR	A-PHT			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014)</li> <li>- Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie</li> <li>- Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</li> </ul>	
N05AH04	Quetiapina (fumarato)	os	RR	A-PHT		<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p><b>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N05AH05	Asenapina	os	RR	A-PHT			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014)</li> <li>- Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie</li> <li>- Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</li> </ul>	
N05AH05	Asenapina	os	RR	A-PHT		<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p><b>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> </ul>	
N05AX08	Risperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014)</li> <li>- Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie</li> <li>- Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</li> </ul>	
N05AX08	Risperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p><b>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> </ul>	
N05AX12	Aripiprazolo	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014)</li> <li>- Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie</li> <li>- Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</li> </ul>	
N05AX12	Aripiprazolo	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p><b>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> <li>- Geriatria</li> </ul>	
N05AX13	Paliperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		Trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 15 anni di età	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psichiatria</li> <li>- Neurologia</li> </ul> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuropsichiatria Infantile</li> <li>- Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie</li> <li>- Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche</li> </ul>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N05AX13	Paliperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		Uso off-label: Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza	Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A. - Psichiatria - Neurologia - Geriatria	
N05AX13	Paliperidone	im	RNRL	H	PT cartaceo AIFA	Formulazione iniettabile a somministrazione semestrale Indicato per la terapia di mantenimento della schizofrenia limitatamente ai pazienti adulti adeguatamente trattati con paliperidone palmitato formulazione iniettabile a rilascio prolungato a somministrazione trimestrale (Trevicta) (350 o 525 mg) per almeno 6 mesi, con le ultime 2 dosi con lo stesso dosaggio e con punteggio totale PANSS stabilmente <70	Hub e Spoke: - Psichiatria  Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AX16	Brexipirazolo	os	RR	A-PHT		Indicato per il trattamento della schizofrenia nei pazienti adulti	Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia  Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05CD08	Midazolam	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	Crisi convulsive acute prolungate in bambini e adolescenti (da 3 mesi a < 18 anni)  Forme idiopatiche Sindrome di Dravet Sindrome di Panayiotopoulos	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia - Pediatria  Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N05CD14	Remimazolam	ev	OSP	C		Sedazione procedurale negli adulti	Hub e Spoke - Gastroenterologia	
N06AB03	Fluoxetina	os	RR	A			Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N06AX21	Duloxetina cloridrato	os	RR	A/C		Dolore grave e persistente		4
N06AX21	Duloxetina cloridrato	os	RR	A/C		Trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato	<b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatria	
N06AX26	Vortioxetina bromidrato	os	RR	A		Trattamento episodi depressivi maggiori negli adulti	<b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatria	
N06AX27	Esketamina	inal	RMR	H		In combinazione con un SSRI o un SNRI, è indicato per adulti con disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento, che non hanno risposto ad almeno due diversi trattamenti con antidepressivi nel corso dell'attuale episodio depressivo da moderato a grave	<b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatria  Centri di salute mentale (CSM)	
N06BA04	Metilfenidato	os	RMR	A-PHT	PT web-based AIFA	CPR a Rilascio Modificato: Indicato come parte di un programma globale di trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti nei casi in cui le sole misure correttive si dimostrano insufficienti. Il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista in disturbi comportamentali in età pediatrica.	<b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatria  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Neuropsichiatria infantile	
N06BA04	Metilfenidato (cloridrato)	os	RMR	A-PHT	PT web-based AIFA - Legge 648/96	Trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD) negli adulti già in trattamento farmacologico prima del compimento del diciottesimo anno di età.	<b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatria  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Neuropsichiatria infantile	
N06BA07	Modafinil	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N06BA09	Atomoxetina (cloridrato)	os	RNRL	A-PHT	PT web-based AIFA - Legge 648/96		<p><b>Hub e Spoke:</b> - Psichiatria</p> <p><b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Neuropsichiatria infantile</p>	
N06BA14	Solriamfetol	os	RRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	<p>Indicato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva in pazienti adulti affetti da narcolessia (con o senza cataplessia).</li> <li>- migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva (Excessive Daytime Sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnoea, OSA) nei quali l'EDS non e' stata trattata in modo soddisfacente con la terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione positiva continua nelle vie aeree (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)</li> </ul>	<p><b>Hub:</b> - Neurologia</p>	
N06BX13	Idebenone	os	RR	C		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel trattamento di deficit cognitivo- comportamentali conseguenti a patologie cerebrali sia di origine vascolare che degenerativa</li> <li>- Miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich</li> </ul>	<p><b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
N06BX14	Idebenone	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	E' indicato per il trattamento della compromissione visiva in pazienti adulti e adolescenti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON)	<p><b>Hub e Spoke:</b> - Oftalmologia - Neurologia</p>	
N06DA02	Donepezil Cloridrato	os	RRL/RNRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	<p>Trattamento della malattia di Alzheimer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26</li> <li>- di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20</li> </ul>	<p><b>Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)</b></p>	85
N06DA03	Rivastigmina	os,transderm	RRL	A	PT cartaceo AIFA	<p>Trattamento della malattia di Alzheimer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26</li> <li>- di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20</li> </ul>	<p><b>Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)</b></p>	85
N06DA04	Galantamina (bromidato)	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	<p>Trattamento della malattia di Alzheimer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26</li> <li>- di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20</li> </ul>	<p><b>Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)</b></p>	85

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N06DX01	<b>Memantina (cloridrato)</b>	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave	Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)	85
N07BB04	<b>Naltrexone Cloridrato</b>	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC02	<b>Metadone cloridrato</b>	os	OSP	H		Terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi (OST) in pazienti adulti, nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC05	<b>Levomethadone cloridrato</b>	os	OSP	C		Terapia sostitutiva di mantenimento nella dipendenza da oppioidi negli adulti, in associazione con un adeguato supporto medico, sociale e psicosociale.	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC51	<b>Buprenorfina/naloxone</b>	os	RMR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07XX	<b>Edaravone</b>	ev	OSP			Trattamento di pazienti con diagnosi definitiva o probabile di sclerosi laterale amiotrofica, selezionati secondo specifici criteri: eta' ≥ 18 anni; punteggio ≥ 2 in ogni item della scala ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRRS-R); funzionalità respiratoria caratterizzata da un valore di Capacità Vitale Forzata (CVF) ≥ 80% del teorico; durata di malattia dall'esordio dei sintomi ≤ 2 anni; riduzione di 1-4 punti nel punteggio ALS Functional Rating Scale-Revised nelle 12 settimane precedenti all'inizio del trattamento.	Hub: - Neurologia (GOM RC-AOU CZ-AO CS) Spoke: - Neurologia (PO VV-ASP VV)	
N07XX02	<b>Riluzolo</b>	os	RRL	A-PHT		sclerosi laterale amiotrofica (SLA)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N07XX04	<b>Sodio oxibato</b>	os	RNRL	C/H		narcolessia con cataplessia in pazienti adulti	<p><u>Classe C</u> Neurologia</p> <p><u>Classe H</u> Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche</p>	
N07XX05	<b>Amifampridina</b>	os	RRL	C		Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Neurologia	
N07XX06	<b>Tetrabenazina</b>	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Neurologia - Psichiatria - Geriatria	
N07XX08	<b>Tafamidis</b>	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 al fine di ritardare la compromissione neurologica periferica	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N07XX08	<b>Tafamidis</b>	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'amiloidosi da transtiretina wild type o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTR-CM)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024) U.O. Cardiologia del PO di Polistena - ASP Reggio Calabria U.O. Cardiologia del PO di Castrovillari - ASP Cosenza	
N07XX11	<b>Pitolisant</b>	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	Indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre l'eccessiva sonnolenza diurna (excessive daytime sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva nel sonno (obstructive sleep apnea, OSA) nei quali l'EDS non è stata trattata in modo soddisfacente dalla terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione continua positiva delle vie aeree (continuous positive airway pressure, CPAP) o nei quali tale terapia non sia stata tollerata.	<b>Hub:</b> - Neurologia  Ambulatorio di Pneumologia dello Spoke di Crotone – ASP CROTONE	
N07XX11	<b>Pitolisant</b>	os	RRL	A-PHT		Negli adulti per il trattamento della narcolessia con o senza cataplessia	<b>Hub:</b> - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N07XX12	<b>Patisiran Sodico</b>	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o stadio 2	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N07XX15	<b>Inotersen</b>	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi ereditaria da accumulo da transtiretina (hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N07XX18	<b>Vutrisiran</b>	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	Trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o allo stadio 2	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
<b>P</b>	<b>FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI</b>							
P01CX01	<b>Pentamidina Isetionato</b>	ev	RRL	A-PHT			<b>Hub e Spoke:</b> - Malattie Infettive - Pneumologia	
<b>R</b>	<b>SISTEMA RESPIRATORIO</b>							
R03AC04	<b>Fenoterolo</b>	inal	RR	A		Trattamento sintomatico degli attacchi asmatici; profilassi dell'asma da sforzo; trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	
R03AC12	<b>Salmeterolo Xinafoato</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AC13	<b>Formoterolo</b>	inal,os	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pneumologia</li> </ul>	99
R03AC18	<b>Indacaterolo</b>	os	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pneumologia</li> </ul>	99
R03AC19	<b>Olodaterolo</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pneumologia</li> </ul>	99
R03AK06	<b>Salmeterolo Xinafoato/Fluticasone Propriionato</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pneumologia</li> </ul>	99
R03AK07	<b>Budesonide/Formoterolo Fumarato</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p><b>MMG</b></p> <p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Interna</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Pneumologia</li> </ul>	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AK08	<b>Formoterolo/beclometasone</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AK10	<b>Fluticasone furoato/vilanterolo</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL03	<b>Umeclidinio bromuro/Vilanterolo trifenatato</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL04	<b>Indacaterolo/glicopirronio bromuro</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL05	<b>Bromuro di aclidinio/Formoterolo</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AL06	<b>Tiotropio/Olodaterolo</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL07	<b>Glicopirronio/Formoterolo</b>	Inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL08	<b>Fluticasone/Umeclidinio/Vilanterolo</b>	inal	RRL	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL09	<b>Beclometasone/Formoterolo/glicopirronio bromuro</b>	inal	RRL	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL09	<b>Beclometasone/Formoterolo/glicopirronio bromuro</b>	inal	RRL	A	PT cartaceo AIFA	Terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma, per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose media oppure elevata di corticosteroidi, non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia - Allergologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AL11	<b>Glicopirronio/Formoterolo/Budesonide</b>	Inal	RNRL	A	PT Sistema TS	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03BB04	<b>Tiotropio bromuro cloridrato</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03BB05	<b>Acidinio bromuro</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03BB06	<b>Glicopirronio bromuro</b>	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<b>MMG</b> <b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03DC03	<b>Montelukast</b>	os	RR	A		Trattamento di "seconda linea" dell'asma moderata persistente, in aggiunta agli steroidi per via inalatoria, quando questi non garantiscano un controllo adeguato della patologia, anche dopo associazione con $\beta$ -2 agonisti  Profilassi dell'asma da sforzo	<b>Hub e Spoke:</b> - Pneumologia - Medicina Generale  <b>Ambulatori specialistici territoriali:</b> - Allergologia - Pneumologia - Pediatria - Medicina  <b>Per pazienti pediatrici affetti da asma (Nota 336746/2018)</b> - Pediatria	82

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03DX05	<b>Omalizumab</b>	sc,ev	RRL	A-PHT	<b>PT cartaceo AIFA</b>	Asma di accertata natura IgE mediata	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pneumologia</li> <li>- Allergologia</li> <li>- Immunologia</li> <li>- Pediatria</li> </ul> <p>- Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria</p>	
R03DX05	<b>Omalizumab</b>	sc,ev	RRL	A-PHT	<b>PT web-based AIFA</b>	Orticaria cronica spontanea	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dermatologia</li> <li>- Allergologia</li> <li>- Pediatria</li> </ul>	
R03DX05	<b>Omalizumab</b>	sc	RRL	A-PHT	<b>PT Cartaceo AIFA</b>	Indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a diciotto anni) con Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) grave per i quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allergologia</li> <li>- Immunologia</li> <li>- ORL</li> </ul>	
R03DX07	<b>Roflumilast</b>	os	RRL	A-PHT		E' indicato come terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronica ostruttiva grave (BPO) (FEV1 post-broncodilatatore meno del 50% del teorico) associata a bronchite cronica nei pazienti adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al trattamento broncodilatatore	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pneumologia</li> <li>- Geriatria</li> <li>- Medicina Generale</li> </ul>	
R03DX09	<b>Mepolizumab</b>	sc,ev	RRL	A-PHT	<b>Scheda Regionale DCA PT generico</b>	Terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilo refrattario severo in pazienti adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni	<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pneumologia</li> <li>- Allergologia</li> <li>- Immunologia</li> <li>- Pediatria</li> </ul> <p>- Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) severa per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Allergologia - Immunologia - ORL	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Granulomatosi eosinofila con poliangite (EGPA)	<b>Rete Malattie Rare</b> (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Sindrome Iper eosinofila (HES)	<b>Hub:</b> - Allergologia - Ematologia - Immunologia - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia	
R03DX10	Benralizumab	sc	RRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Terapia di mantenimento aggiuntiva in pazienti adulti con asma eosinofilo severo non adeguatamente controllato malgrado l'impiego di corticosteroidi per via inalatoria a dosi elevate e $\beta$ -agonisti a lunga durata d'azione	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria	
R03DX11	Tezepelumab	sc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Indicato come trattamento aggiuntivo di mantenimento in adulti e adolescenti di età pari o superiore ai dodici anni con asma severa che non sono adeguatamente controllati nonostante alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più un altro medicinale per il trattamento di mantenimento	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R05CB13	<b>Dornase alfa</b>	inal	RNRL	A-PHT			<b>Centro Regionale Fibrosi Cistica</b>	
R05DA20	<b>Diidrocoideina + acido benzoico</b>	os	RR	A		tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R05DA	<b>Diidrocoideina</b>	os	RR	A		tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R05DB27	<b>Levodropropizina</b>	os	RR	A		tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R06AD02	<b>Prometazina Cloridrato</b>	im,os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R06AE06	<b>Oxatomide</b>	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AE07	<b>Cetirizina Dicloridrato</b>	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AE09	<b>Levocetirizina dicloridrato</b>	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AX13	<b>Loratadina</b>	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AX17	<b>Ketotifene fumarato acido</b>	os	RR	A		Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in monoterapia per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a 6 anni e di peso pari o superiore a 25 kg affetti da fibrosi cistica (FC), che hanno una delle seguenti mutazioni di gating (di classe III) nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R. [Data inizio monitoraggio AIFA 05/05/2015] o che hanno una mutazione R117H CFTR [Data inizio monitoraggio AIFA 12/04/2017 per i pz i età pari o superiore a 18 anni]; [Data inizio monitoraggio 04/01/2022 per i pz di età pari o superiore a 6 anni]	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	In un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a sei e minore di dodici anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Kalydeco» compresse e' indicato in regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Kalydeco» compresse e' indicato in regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono eterozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) per F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Kalydeco» compresse e' indicato in regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure; di funzione residua (genotipo F/RF) oppure; non classificata (genotipo F/non classificato) oppure; non identificata (genotipo F/non identificato).	Centro Regionale Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		Indicato in associazione con ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg compresse per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari e superiore a sei anni affetti da fibrosi cistica (FC), omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR o eterozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		Indicato in un regime di associazione con ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor compresse, per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure di funzione residua (genotipo F/RF) oppure non classificata (genotipo F/non classificato) oppure non identificata (genotipo F/non identificato)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		In un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a sei e minore di dodici anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX30	Lumacaftor / ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 1 anno omozigoti per la mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX30	Lumacaftor / ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Granulato: indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in bambini di età pari o superiore a 2 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX30	Lumacaftor / ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 6 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX31	Tezacaftor/ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica (FC) di età pari e superiore a dodici anni, omozigoti per la mutazione F508del o eterozigoti per la mutazione F508del e che presentano una delle seguenti mutazioni nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR): P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A → G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789 + 5G → A, 3272-26A → G, e 3849 + 10kbC → T	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX32	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a dodici anni, che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) o eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF).	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX32	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età da sei a minore di dodici anni che hanno almeno una mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX33	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse, per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure di funzione residua (genotipo F/RF) oppure non classificata (genotipo F/non classificato) oppure non identificata (genotipo F/non identificato)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
S	<b>ORGANI DI SENSO</b>							

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01AA12	Tobramicina	loc	RR	C			<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattie Infettive</li> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Pediatria</li> <li>- Pneumologia</li> </ul> <p><b>Centri Fibrosi Cistica</b></p>	
S01BA15	Fluocinolone acetoneide	intravitr	OSP	H	PT Cartaceo AIFA	Trattamento della compromissione visiva associata all'edema maculare diabetico cronico che non risponde in misura sufficiente alle altre terapie disponibili.	<p><b>Hub:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oculistica</li> </ul>	
S01BC10	Nepafenac	loc	RR	H			<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oculistica</li> </ul>	
S01EB01	Pilocarpina Cloridrato	loc	RR	A			<p><b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medicina Generale</li> <li>- Oncologia</li> <li>- Oculistica</li> <li>- Gastroenterologia</li> </ul>	
S01LA03	Pegaptanib sodico	intravitr	OSP	H		E' indicato per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD) negli adulti	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oculistica</li> </ul>	
S01LA04	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oculistica</li> </ul>	98
S01LA04	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Edema maculare diabetico (DME)	<p><b>Hub e Spoke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oculistica</li> </ul>	98

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01LA07	<b>Ranibizumab</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA07	<b>Ranibizumab</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia patologica (PM)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA05	<b>Aflibercept</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Indicato nei neonati pretermine per il trattamento di retinopatia del prematuro (Retinopathy Of Prematurity , ROP) con zona I (stadio 1+, 2+, 3 o 3+), zona II (stadio 2+ or 3+) o AP-ROP (ROP aggressiva posteriore)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA05	<b>Aflibercept</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA05	<b>Aflibercept</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA05	<b>Aflibercept</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA06	<b>Brolucizumab</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01LA06	<b>Brolucizumab</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	Indicato negli adulti per il trattamento di diminuzione visiva causata da edema maculare diabetico (DME)	<b>Hub e Spoke:</b> - Oculistica	98
S01LA09	<b>Faricimab</b>	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	<ul style="list-style-type: none"> <li>Degenerazione maculare legata all'età di tipo neovascolare (umida) (nAMD)</li> <li>Compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico(DME)</li> </ul>	<b>Hub e Spoke:</b> - Oculistica	98
S01XA18	<b>Ciclosporina</b>	loc	RRL	A-PHT		Trattamento di severa cheratocongiuntivite Vernal (VKC) nei bambini al di sopra di 4 anni e negli adolescenti	<b>Hub e Spoke:</b> - Oculistica	
S01XA18	<b>Ciclosporina</b>	loc	RRL	A-PHT		Trattamento della cheratite grave in pazienti adulti con sindrome dell'occhio secco non migliorata malgrado il trattamento con sostituti lacrimali	<b>Hub e Spoke:</b> - Oculistica	83
S01XA19	<b>Cellule epiteliali corneali umane autologhe</b>	imp. sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti affetti da deficit di cellule staminali limbari da moderato a grave (definito dalla presenza di neovascolarizzazione superficiale della cornea in almeno due quadranti, con coinvolgimento della parte centrale della cornea e grave compromissione dell'acuità visiva), unilaterale o bilaterale, causato da ustioni oculari da agenti fisici o chimici. Per la biopsia sono necessari almeno 1-2 mm2 di tessuto limbare non danneggiato	<b>Hub:</b> - Oculistica	
S01XA22	<b>Ocriplasmina</b>	intravitr	OSP	H			<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
S01XA24	<b>Cenegermin</b>	loc	RNRL	H		Trattamento della cheratite neurotrofica moderata (difetto epiteliale persistente) o severa (ulcera corneae) negli adulti	<b>Hub e Spoke:</b> - Oculistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01XA27	Voretigenene neparvec	sottoretinico	OSP	H	Registro web-based AIFA	Trattamento di pazienti adulti e pediatrici con perdita della vista dovuta adistrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che abbiano sufficienti cellule retiniche vitali	Hub: - Oculistica	
V	VARI							
V01AA02	Polline di graminacee	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		Hub e Spoke: - Allergologia - Pediatria - Otorinolaringoiatria - Pneumologia - Immunologia	
V01AA07	Allergeni estratti da Veleno di Ape adsorbito su gel di Idrossido di Alluminio	ev	OSP	H		Immunoterapia allergene specifica per pazienti con una storia documentata di reazioni allergiche IgE-mediate generalizzate e/o sistemiche causate da sensibilizzazione al veleno di Ape (Apis mellifera), confermata da Skin Prick Test e/o test intradermico e/o IgE specifiche	Hub e Spoke: - Allergologia	
V01AA07	Allergeni estratti da Veleno di Ape adsorbito su gel di Idrossido di Alluminio idrato	ev	OSP	H		Immunoterapia allergene specifica per pazienti con una storia documentata di reazioni allergiche IgE-mediate generalizzate e/o sistemiche causate da sensibilizzazione al veleno di vespa (Vespa spp.), confermata da Skin Prick Test e/o test intradermico e/o IgE specifiche	Hub e Spoke: - Allergologia	
V03AB35	Sugammadex	ev	OSP	H		Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti. Per la popolazione pediatrica: sugammadex è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 17 anni.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
V03AB37	Idarucizumab	ev	OSP	H		Indicato nei pazienti adulti trattati con dabigatranetexilato nei casi in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti: negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti2-nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero DCA 88/2017	
V03AB38	Andexanet alfa	ev	OSP	C		Indicato per pazienti adulti trattati con un inibitore diretto del fattore Xa (Fxa) (apixaban o rivaroxaban), quando è richiesta l'inversione della terapia anticoagulante a causa di emorragie potenzialmente fatali o incontrollate	Hub e Spoke: - Centri DEA 1 e 2 - Pronto Soccorso  Elenco sito Ministero della Salute aggiornato al 6 dicembre 2021	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V03AC01	Deferoxamina Mesilato	im,ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Ematologia - Servizio Trasfusionale - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria	
V03AC02	Deferiprone	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>  <b>Hub e Spoke:</b> - Servizio Trasfusionale	
V03AC03	Deferasirox	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>  <b>Hub e Spoke:</b> - Servizio Trasfusionale	
V03AE01	Sodio Polistiren Solfonato	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Generale - Nefrologia - Cardiologia - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE02	Sevelamer	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE03	Lantanio carbonato idrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE05	Ossiidrossido sucroferrico	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Nefrologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V03AE09	<b>Patiromer</b>	os	RRL	A-PHT		Indicato per il trattamento dell'iperkaliemia negli adulti	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiologia - Nefrologia - Medicina interna	
V03AE10	<b>Ciclosilicato di sodio e zirconio</b>	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	Indicato per il trattamento dell'iperkaliemia negli adulti	<b>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</b> - Cardiologia - Nefrologia - Medicina interna	
V03AF01	<b>Mesna</b>	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
V03AF03	<b>Calcio Folinato</b>	im,ev,os	RR	A		Recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolicolo		11
V03AF09	<b>Glucarpidasi</b>	ev	OSP	H		Indicato per ridurre concentrazioni plasmatiche tossiche di metotrexato in adulti e bambini (di età pari e superiore a ventotto giorni) con eliminazione ritardata di metotrexato o a rischio di tossicità da metotrexato	<b>Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020</b> Centri di II - III livello <b>Hub:</b> - Oncoematologia Pediatrica - Reumatologia <b>Hub e Spoke:</b> - Anestesia e Rianimazione - Medicina d'urgenza	
V03AH01	<b>Diazossido</b>	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico		<b>Hub e Spoke:</b> - Medicina Generale - Oncologia - Gastroenterologia - Pediatria	
V04CD01	<b>Metirapone</b>	os	RNRL	A-PHT			<b>Hub:</b> - Medicina Generale - Endocrinologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V04CJ01	<b>Tireotropina alfa</b>	im	OSP	H			<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
V09IX14	<b>Gozetotide</b>	ev	OSP	H		A seguito della marcatura con gallio-68, è indicato per la rilevazione di lesioni positive all'antigene di membrana specifico della prostata (prostate-specific membrane antigen, PSMA) con tomografia a emissione di positroni (PET) in adulti con carcinoma prostatico (PCa) nei seguenti contesti clinici:  - Stadiazione primaria di pazienti con PCa ad alto rischio prima della terapia curativa primaria; - Sospetta recidiva del PCa in pazienti con livelli crescenti di antigene prostatico specifico (prostate-specific antigen, PSA) nel siero dopo terapia curativa primaria; - Identificazione di pazienti con carcinoma prostatico metastatico progressivo resistente alla castrazione (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) positivo al PSMA per i quali è indicata la terapia mirata al PSMA	<b>Hub:</b> - Medicina Nucleare	
V10XX02	<b>Ibritumomab tiuxetano</b>	ev	OSP	H		Indicato come terapia di consolidamento dopo l'induzione della remissione in pazienti con linfoma follicolare non pretrattati	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
V10XX03	<b>Ibritumomab tiuxetano</b>	ev	OSP	H		Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non-Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a rituximab	<b>Rete Ematologica Regionale</b> DCA n. 102/2020 <b>Centri di II - III livello</b>	
V10XX03	<b>Radio-223 dicloruro</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	In monoterapia o in associazione con un analogo dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizante (Luteinising Hormone-Releasing Hormone, LHRH) è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer, mCRPC), con metastasi ossee sintomatiche e senza metastasi viscerali note, in progressione dopo almeno due precedenti linee di terapia sistemica per il mCRPC (diverse dagli analoghi del LHRH) o non eleggibili ai trattamenti sistemici disponibili per il mCRPC 2. limitare l'uso ai pazienti che sono stati sottoposti a due precedenti trattamenti per il carcinoma prostatico metastatico (cancro della prostata che si è diffuso alle ossa) o che non possono ricevere altri trattamenti.	<b>Hub, Spoke e Ospedali generali:</b> - Oncologia	
V10XX04	<b>Lutezio-177LU-Oxodotreotide</b>	ev	OSP	H	<b>Registro web-based AIFA</b>	Trattamento di tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (NET-GEP) ben differenziati (G1 e G2), progressivi, non asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la somatostatina.	<b>Hub:</b> - Oncologia - Radioterapia	