

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A	APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO								
A02BA01	Cimetidina	os,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			48
A02BA02	Ranitidina	os,ev	RR		Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			48
A02BA03	Famotidina	os,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			48
A02BA04	Nizatidina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			48
A02BB01	Misoprostolo	os	RNR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			1
A02BC01	Omeprazolo	os,ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			1, 48
A02BC02	Pantoprazolo	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			1, 48

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A02BC03	Lansoprazolo	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			1, 48
A02BC04	Rabeprazolo	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			48
A02BC05	Esomeprazolo	os, ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA Nota 1-48	DCA 66/2015			1, 48
A03AB02	Glicopirronio	os	RRL	A-PHT		DCA 225/2024	Trattamento sintomatico della scialorrea severa (ipersalivazione patologica cronica) in bambini e adolescenti di età pari o superiore a tre anni con patologie neurologiche croniche	Hub e Spoke: - Neurologia - Pediatria Neuropsichiatria infantile	
A04AA05	Palonosetron	ev	OSP	H		DCA 93/2016		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
A04AA55	Palonosetron/netupitant	os	RRL	H		DCA 93/2016		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
A05AA03	Acido colico	os	RNRL	H		DCA 146/2017	Trattamento dei difetti congeniti della sintesi degli acidi biliari primari causati dal deficit di 3β-idrossi-Δ5-C27-steroide ossidoreduttasi o deficit di Δ4-3-ossosteroido-5β-reduttasi in lattanti, bambini e adolescenti da 1 mese a 18 anni di età e negli adulti.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A05AA04	Acido obeticolico	os	RRL	H	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Trattamento della colangite biliare primitiva (PBC, primary biliary cholangitis) (nota anche come cirrosi biliare primitiva) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA	Hub: - Medicina Generale - Gastroenterologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A05AA04	Acido obeticolico	os	RRL	H	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Trattamento della colangite biliare primitiva (PBC, primary biliary cholangitis) (nota anche come cirrosi biliare primitiva) in combinazione con acido ursodesossicolico (UDCA) negli adulti con risposta inadeguata all'UDCA o come monoterapia negli adulti che non tollerano l'UDCA	Hub: - Medicina Generale - Gastroenterologia	
A05AX04	Maralixibat	os	RRL	H		DCA 66/2024	Indicato per il trattamento del prurito colestatico in pazienti affetti da sindrome di Alagille (ALGS) di età pari e superiore a due mesi	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A05AX05	Odevixibat sesquidrato	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 133/2023	Trattamento della colestasi intraepatica familiare progressiva (progressive familial intrahepatic cholestasis, PFIC) in pazienti di età pari o superiore ai sei mesi.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A06AH01	Metilnaltrexone bromuro	sc	RR	A		DCA 164/2018	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	90
A06AH03	Naloxegol	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	90
A06AH05	Naldemedina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 134/2021	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia cronica e continuativa con oppiacei resistenza al trattamento con almeno due lassativi di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Neurologia - Terapia del dolore - Cure palliative Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche (DCA 70/2022)	90
A07AA11	Rifaximina	os	RR/RRL*	A-PHT		DCA 88/2017	Riduzione delle recidive di episodi di encefalopatia epatica conclamata in pazienti di età superiore o uguale a 18 anni	Hub, Spoke e Ospedali Generali: - Malattie infettive - Medicina Interna - Gastroenterologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A07EA06	Budesonide	os	RRL	A-PHT		DCA 111/2024	Indicato per il trattamento dell'esofagite eosinofila (EE) negli adulti (età superiore a diciotto anni)	Hub eSpoke: - Medicina Interna - Gastroenterologia	
A08AA12	Setmelanotide	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 225/2024	Indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati a sindrome di Bardet-Biedl (BBS), geneticamente confermata negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai sei anni Codice di esenzione MR: RN1380	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A08AA12	Setmelanotide	sc	RRL	H		DCA 225/2024	Indicato per il trattamento dell'obesità e il controllo della fame associati all'obesità ipotalamica acquisita (HO) da craniofaringioma di pazienti con età maggiore di sei anni	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	Legge 648/96
A09AA02	Pancrelipasi	os	RR	A		DCA 93/2016	Trattamento dell'insufficienza pancreatica esocrina causata da fibrosi cistica, pancreatite cronica, pancreatectomia, gastrectomia totale e resezioni gastriche parziali (Billroth/I/II), ostruzione duttale da neoplasie (es. del pancreas o del coledoco)		
A09AA02	Pancrelipasi 35000	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 70/2022	Terapia sostitutiva con enzimi pancreatici per l'insufficienza pancreatica esocrina dovuta a fibrosi cistica o altre condizioni (p. es. pancreatite cronica, pancreatectomia o cancro pancreatico). Le capsule gastroresistenti sono indicate nei bambini, negli adolescenti e negli adulti.	Hub e Spoke: - Medicina Interna - Oncologia - Gastroenterologia - Pediatria Centro Regionale Fibrosi Cistica	
A10AE04	Insulina Glargine 300	sc	RR	A-PHT		DCA 164/2018	Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE04	Insulina Glargine 100	sc	RR	A-PHT		DCA 164/2018	Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE04	Insulina Glargine Biosimilare 100	sc	RR	A-PHT		DCA 164/2018	Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10AE06	Insulina degludec	sc	RR	A-PHT		DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello	
A10AE07	insulina icodec	sc	RR	A-PHT		DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	Diabete mellito	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG	
A10AE54	Insulina glargine + lixisenatide	sc	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10AE56	Insulina degludec + liraglutide	sc	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD07	Sitagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD08	Vildagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD09	Alogliptin + pioglitazone	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD10	Saxagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BD11	Linagliptin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD13	Alogliptin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD15	Dapaglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD16	Canaglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD19	Empaglifozin + linagliptin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 02/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista	100
A10BD19	Empaglifozin + linagliptin	os	RRL	A-PHT	Ricetta DEMA	DCA 02/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	MMG/PLS Il MMG può effettuare la prescrizione mediante ricetta DEMA, nel periodo di validità del PT (Sistema TS) redatto dallo specialista	100
A10BD20	Empaglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 88/2017 DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD21	Saxagliptin + dapaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 02/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BD21	Saxagliptin + dapagliflozin	os	RRL	A-PHT	Ricetta DEMA	DCA 02/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	MMG/PLS Il MMG può effettuare la prescrizione mediante ricetta DEMA, nel periodo di validità del PT (Sistema TS) redatto dallo specialista	100
A10BD23	Ertuglifozin + metformina	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 109/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BD24	Ertuglifozin + sitagliptin	os	RRL	A-PHT	Ricetta DEMA	DCA 70/2022	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	MMG/PLS Il MMG può effettuare la prescrizione mediante ricetta DEMA, nel periodo di validità del PT (Sistema TS) redatto dallo specialista	100
A10BD24	Ertuglifozin + sitagliptin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 70/2022	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista	100
A10BH01	Sitagliptin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BH02	Vildagliptin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BH03	Saxagliptin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BH04	Alogliptin	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BH05	Linagliptin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BJ01	Exenatide	sc	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 02/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BJ02	Liraglutide	sc	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BJ03	Lixisenatide	sc	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 164/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BJ05	Dulaglutide	os	RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 126/2018 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BJ06	Semaglutide	sc,os	RRL/RR	A	PT Sistema TS	DCA 02/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BK01	Dapaglifozin	os	RR/RRL	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 93/2016 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BK01	Dapaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 70/2022 DCA 107/2022 DCA 111/2024	Insufficienza cardiaca - indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriale: - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS) INRCA Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A10BK01	Dapaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 106/2023	Indicato negli adulti per il trattamento della malattia renale cronica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Nefrologia	
A10BK02	Canaglifozin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 134/2021 DCA 02/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BK03	Empaglifozin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 93/2016 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BK03	Empaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 70/2022 DCA 107/2022 DCA 106/2023 DCA 238/2023	Indicato negli adulti per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica classe NYHA II-III con frazione d' eiezione compresa tra 41 e 59%	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia U.O. Medicina D'Urgenza - PO Pugliese-Ciacio AOU Catanzaro Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS) INRCA Presidio Ospedaliero di Ricerca di Cosenza	
A10BK03	Empaglifozin	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 315/2024	Malattia renale cronica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Nefrologia	
A10BK04	Ertuglifozin	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA 109/2020 Nota prot. 427568 del 29/12/2020	Per i pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A10BX16	Tirzepatide	os	RR	A-PHT	PT Sistema TS	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico: - come monoterapia quando l'uso di metformina è considerato inappropriato a causa di intolleranza o controindicazioni; - in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete	Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018). Ambulatori I,II,III livello MMG/PLS Specialisti: Diabetologo, Endocrinologo, Geriatra, Internista, Cardiologo, Nefrologo	100
A12AA12	Calcio acetato anidro	os	RR	A		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Nefrologia - Emodialisi	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AA01	Levocarnitina	ev	RR	A-PHT		DCA 164/2018	carezza primaria di carnitina	Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Generale	8
A16AA01	Levocarnitina	ev	RR	A-PHT		DCA 164/2018	carezza di carnitina secondaria a trattamento dialitico	Hub e Spoke: - Nefrologia - Emodialisi	8
A16AA04	Mercaptamina bitartrato	os	RNRL	A-PHT		DCA 147/2022	Trattamento della cistinosi nefropatica manifesta. La cisteamina riduce l'accumulo della cistina in alcune cellule (ad esempio leucociti e cellule muscolari ed epatiche) di pazienti con cistinosi nefropatica e, se il trattamento è iniziato precocemente, ritarda la comparsa dell'insufficienza renale	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AA05	Acido carglumico	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Pediatria - Medicina Generale	
A16AA06	Betaina anidra	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pediatria - Medicina Generale - Epatologia - Nefrologia	
A16AA07	Metreleptina	ev	RRL	H		DCA 109/2020	Indicato in aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva per il trattamento delle complicanze da deficit di leptina in pazienti affetti da lipodistrofia (LD): • con diagnosi confermata di LD generalizzata congenita (sindrome di Berardinelli-Seipjo) di LD generalizzata acquisita (sindrome di Lawrence) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 2 anni; • con diagnosi confermata di LD parziale familiare o di LD parziale acquisita (sindrome di Barraquer-Simons) negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 12 anni, per i quali le terapie standard non sono riuscite a raggiungere un controllo metabolico adeguato	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Pediatria	
A16AB02	Imiglucerasi	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine, in pazienti con diagnosi confermata di Malattia di Gaucher non neuropatica (Tipo 1) o neuropatica cronica (Tipo 3), i quali evidenzino inoltre significative manifestazioni cliniche non neurologiche della malattia	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB04	Agalsidasi beta	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Fabry (carezza di a-galattosidasi A)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AB05	Laronidasi	ev	RR	H		DCA 164/2018	Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di Mucopolisaccaridosi I (MPS I; deficit di a-L-iduronidasi), per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche della patologia	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB07	Alglucosidasi alfa	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Terapia enzimatica sostitutiva (ERT) a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Pompe (deficit di a-glucosidasi acida). Indicato negli adulti e nei pazienti pediatrici di qualsiasi età	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB09	Idursulfasi	ev	RR	H		DCA 164/2018	Trattamento a lungo termine dei pazienti con sindrome di Hunter (mucopolisaccaridosi II, MPS II)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB10	Velaglucerasi alfa	ev	RR	H		DCA 164/2018	Terapia enzimatica sostitutiva (TES) a lungo termine in pazienti affetti da malattia di Gaucher di tipo 1	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB13	Asfotase alfa	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti affetti da ipofosfatasi ad esordio pediatrico entro i sei mesi di età e in quei pazienti che pur avendo un esordio pediatrico più tardivo (≥ 6 mesi di età) sono affetti in forma severa Codice di esenzione MR = RC0160	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB14	Sebelipasi alfa	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	Indicato per la terapia enzimatica sostitutiva (TES) a lungo termine in pazienti affetti da deficit di lipasi acida lisosomiale (LAL) ad esordio precoce (entro il primo anno di vita) e a rapida progressione	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB15	Velmanase alfa	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020	Terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento di manifestazioni non neurologiche in pazienti affetti da alfa-mannosidosi da lieve a moderata	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB17	Cerliponase alfa	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020	Trattamento della patologia ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), nota anche come carenza di tripeptidil-peptidasi 1 (TPP-1)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AB18	Vestronidasi alfa	ev	OSP	H		DCA 134/2021	Indicato per la cura di manifestazioni non neurologiche di mucopolisaccaridosi VII (MPS VII; sindrome di Sly).	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB19	Pegvaliase	sc	RRL	H		DCA 134/2021	Indicato per il trattamento di pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU), di eta' pari e superiore ai sedici anni, che hanno un controllo inadeguato della fenilalanina ematica (livelli ematici di fenilalanina maggiori di 600 micromol/L) nonostante il trattamento precedente con le opzioni terapeutiche disponibili	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB20	Pegunigalsidasi alfa	ev	RR	H		DCA 225/2024	Indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti adulti con diagnosi confermata di malattia di Fabry (deficit di alfa-galattosidasi) Codice di esenzione MR: RCG080	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB21	Atidarsagene autotemcel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato per il trattamento della leucodistrofia metacromatica (MLD) caratterizzata da mutazioni bialleliche del gene arilsulfatasi A (ARSA) che comportano una riduzione dell'attività enzimatica di ARSA: - nei bambini con forme infantili tardive o giovanili precoci, senza manifestazioni cliniche della malattia, - nei bambini con la forma giovanile precoce, con manifestazioni cliniche precoci della malattia, che conservano la capacità di camminare autonomamente e prima dell'inizio del declino cognitivo	IRCCS San Raffaele di Milano Pediatria Immunoematologica	
A16AB22	Avalglucosidasi alfa	ev	RR	H		DCA 66/2024	Indicato per la terapia enzimatica sostitutiva (enzyme replacement therapy, ERT) a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Pompe (deficit di a- glucosidasi acida)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB23	Cipaglucosidasi alfa	ev	RR	H		DCA 56/2025	Terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine usata in associazione allo stabilizzatore enzimatico miglustat per il trattamento di adulti con malattia di Pompe a esordio tardivo (deficit di a-glicosidasi acida [GAA]) Codice di esenzione MR = RCG060	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB24	Pegzilarginasi	ev/sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento del deficit di arginasi 1 (ARG1-D), noto anche come iperargininemia, in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AB25	olipudasi	ev	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 332/2023	Indicato come terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche del deficit di sfingomielinasi acida (ASMD) di tipo A/B o B in pazienti pediatrici e adulti	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AX03	Sodio fenilbutirrato	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Medicina Generale - Pediatria - Neurologia	
A16AX04	Nitisinone	os	RR	A-PHT		DCA 164/2018		Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX04	Nitisinone	os	RR	A-PHT		DCA 106/2023	Trattamento di pazienti adulti con alcaptonuria (AKU)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX05	Zinco acetato	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Medicina Generale - Pediatria - Epatologia - Neurologia - Neuropsichiatria	
A16AX06	Miglustat	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018 DCA 109/2020	Trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX06	Miglustat	os	RRL	A-PHT		DCA 56/2025	Stabilizzatore enzimatico della cipaglicosidasi alfa per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti adulti con malattia di Pompe a esordio tardivo (deficit di α -glucosidasi acida [GAA]) Codice di esenzione MR = RCG060	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX07	Sapropterina	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Trattamento dell'iperfenilalaninemia (HPA) in soggetti adulti e pazienti pediatrici di qualsiasi età affetti da fenilchetonuria (PKU), che hanno mostrato una risposta a tale trattamento	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX08	Teduglutide	sc	RRL	H		DCA 259/2018	Trattamento di pazienti di 1 anno di età e oltre affetti da sindrome dell'intestino corto (SIS). I pazienti devono essere in condizioni stabili dopo un periodo di adattamento dell'intestino a seguito dell'intervento	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
A16AX10	Eliglustat	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018 DCA 95/2021	Trattamento a lungo termine di pazienti adulti con malattia di Gaucher di tipo 1 (GD1) che sono metabolizzatori lenti (poor metabolisers, PMs), metabolizzatori intermedi (intermediate metabolisers, IMs) o metabolizzatori estensivi (extensive metabolisers, EMs) per CYP2D6.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX12	Trientina tetraidroclicloridrato	os	RNRL	A-PHT		DCA 147/2022	Indicato per il trattamento del morbo di Wilson in adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 5 anni intolleranti alla terapia con D-penicillamina	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX14	Migalastat	os	RRL	A-PHT		DCA 88/2017	Trattamento a lungo termine negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni, con una diagnosi accertata di malattia di Fabry (carenza dell'a-galattosidasiA) e caratterizzati da una mutazione suscettibile	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
A16AX16	Givosiran	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Trattamento della porfiria epatica acuta (AHP) in adulti e adolescenti di età pari e superiore ai dodici anni.	Hub: - Medicina - Epatologia - Ematologia	
A16AX18	Lumasiran	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato per il trattamento dell'iperossaluria primitiva di tipo 1 (PH1) in tutte le fasce d'età	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B	SISTEMA SANGUE ED EMOPOIESI								
B01AA03	Warfarin	os	RR	A	Sistema TS	DCA 93/2016	La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97	MMG Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)	97

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AA07	Acenocumarolo	os	RR	A	Sistema TS	DCA 93/2016	La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97	<p>MMG</p> <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombosi ed emostasi <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) 	97
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profiliassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	<p>GU n. 183 del 06.08.2016</p> <p>GU n. 295 del 19.12.2016</p>	Legge 648/96
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	<p>GU n. 183 del 06.08.2016</p> <p>GU n. 302 del 28.12.2016</p>	Legge 648/96
B01AB04	Dalteparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profiliassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA ≥ 3)	<p>Hub, Spoke e Ospedali generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Ematologia <p>GU n. 251 del 28.10.2015</p>	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB05	Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare	sc,ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 295 del 19.12.2016	Legge 648/96
B01AB05	Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare	sc,ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB05	Enoxaparina sodica/ enoxaparina sodica biosimilare	sc,ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA ≥ 3) (Legge 648/96)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB06	Nadroparina Calcica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profilassi del tromboembolismo in GRAVIDANZA E PUERPERIO per le pazienti a rischio	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 295 del 19.12.2016	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB06	Nadroparina Calcica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB06	Nadroparina Calcica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB07	Parnaparina	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB07	Parnaparina	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB08	Reviparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	GU n. 183 del 06.08.2016 GU n. 302 del 28.12.2016	Legge 648/96
B01AB08	Reviparina Sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA \geq 3) (Legge 648/96)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Ematologia GU n. 251 del 28.10.2015	Legge 648/96
B01AB09	Danaparoid	ev	RR	H		DCA 191/2022	Trattamento di disturbi tromboembolici in pazienti che necessitano di anticoagulazione parenterale urgente a causa dello sviluppo o di anamnesi di HIT	Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Interna - Chirurgia - Ematologia	
B01AB09	Danaparoid	ev	RR	H		DCA 191/2022	Prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) in situazioni in cui non deve essere usata l'eparina, compresi pazienti con trombocitopenia indotta da eparina (HIT)	Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Interna - Chirurgia - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AB10	Tinzaparina	sc	RR	A-PHT		DCA 212/2023	<p>1. Profilassi della tromboembolia venosa (TEV) in pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico, in particolare ortopedico, generale o oncologico.</p> <p>2. Profilassi della tromboembolia venosa in pazienti adulti non chirurgici, immobilizzati a causa di una condizione clinica acuta, ivi incluse: insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria acuta, infezioni gravi, neoplasia attiva nonché esacerbazioni di malattie reumatiche.</p> <p>3. Prevenzione della coagulazione nei circuiti extracorporei durante l'emodialisi e l'emofiltrazione negli adulti.</p> <p>4. Trattamento della trombosi e della malattia tromboembolica venosa (TEV), ivi inclusi la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare negli adulti.</p> <p>5. Trattamento prolungato della tromboembolia venosa e prevenzione delle recidive in pazienti adulti con neoplasia attiva. Per alcuni pazienti con embolia polmonare (per esempio quelli con instabilità emodinamica grave), può essere indicato un trattamento alternativo, quale l'intervento chirurgico o la trombolisi.</p>		
B01AB12	Bemiparina sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (SVK) per manovre chirurgiche e/o invasive - BRIDGING THERAPY	<p>GU n. 183 del 06.08.2016</p> <p>GU n. 302 del 28.12.2016</p>	Legge 648/96
B01AB12	Bemiparina sodica	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA EBPM	DCA 164/2018	Profilassi della Trombosi Venosa Profonda in PAZIENTI ONCOLOGICI ambulatoriali a rischio (score di KHORANA ≥ 3)	<p>Hub, Spoke e Ospedali generali:</p> <p>- Oncologia</p> <p>- Ematologia</p> <p>GU n. 251 del 28.10.2015</p>	Legge 648/96
B01AC09	Epoprostenolo	ev	RRL	H		DCA 164/2018		<p>Hub:</p> <p>- Cardiologia (AO CS, AOU CZ)</p> <p>Spoke:</p> <p>- Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR)</p> <p>- Pneumologia (PO Castrovillari)</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AC11	Iloprost Sale Di Trometamolo	ev	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	Ipertensione polmonare	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (AO CS, AOU CZ , GOM RC) - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari) - Cardiologia Riabilitativa (AOU CZ) - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) 	
B01AC22	Prasugrel	os	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Sindrome coronarica acuta	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia 	
B01AC24	Ticagrelor	os	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 164/2018	In associazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta (SCA) o storia di infarto miocardico (IM) ed un alto rischio di sviluppare un evento aterotrombotico	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Medicina Interna - Medicina Interna (PO Praia a Mare - Ospedale di Zona) Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS) 	
B01AC25	Cangrelor	ev	OSP	H		DCA 259/2018	In co-somministrazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la riduzione degli eventi cardiovascolari trombotici nei pazienti adulti con cardiopatia coronarica sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI, percutaneous coronary intervention) che non hanno ricevuto un inibitore orale del recettore P2Y12 prima della procedura di PCI e nei quali la terapia con gli inibitori del recettore P2Y12 per via orale non è fattibile o auspicabile	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AC27	Selexipag	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 126/2018	Trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (IAP) in pazienti adulti in Classe Funzionale (FC) WHO II e III, sia come terapia di combinazione nei pazienti controllati in maniera insufficiente con un antagonista recettoriale dell'endotelina (ERA) e/o un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), che in monoterapia nei pazienti che non sono candidabili a tali terapie. L'efficacia è stata dimostrata in una popolazione di pazienti con IAP comprendente l'IAP idiopatica ed ereditaria, l'IAP associata a malattie del tessuto connettivo e l'IAP associata a cardiopatie congenite semplici corrette.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Pneumologia - Reumatologia	
B01AD02	Alteplase	ev	OSP	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Neurologia - Cardiologia - Emodinamica	
B01AE07	Dabigatran etexilato	os	RR	A	Sistema TS	DCA 93/2016 DCA 315/2024	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)	MMG Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Pollambulatorio di Medicina Interna di Delianuova – ASP RC	97
B01AE07	Dabigatran etexilato	os	RRL	A	PT web-based AIFA	DCA 93/2016 DCA 106/2023 DCA 315/2024 DCA 56/2025	Trattamento e Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Ematologia - Neurologia - Ortopedia - Medicina D'Urgenza	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AF01	Rivaroxaban	os	RR	A	Sistema TS	DCA 93/2016 DCA 315/2024	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV)	<p>MMG</p> <p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova - ASP RC 	97
B01AF01	Rivaroxaban	os	RRL	A	PT web-based AIFA	DCA 93/2016 DCA 106/2023 DCA 56/2025	Tattamento e Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Ematologia - Neurologia - Ortopedia - Medicina D'Urgenza 	
B01AF02	Rivaroxaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 191/2022	<ul style="list-style-type: none"> • 1 mg/ml - granuli per sospensione orale - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei neonati a termine, nei lattanti e bambini piccoli, nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale" • 15 mg - compressa rivestita con film - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso compreso tra 30 kg e 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale" • 20 mg - compressa rivestita con film - "trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a diciotto anni e peso superiore a 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale" 	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pediatria - Cardiologia - Medicina Interna - Ematologia 	
B01AF02	Rivaroxaban	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 95/2021	Rivaroxaban somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano coronaropatia (coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (peripheral artery disease, PAD) sintomatica	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia Chirurgia cardiovascolare Angiologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AF02	Apixaban	os	RR	A-PHT	Sistema TS	DCA 93/2016 DCA 315/2024	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV) La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97	MMG Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova - ASP RC	97
B01AF02	Apixaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 93/2016 DCA 106/2023 DCA 56/2025	Trattamento e Prevenzione Trombosi venosa profonda (TVP) - Embolia polmonare (EP)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Ematologia - Neurologia - Ortopedia - Medicina D'Urgenza	
B01AF03	Edoxaban	os	RR	A-PHT	Sistema TS	DCA 88/2017 PROT 427568 DEL 29.12.2018	Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare (FANV) La prescrizione della terapia anticoagulante orale è a carico del SSN limitatamente alla FANV e al rispetto del percorso decisionale illustrato nella Nota AIFA 97	MMG Hub e Spoke: - Cardiologia - Medicina Generale - Neurologia - Geriatria - Centri trombotici ed emostasi Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Poliambulatorio di Medicina Interna di Delianuova - ASP RC	97
B01AF04	Edoxaban	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 88/2017 PROT 427568 DEL 29.12.2018 DCA 106/2023 DCA 56/2025	Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria - Ematologia - Neurologia - Ortopedia - Medicina D'Urgenza	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B01AX07	Caplacizumab	ev	RRL	H		DCA 109/2020	Trattamento negli adulti degli episodi di porpora tromboticatrofocitopenica (PTT) acquisita, in associazione a plasmateresi (plasma exchange, PE) e immunosoppressione.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
B02AB02	Alfa1-antitripsina	ev	RNRL	H		DCA 88/2017 DCA 164/2018	Terapia cronica sostitutiva in soggetti con carenza congenita di inibitore dell'alfa1-proteinasi	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD01	Fattore IX, II, VII, X della coagulazione, prot. c, prot. s.	ev	OSP	H		DCA 164/2018		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD02	Efmoroctocog	ev	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 88/2017	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD02	Morotocog Alfa - (Fattore VIII di Coagulazione, Ricombinante)	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	Octocog alfa	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII). Può essere utilizzato in tutte le fasce d'età.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	Fattore VIII Di Coagulazione Del Sangue Umano Liofilizzato	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	Turotocog alfa	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia A (deficit congenito di fattore VIII)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD02	Turoctocog alfa pegol	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 147/2020	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti a partire da 12 anni affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII).	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	Lonoctocog	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 146/2017	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito del fattore VIII). Può essere utilizzato in pazienti di tutti i gruppi di età.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	Rurioctocog Alfa Pegol	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 109/2020	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti dai 12 anni in poi affetti da emofilia A	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD02	Damoctocog Alfa Pegol	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 109/2020	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti dai 12 anni in poi affetti da emofilia A	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD02	Fattore VIII di Coagulazione	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico / PT online webcare			Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD03	Complesso protrombinico attivato-fattore VIII	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico / PT online webcare	DCA 164/2018		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	Fattore IX Di Coagulazione Del Sangue Umano Liofilizzato	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD04	nonacog beta pegilato - fattore IX di coagulazione ricombinante	ev	RR	A-PHT		DCA 191/2022	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti da 12 anni in su affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD04	Eftrenonacog	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 88/2017	Trattamento e profilassi di episodi emorragici in pazienti con emofilia B (deficit congenito di fattore IX)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD04	Albutrepenonacog alfa	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 146/2017	Trattamento e la profilassi dell'emorragia nei pazienti con emofilia B (carenza congenita di fattore IX); può essere usato per tutti i gruppi d'età.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD04	Nonacog gamma	ev	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 146/2017	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX), adatto a pazienti di tutte le fasce di età.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BD05	Fattore VII della coagulazione sangue umano liofilizzato	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico / PT online webcare	DCA 164/2018		Hub: - Centri di Emofilia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD06	Fattore Von Willebrand umano	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico / PT online webcare	DCA 164/2018		Hub: - Centri di Emofilia	
B02BD04	Nonacog alfa (Fattore IX di Coagulazione, Ricombinante)	ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento e profilassi del sanguinamento in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX), adatto a pazienti di tutte le fasce di età.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B01BD11	Catridecacog	ev	OSP	H		DCA 164/2018 DCA 88/2017		Hub: - Centri di Emofilia	
B01BD15	Valoctogene roxaparvovec	ev	OSP	H		DCA 66/2024	Trattamento dell'emofilia A grave (deficit congenito di fattore VIII) in pazienti adulti senza anamnesi di inibitori del fattore VIII e senza anticorpi rilevabili anti-virus adeno-associato del sierotipo 5 (AAV5)	U.O. Emofilia e Patologie della Coagulazione - Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Trasfusionale - Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dubbecco" - Catanzaro	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BD14	Susoctocog alfa	ev	OSP	H		DCA 164/2018 DCA 88/2017	Negli adulti per il trattamento degli episodi emorragici in pazienti con emofilia acquisita causata da anticorpi nei confronti del fattore VIII.	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX04	Romiplostim	sc	RR	H		DCA n. 164/2018 – Nota prot. N. 427568 del 29/12/2020 DCA 70/2022	Indicato in pazienti adulti affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) (PTI) cronica che sono refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024) Spoke: - Ematologia (KR) - Microcitemia (KR)	
B02BX05	Eltrombopag	os	RR	H		DCA 56/2025	Trattamento di pazienti adulti con trombocitopenia immune primaria (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline) Codice di esenzione MR = RDG031	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX05	Eltrombopag	ev,os	RR	H		DCA n. 164/2018 Nota prot. N. 427568 del 29/12/2020 DCA 70/2022	Indicato in pazienti di età superiore ad 1 anno per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)	Hub: - Ematologia - Oncoematologia Pediatrica Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024) Spoke: - Microcitemia (POKR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BX05	Eltrombopag					DCA n. 164/2018 Nota prot. N. 427568 del 29/12/2020 DCA 70/2022	Indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
B02BX06	Emicizumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 109/2020	Profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A severa (deficit congenito di fattore VIII, FVIII < 1%) senza inibitori del fattore VIII. Il farmaco può essere usato in tutte le fasce d'età	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX06	Emicizumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	Profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A (deficit congenito di fattore VIII); senza inibitori del fattore VIII che presentano malattia moderata (FVIII \geq 1% e \leq 5%) con fenotipo emorragico severo	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX07	Lusutrombopag	os	RNRL	H		DCA 147/2020	Trattamento della trombocitopenia severa in pazienti adulti affetti da malattia epatica cronica sottoposti a procedure invasive	Hub: - Ematologia - Medicina Interna - Gastroenterologia Spoke: Gastroenterologia (PO KR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B02BX08	Avatrombopag	os	RR	H		DCA 107/2022	Trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) primaria cronica nei pazienti adulti refrattari ad altri trattamenti (ad es. corticosteroidi, immunoglobuline)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B02BX08	Avatrombopag	os	RR	H		DCA 107/2022	Trattamento della trombocitopenia grave, nei pazienti adulti con malattia epatica cronica (CLD) e programmati per essere sottoposti a una procedura invasiva	Hub e Spoke: - Ematologia - Medicina Interna - Gastroenterologia	
B02BX09	Fostamatinib	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Trattamento della trombocitopenia immune (immune thrombocytopenia, ITP) cronica in pazienti adulti refrattari a trattamenti di prima linea quali corticosteroidi e immunoglobuline in vena e refrattari o che presentino controindicazioni ad almeno uno tra tpora e rituximab	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B03AC	Derisomaltosio ferrico	ev	OSP	H		DCA 70/2022	Indicato negli adulti per il trattamento della carenza di ferro nelle seguenti condizioni: - quando le preparazioni di ferro per via orale sono inefficaci o non possono essere utilizzate; - quando vi è l'esigenza clinica di somministrare ferro rapidamente.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA01	Eritropoietina alfa originator e biosimilare	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare	DCA 164/2018		<p>Hub, Spoke e Ospedali generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina - Nefrologia - Geriatria - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi 	
B03XA01	Eritropoietina beta	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare	DCA 164/2018		<p>Hub, Spoke e Ospedali generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina - Nefrologia - Geriatria - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi 	
B03XA01	Eritropoietina zeta	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare	DCA 164/2018		<p>Hub, Spoke e Ospedali generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina - Nefrologia - Geriatria - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA01	Eritropoietina teta	ev,sc	RNRL	A	PT online webcare	DCA 164/2018		<p>Hub, Spoke e Ospedali generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina - Nefrologia - Geriatria - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi 	
B03XA02	Darbepoietina Alfa	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare	DCA 164/2018		<p>Hube Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi 	
B03XA03	Metosipolietilenglicole-epoetina beta	ev,sc	RNRL	A-PHT	PT online webcare	DCA 164/2018		<p>Hub, Spoke e Ospedali generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Ematologia - Chirurgia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria - Malattie Infettive - Anestesia - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi 	
B03XA05	Roxadustat	os	RNRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 106/2023	Trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica (MRC)	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nefrologia - Medicina Interna - Ematologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B03XA06	Luspatercept	sc	RNRL	A	PT web-based AIFA	DCA 70/2022 DCA 107/2022 DCA 147/2022	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente dovuta a sindrome mielodisplastica (SMD) a rischio molto basso, basso e intermedio, che presentano sideroblasti ad anello con risposta insoddisfacente o non idonei a terapia basata su eritropoietina.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
B03XA06	Luspatercept	sc	RNRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 70/2022 DCA 332/2023	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con anemia trasfusione dipendente, associata a beta-talassemia.	Rete Talassemia Regionale DCA n. 206/2023 Centro Hub e Centri Spoke di II livello	
B05AA01	Albumina Umana Soluzione	ev	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 15	DCA 164/2018 Nota prot. n. 427568 del 29/12/2020	In seguito a paracentesi evacuativa nella cirrosi epatica grave	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terapia Intensiva - Rianimazione - Chirurgia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Ematologia - Oncologia - Ginecologia - Cardiologia - Malattie infettive - Pneumologia - Servizi trasfusionali - Geriatria - Epatologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi <p>Ambulatorio di Gastroenterologia della Struttura Polispécialistica Gallico - Reggio Calabria - ASP Reggio Calabria</p>	15

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B05AA01	Albumina Umana Soluzione	ev	RR	A/C	Scheda Regionale DCA Nota 15	DCA 164/2018 Nota prot. n. 427568 del 29/12/2020	Grave ritenzione idrosalina nella cirrosi ascitica, nella sindrome nefrosica o nelle sindromi da malassorbimento, non responsiva a un trattamento diuretico appropriato, specie se associata ad ipoalbuminemia ed in particolare a segni clinici di ipovolemia	Hub e Spoke: - Terapia Intensiva - Rianimazione - Chirurgia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Ematologia - Oncologia - Ginecologia - Cardiologia - Malattie infettive - Pneumologia - Servizi trasfusionali - Geriatria - Epatologia Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pediatria - Nefrologia - Emodialisi	15
B06AC01	Inibitore umano della C1-esterasi	ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B06AC01	Inibitore umano della C1-esterasi	ev,sc	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 191/2022	Prevenzione degli attacchi di angioedema ereditario (HAE) ricorrenti negli adolescenti e negli adulti con deficit di inibitore della C1-esterasi	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
B06AC02	Icatibant acetato	sc	RR	H		DCA 164/2018	Indicato per la terapia sintomatica degli attacchi acuti di angioedema ereditario (AEE) negli adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni, con carenza di inibitore esterasi C1	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
B06AC05	Lanadelumab	sc	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 109/2020			
c	SISTEMA CARDIOVASCOLARE								
C01DX22	Vericiguat	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 164/2018 DCA 238/2023	Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica in pazienti adulti con ridotta frazione di eiezione stabilizzati dopo un recente evento di riacutizzazione che abbia richiesto una terapia per via endovenosa	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Cardiologia - Medicina Interna - Geriatria Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS)	
C01BD07	Dronedarone	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Indicato per il mantenimento del ritmo sinusale a seguito di cardioversione con esito soddisfacente in pazienti adulti clinicamente stabili con fibrillazione atriale (FA) parossistica o persistente. Dato il suo profilo di sicurezza deve essere prescritto solo dopo che siano state valutate opzioni alternative di trattamento	Hub e Spoke: - Cardiologia - Cardiocirurgia - Medicina e Chirurgia d'accettazione urgenza (MCAE)	
C01EB18	Ranolazina	os	RR	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Indicato negli adulti come terapia aggiuntiva nel trattamento sintomatico dei pazienti con angina pectoris stabile non adeguatamente controllati con le terapie antianginose di prima linea, come i betabloccanti e/o i calcioantagonisti, o che non le tollerano	Hub e Spoke: - Cardiologia - Geriatria - Medicina Generale Ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Geriatria - Medicina Interna	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C01EB21	Regadenoson	ev	OSP	C		DCA 95/2021	<p>Medicinale solo per uso diagnostico. Vasodilatatore coronarico selettivo da utilizzarsi negli adulti come agente per stress farmacologico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imaging di perfusione miocardica (myocardial perfusion imaging, MPI) con radionuclidi in pazienti incapaci di sottoporsi a un adeguato sforzo fisico. • la misurazione della riserva frazionale di flusso (FFR) di una singola stenosi dell'arteria coronaria durante l'angiografia coronarica invasiva, quando non sono previste misurazioni ripetute dell'FFR 	<p>Hub e Spoke: - Medicina Nucleare</p>	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		<p>DCA 164/2018 Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018</p>	Iipertensione Arteriosa Polmonare	<p>Hub e Spoke: - Cardiologia - Pneumologia - Reumatologia (solo GOM RC) - Medicina Generale (solo AOU CZ) Policlinico Madonna della Consolazione (ASP RC)</p>	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	Sclerodermia	<p>Hub e Spoke: - Medicina Generale</p>	
C02KX01	Bosentan	os	RRL	A-PHT		<p>DCA 164/2018 Nota prot 427568 del 29.12.2020</p>	Ulcere digitali	<p>Hub e Spoke: - Medicina Generale</p>	
C02KX02	Ambrisentan	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	Iipertensione Arteriosa Polmonare	<p>Hub: - Cardiologia - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC)</p> <p>Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari, Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC)</p>	
C02KX02	Ambrisentan	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	Sclerodermia	<p>Hub e Spoke: - Medicina Generale</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C02KX04	Macitentan	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	Ipertensione Arteriosa Polmonare	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Castrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari, Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) 	
C02KX05	Riociguat	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	ipertensione arteriosa polmonare (PAH) negli adulti	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Pneumologia - Cardiocirurgia - Reumatologia 	
C02KX05	Riociguat	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento della PAH in pazienti pediatrici di età inferiore ai 18 anni e con peso corporeo \geq a 50 kg, con classe funzionale (CF) OMS da II a III in associazione con antagonisti del recettore dell'endotelina	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Pneumologia - Cardiocirurgia - Reumatologia 	
C03DA05	Finerenone	os	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 225/2024	Trattamento dei pazienti adulti con malattia renale cronica (stadi 3 e 4 con albuminuria) associata a diabete mellito di tipo 2, in trattamento con ACEi/ARB alla massima dose tollerata e che presentino una delle seguenti condizioni: 1) controindicazione o intolleranza agli inibitori SGLT2; 2) comprovata evidenza di persistente albuminuria e/o rapido declino funzionale renale (perdita di eGFR \geq 3 mL/min/anno), nonostante il trattamento con inibitori SGLT2	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Endocrinologia - Geriatria - Nefrologia 	
C03XA01	Tolvaptan	os	RNRL	A-PHT	Scheda multifarmaco semplificata AIFA	DCA 146/2017 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Indicato per rallentare la progressione dello sviluppo di cisti e dell'insufficienza renale associata al rene policistico autosomico dominante (ADPKD) in adulti con CKD di stadio da 2 a 4 precoce (GFR \geq 25 mL/min) all'inizio del trattamento, con evidenza di malattia in rapida progressione.	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nefrologia 	
C03XA01	Tolvaptan	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti con iponatremia endocrina secondaria a sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH)	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endocrinologia - Nefrologia - Oncologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C07AA05	Propranololo Cloridrato	os	RR/RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub: - Pediatria - Neonatologia - Chirurgia Pediatrica - Chirurgia Vascolare - Dermatologia - Cardiologia Pediatrica - Chirurgia Plastica	
C07AB14	Landiololo Cloridrato	ev	OSP	C		DCA 70/2022	Tachicardia sopraventricolare e per il rapido controllo della frequenza ventricolare in pazienti con fibrillazione atriale o flutter atriale in circostanze perioperatorie, postoperatorie o di altro genere, dove si giudichi necessario il controllo a breve termine della frequenza ventricolare con un farmaco di breve durata d'azione.	Hub e Spoke: -Cardiologia	
C07AB14	Landiololo Cloridrato	ev	OSP	C		DCA 70/2022	Tachicardia sinusale non compensatoria laddove, secondo il giudizio del medico, la frequenza cardiaca accelerata richieda un intervento specifico	Hub e Spoke: -Cardiologia	
C08CA16	Clevidipina	ev	OSP	H		DCA 147/2020	Indicato per la rapida riduzione della pressione arteriosa durante la fase perioperatoria	Hub e Spoke: - Cardiologia interventistica - Cardiocirurgia	
C09BX05	Ramipril/Bisoprololo	os	RR	A		DCA 66/2024	per i dosaggi da 2,5 mg/2,5 mg, 5 mg/2,5 mg, 5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg e 10 mg/10 mg: Indicato come terapia sostitutiva per il trattamento dell'ipertensione e/o dell'ipertensione con coesistente sindrome cronica coronarica: - in pazienti con malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronopatia o ictus o malattia vascolare periferica) oppure - diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare e/o scompenso cardiaco cronico con ridotta funzione sistolica ventricolare sinistra (prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dalla fase acuta di infarto miocardico in pazienti con segni clinici di scompenso cardiaco, quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto). In pazienti adulti adeguatamente controllati con ramipril e bisoprololo somministrati contemporaneamente allo stesso livello di dose		
C09BX05	Ramipril/Bisoprololo	os	RR	A		DCA 66/2024	per il dosaggio da 2,5 mg/1,25 mg: Ramipril è indicato come terapia sostitutiva per il trattamento della sindrome coronarica cronica (in pazienti con una storia di infarto del miocardio e/o riarterizzazione) e/o insufficienza cardiaca cronica con ridotta funzionalità sistolica ventricolare sinistra in pazienti adulti adeguatamente controllati con ramipril e bisoprololo somministrati in concomitanza allo stesso dosaggio		

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C09DX04	Sacubitril/valsartan	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017 e prot 427568 del 29.12.2018 DCA 147/2022 DCA 106/2023	Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica sintomatica con frazione di eiezione ridotta	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Cardiologia - Geriatria U.O. Medicina D'Urgenza - PO Pugliese-Ciaccio AOU Catanzaro	
C10AA01	Simvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AA02	Lovastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AA03	Pravastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AA04	Fluvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AA05	Atorvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AA07	Rosuvastatina	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AB02	Bezafibrato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AB04	Gemfibrozil	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AB05	Fenofibrato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AX06	Icosapent etile	os	RR	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	Trattamento di pazienti di eta' diciotto-ottanta anni con malattia cardiovascolare accertata e BMI ≥ 27 kg/m ² , in trattamento con statina ad alta potenza alla massima dose tollerata + ezetimibe, che abbiano raggiunto i livelli target di colesterolo LDL (<70 mg/dL), e presentino ipertrigliceridemia residua (TG ≥ 200 mg/dL) non spiegabile da altre cause e confermata in almeno 3 determinazioni nonostante buona aderenza dietetica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina Generale	
C10AX06	Omega 3 trigliceridi inclusi altri esteri ed acidi	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AX09	Ezetimibe	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 66/2015			13
C10AX12	Lomitapide	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Endocrinologia - Medicina Generale 	
C10AX13	Evolocumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Nota prot 427568 del 29.12.2020 DCA 134/2021 DCA 70/2022 DCA 107/2022 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Ipercolesterolemia e dislipidemia mista Indicato nei pazienti adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o da dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: <ul style="list-style-type: none"> - in associazione ad una statina o ad una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti che non raggiungono livelli di LDL-C target con la dose massima tollerata di una statina, oppure - in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso di statine è controindicato. Ipercolesterolemia familiare omozigote Indicato in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti negli adulti e negli adolescenti di almeno 12 anni di età con ipercolesterolemia familiare omozigote. Malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata Indicato negli adulti con malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata (infarto del miocardio, ictus o arteriopatia periferica) per ridurre il rischio cardiovascolare riducendo i livelli di C-LDL, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio: <ul style="list-style-type: none"> - in associazione alla dose massima tollerata di statina con o senza altre terapie ipolipemizzanti oppure, - in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso di statine è controindicato. 	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia - Diabetologia - Nefrologia - Geriatria - Nefrologia - Geriatria 	
C10AX14	Alirocumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	Nota prot 427568 del 29.12.2020 DCA 134/2021 DCA 70/2022 DCA 107/2022 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Ipercolesterolemia primaria e dislipidemia mista Praluent è indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote o non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: <ul style="list-style-type: none"> - in associazione ad una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per il colesterolo LDL (C-LDL) con la dose massima tollerata di statine, oppure - in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata. Malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata Praluent è indicato negli adulti con malattia cardiovascolare aterosclerotica accertata per ridurre il rischio cardiovascolare riducendo i livelli di C-LDL, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio: <ul style="list-style-type: none"> - in associazione alla dose massima tollerata di statina con o senza altre terapie ipolipemizzanti oppure, - in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali l'uso delle statine è controindicato. 	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia - Diabetologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
C10AX15	Acido bempedoico	os	RR	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 106/2023 DCA 56/2025	Indicato negli adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: <ul style="list-style-type: none"> in associazione a una statina o con una statina in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti nei pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi di LDL-C con la dose massima tollerata di una statina oppure in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o nei quali ne è controindicato l'uso. 	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Geriatria - Medicina interna, - Neurologia - Endocrinologia - Diabetologia Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC	
C10AX16	Inclisiran	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Indicato in adulti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: in associazione a una statina o una statina con altre terapie ipolipemizzanti in pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi per l'LDL-C con la dose massima tollerata di una statina, oppure: in monoterapia o in associazione ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti intolleranti alle statine o per i quali una statina è controindicata	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia - Nefrologia - Geriatria Cardiologia - Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo (ASP CS)	
C10AX18	Volanesorsen	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Indicato come coadiuvante della dieta in pazienti adulti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare (FCS) confermata geneticamente e ad alto rischio di pancreatite, in cui la risposta alla dieta e alla terapia di riduzione dei trigliceridi è stata inadeguata	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
C10AB05	Atorvastatina/Ezetimibe	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 70/2022	<u>Classe A:</u> In aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in pazienti adulti per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, incluso l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista), già adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi		13
C10AB06	Rosuvastatina/Ezetimibe	os	RR	A	Scheda Regionale DCA Nota 13	DCA 70/2022	<u>Classe A:</u> In aggiunta alla dieta come terapia sostitutiva in pazienti adulti per il trattamento dell'ipercolesterolemia primaria, incluso l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipidemia combinata (mista), già adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati insieme con lo stesso dosaggio dell'associazione a dose fissa, ma come medicinali diversi		13
C10BA10	Acido bempedoico/ezetimibe	os	RR	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 106/2023 DCA 56/2025	Indicato negli adulti affetti da ipercolesterolemia primaria (familiare eterozigote e non familiare) o dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta: <ul style="list-style-type: none"> in combinazione con una statina nei pazienti non in grado di raggiungere gli obiettivi di colesterolo-lipoproteina a bassa densità (low density lipoprotein-cholesterol,LDL-C) con la dose massima tollerata di una statina oltre a ezetimibe; in monoterapia in pazienti intolleranti alle statine o nei quali ne è controindicato l'uso, e che non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di LDL-C solo con ezetimibe; nei pazienti già in trattamento con l'associazione di acido bempedoico ed ezetimibe sotto forma di compresse distinte con o senza statina 	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Geriatria - Medicina interna - Neurologia - Endocrinologia - Diabetologia	
D	DERMATOLOGICI								

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D03BA	Enzimi proteolitici	loc	OSP	H		DCA 88/2017	Rimozione dell'escara in ustioni profonde a spessore parziale o completo	Centro Grandi Ustionati	
D03AX13	Estratto di corteccia di betulla	loc	RRL	H		DCA 111/2024	Trattamento di lesioni a spessore parziale associate a epidermolisi bollosa (EB) distrofica e giunzionale nei pazienti di età pari o superiore a sei mesi	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
D06BB10	Imiquimod 5%	loc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Ginecologia - Oncologia - Dermatologia	
D06BB10	Imiquimod 3,75%	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	DCA 164/2018	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95
D06BX03	Tirbanibulina	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	DCA 191/2022	Trattamento cutaneo della cheratosi attinica, non ipercheratosica, non ipertrofica (Olsen di grado 1) del viso o del cuoio capelluto, negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95
D07AB19	Desametasone	loc	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AC01	Betametasone Valerato	loc	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AC06	Diflucortolone Valerato	loc	RR	C/A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D07AC14	Metilprednisolone Aceponato	loc	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AD01	Clobetasolo Propionato	loc	RR	A		DCA 164/2018	Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D07AD02	Alcinonide	loc	RR	A		DCA 164/2018	Pazienti affetti da patologie cutanee gravi e croniche (ad es. psoriasi, dermatite atopica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	88
D11AH01	Tacrolimus	loc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
D11AH08	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, negli adulti eleggibili per la terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
D11AH05	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni eleggibili per la terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Pediatria	
D11AH08	Abrocitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 106/2023	Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
D11AH09	Ruxolitinib	loc	RNRL	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 225/2024	Indicato per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento facciale e BSA affetta da vitiligine compresa tra 0,5% e 10% negli adulti e negli adolescenti a partire dai dodici anni di età	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
D11AH10	Lebrikizumab	sc	RRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 56/2025	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e con un peso corporeo minimo di 40 kg, eleggibili per la terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Pediatria	
D11AH06	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 95/2021 DCA 70/2022 DCA 107/2022	Indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni come trattamento aggiuntivo di mantenimento per l'asma grave con infiammazione di tipo 2, caratterizzata da un aumento degli eosinofili ematici e/o del FeNO, non adeguatamente controllati con ICS (corticosteroidi per via inalatoria) a dosaggio alto e un altro prodotto medicinale per il trattamento di mantenimento	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria	
D11AH07	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 95/2021 DCA 70/2022 DCA 107/2022	Indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) grave per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non fornisce un controllo adeguato della malattia	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Allergologia - Immunologia - ORL	
D11AH07	Dupilumab	sc	RNRL/RRL	H/A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Dermatite atopica bambini di età compresa tra 6 e 11 anni eleggibili per la terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia - Pediatria	
D11AH07	Tralokinumab	sc	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 315/2024	Indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adolescenti (12- 17 anni) che sono candidati alla terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
D11AH07	Tralokinumab	sc	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 147/2022	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in adulti che sono candidati alla terapia sistemica	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
D11AX18	Diclofenac in ialuronato	loc	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	DCA 164/2018	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto Per localizzazioni al tronco e/o al cuoio capelluto	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95
D11AX19	Alitretionina	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Eczema cronico severo	Hub e Spoke: - Dermatologia	
G	SISTEMA GENITO-URINARIO ED ORMONI SESSUALI								

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G02AD06	Misoprostolo	vag/os	OSP	C		DCA 70/2022	Indicato per l'induzione del travaglio	Hub, Spoke: - Ostetricia - Ginecologia	
G02CB03	Cabergolina	os	RNR	A		DCA 164/2018		Ambulatori specialistici territoriali: - Geriatria - Neurologia - Neuropsichiatria - Psichiatria	
G03BA03	Testosterone (enantato/undecanoato)	os,im,loc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	ipogonadismi maschili primitivi e secondari caratterizzati da ridotte concentrazioni di testosterone totale (< 12 nmol/L o 350 ng/dL) in presenza di sintomi tipici (riduzione del desiderio e potenza sessuale, osteoporosi, riduzione forza muscolare, obesità viscerale, alterazioni del tono dell'umore)	<u>Testosterone os e im</u> Hub e Spoke: - Endocrinologia - Pediatria - Medicina generale - Urologia - Andrologia - Fisiopatologia della riproduzione (A.O. Cosenza)	36

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03BA03	Testosterone (enantato/undecanoato)	os,im,loc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		<u>Testosterone lbc</u> - Endocrinologia - Urologia - Andrologia	
G03B01	Mesterolone	os	RNRL	C		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Urologia	
G03GA02	Menotropina	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	MEROPUR Iperstimolazione ovarica controllata per l'induzione dello sviluppo follicolare multiplo durante tecniche di riproduzione assistita (ART) [ad esempio: fecondazione in vitro/trasferimento embrionale (FIVET), trasferimento di gameti all'interno delle tube (GIFT) e iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI)] MERIOFERT Induzione dell'ovulazione: per l'induzione dell'ovulazione in donne con amenorrea o con anovulazione che non hanno risposto al trattamento con clomifene citrato.	Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - <u>U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione</u> - AO CS - <u>C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione</u> - Castrovillari (CS) - ASP CS - <u>Centro di procreazione medicalmente assistita</u> - Tiriolo (CZ) - ASP CZ - <u>Urogyn Biotec Srl</u> - Catanzaro - <u>Genesis</u> - Cosenza - <u>Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)</u> - Cds Scilla (RC) - ASP RC CENTRI II LIVELLO: - <u>LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia</u> - Rende (CS) - <u>STP C.I.S. S.r.l.</u> - Lamezia Terme (CZ) - <u>Gatic S&S</u> - Gioia Tauro (RC) - <u>Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa S.r.l."</u> - Montauro (CZ) CENTRI III LIVELLO: - <u>Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio</u> - AOU Catanzaro Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA04	Urofollitropina	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	<p>Sterilità femminile: Induzione dell'ovulazione, in associazione con gonadotropina corionica, in pazienti affette da sindrome dell'ovulo policistico; amenorrea o stati anovulatori da insufficienza della fase follicolare; altri stati di infertilità associata ad un aumentato rapporto LH/FSH.</p> <p>Indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte ad induzione dell'ovulazione nei programmi di fecondazione in vitro (IVF) ed altre tecniche di riproduzione assistita (FIVET-GIFT-ZIFT)</p> <p>Sterilità maschile: Induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo, in associazione alla gonadotropina corionica umana (hCG)</p>	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriole (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	<p>Nella donna adulta: - Anovulazione (inclusa la sindrome dell'ovulo policistico) in donne che non rispondono al trattamento con clomifene citrato. - Stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte a tecniche di riproduzione assistita (Assisted Reproductive Technology, ART), come la fecondazione in vitro (In Vitro Fertilisation, IVF), trasferimento di gameti all'interno delle tube o trasferimento di zigoti all'interno delle tube. - In associazione ad una preparazione a base di ormone luteinizzante (Luteinising Hormone, LH), è raccomandato per la stimolazione dello sviluppo follicolare e dell'ovulazione in donne con grave insufficienza di LH ed FSH. Negli studi clinici tali pazienti venivano identificate in base a livelli sierici di LH endogeno <1,2 UI/L.</p> <p>Nell'uomo adulto: La follitropina alfa è indicata nella induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo congenito o acquisito, in associazione alla gonadotropina corionica umana (human Chorionic Gonadotropin, hCG)</p>	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriole (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA06	Follitropina beta	im	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	<p>Nelle donne adulte: Indicato nel trattamento dell'infertilità femminile nelle seguenti condizioni cliniche: • Anovulazione (inclusa la sindrome policistica dell'ovulo, PCOS) in donne che non hanno risposto al trattamento con clomifene citrato. • Iperstimolazione controllata delle ovaie, per indurre lo sviluppo di follicoli multipli, nei protocolli di riproduzione assistita [per es. fecondazione in vitro/trasferimento dell'embrione (IVF/ET), trasferimento intratubarico del gamete (GIFT) e iniezione intracitoplasmatica di sperma (ICSI)].</p> <p>Negli uomini adulti: insufficiente spermatogenesi da ipogonadismo ipogonadotropo</p>	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriole (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA07	Lutropina alfa	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	In associazione con una preparazione a base di ormone follicolo stimolante (Follicle Stimulating Hormone, FSH), è raccomandato per la stimolazione dello sviluppo follicolare in donne adulte con grave insufficienza di ormone luteinizante (Luteinising Hormone, LH) ed FSH.	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA08	Coriogonadotropina alfa	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	Indicato nel trattamento di: - Donne adulte sottoposte a superovulazione in preparazione a tecniche di riproduzione assistita come la fecondazione in vitro (IVF): viene somministrato per indurre la maturazione finale del follicolo e la luteinizzazione dopo la stimolazione della crescita follicolare. - Donne adulte anovulatorie o oligo-ovulatorie: ovitrelle viene somministrato per indurre l'ovulazione e la luteinizzazione in donne anovulatorie o oligo-ovulatorie dopo la stimolazione della crescita follicolare.	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA08	Corifollitropina alfa	sc	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	Indicato per la stimolazione ovarica controllata (Controlled Ovarian Stimulation - COS) in associazione ad un antagonista dell'ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH) per lo sviluppo follicolare multiplo nelle donne che partecipano ad un programma di Tecniche di Riproduzione Assistita (Assisted Reproductive Technology - ART). LONG ACTING	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriolo (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03GA10	Follitropina delta	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	Stimolazione ovarica controllata per lo sviluppo di follicoli multipli nelle donne sottoposte a tecniche di riproduzione assistita (assisted reproductive technologies,ART), come la fecondazione in vitro (in vitro fertilisation, IVF) o un ciclo di iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (intracytoplasmic sperm injection, ICSI).	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CZ - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriole (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03GA30	Follitropina alfa/Lutropina alfa	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA Nota 74	DCA 164/2018	Indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare in donne adulte con grave insufficienza di LH ed FSH	<p>Centri Procreazione Medicalmente Assistita CENTRI I LIVELLO: - U.O.S. di Andrologia e Fisiopatologia della Riproduzione - AO CS - C.B.R. Centro di Biologia della Riproduzione - Castrovillari (CS) - ASP CS - Centro di procreazione medicalmente assistita - Tiriole (CZ) - ASP CZ - Urogyn Biotec Srl - Catanzaro - Genesis - Cosenza - Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) - Cds Scilla (RC) - ASP RC</p> <p>CENTRI II LIVELLO: - LIFELAB Studio Medico Polispecialistico di Riproduzione Medicalmente Assistita e Andrologia - Rende (CS) - STP C.I.S. S.r.l. - Lamezia Terme (CZ) - Gatic Sas - Gioia Tauro (RC) - Centro di Medicina della Riproduzione "Diagnostica Nausicaa s.r.l." Montaurò (CZ)</p> <p>CENTRI III LIVELLO: - Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita del PO Pugliese-Ciaccio - AOU Catanzaro</p> <p>Hub e Spoke: - Ginecologia - Andrologia - Urologia - Ambulatorio di Andrologia dell'UO di Endocrinologia di AOU CZ</p>	74
G03XB02	Ulipristal	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento intermittente (fino a un max di 4 cicli) dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva. Durata di 1 mese: per gli interventi di ablazione endometriale e resezione di setti endouterini per via isteroscopica	<p>Hub, Spoke e Ospedali generali: - Ginecologia - Oncologia</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Ginecologo</p>	51

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G03XB02	Ulipristal	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 88/2017	Trattamento pre-operatorio di sintomi, da moderati a gravi, di fibromi uterini		
G03XC01	Raloxifene	os	RR	A		DCA 164/2018	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
G03XC02	Bazedoxifene	os	RR	A		DCA 164/2018	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BD04	Oxibutinina Cloridrato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Incontinenza urinaria da urgenza	Hub, Spoke: - Urologia - Pediatria - Neurologia - Oncologia	87
G04BE01	Alprostadil	intracaver	RNR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	La prescrizione di alprostadil per iniezione intracavernosa a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile da lesioni complete del midollo spinale, e ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico qualora vi sia mancata risposta, intolleranza o contro-indicazione agli inibitori della PDE5, secondo un piano terapeutico redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia Hub: - Cardiologia - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari)	75
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	La prescrizione di inibitori della PDE5 a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia Hub: - Cardiologia - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) Spoke: - Cardiologia (PO Castrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Castrovillari) Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	75

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC) - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Caastrovillari) 	
G04BE03	Sildenafil citrato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC) - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Caastrovillari) 	
G04BE08	Tadalafil	os	RRL/RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	La prescrizione di inibitori della PDE5 a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia <p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Caastrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Caastrovillari) 	75

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE08	Tadalafil	os	RRL/RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (AO CS, AO CZ, AO RC) - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Caastrovillari) 	
G04BE08	Tadalafil	os	RRL/RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti pediatrici di età compresa tra 1 e 17 anni con ipertensione arteriosa polmonare	<p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Pneumologia (AO RC) - Reumatologia (AO RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Caastrovillari, PO KR) - Pneumologia (PO Caastrovillari) 	
G04BE09	Vardenafil cloridrato triidrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 Nota Regionale Prot. 33487 del 31.01.2018	La prescrizione di inibitori della PDE5 a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica, secondo un piano terapeutico, redatto da specialisti (andrologo, endocrinologo, neurologo, urologo) afferenti al SSN.	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia <p>Hub:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia - Pneumologia (GOM RC) - Reumatologia (GOM RC) <p>Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologia (PO Caastrovillari e PO KR) - Pneumologia (PO Caastrovillari) 	75

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
G04BE10	Avanafil	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	La prescrizione di inibitori della PDE5 a carico del SSN è limitata ai pazienti con disfunzione erettile neurogena da lesione incompleta del midollo spinale o del plesso pelvico, di origine traumatica, infiammatorio/degenerativa o iatrogena (in seguito a chirurgia o radioterapia della regione pelvica)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Urologia - Andrologia - Endocrinologia - Neurologia	75
H	PREPARATI ORMONALI SISTEMICI, ESCLUSI GLI ORMONI SESSUALI								
H01AC01	Somatropina	im,sc	RRL	A-PHT	PT online webcare	DCA 164/2018	https://www.aifa.gov.it/nota-39	Hub e Spoke: - Endocrinologia - Diabetologia - Pediatria	39
H01AC08	Somatrogon	sc	RRL	A-PHT	PT online webcare	DCA 133/2023	Trattamento di bambini e adolescenti a partire dai tre anni di età con disturbi della crescita dovuti a una secrezione insufficiente dell'ormone somatotropo	Hub e Spoke: - Endocrinologia - Diabetologia - Pediatria	39
H01AX01	Pegvisomant	sc	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Endocrinologia	
H01BA01	Argipressina	ev	OSP	C		DCA 70/2022	Indicato per il trattamento dell'ipertensione refrattaria alle catecolamine conseguente a shock settico in pazienti di età superiore ai 18 anni. È presente un'ipertensione refrattaria alle catecolamine se la pressione arteriosa media non può essere stabilizzata ai valori ottimali nonostante un adeguato reintegro del volume e la somministrazione di catecolamine	Hub e Spoke: - Cardiologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H01BA02	Desmopressina Acetato	os,ev,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke: - Emodialisi - Ematologia - Servizi Trasfusionali	
H01CA01	Gonadorelina	ev,sc	RR	C		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Pediatria - Urologia - Andrologia	
H01CA01	Gonadorelina	nas	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Pediatria - Urologia - Andrologia	
H01CB02	Octreotide Acetato	sc,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Oncologia - Ematologia - Pediatria	
H01CB03	Lanreotide Acetato	im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Gastroenterologia - Medicina Generale - Oncologia - Ematologia - Pediatria	
H01CB05	Pasireotide	sc	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Malattia di Cushing	Hub: - Endocrinologia - Neurologia - Medicina Interna	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H01CC54	relugolix, estradiolo e noretisterone acetato	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 238/2023	Trattamento dei sintomi da moderati a severi dei fibromi uterini in donne adulte in età fertile	<p>Hub e Spoke: - Ginecologia</p> <p>Ambulatori specialistici territoriali: - Ginecologo</p>	51
H02AB09	Idrocortisone Emisuccinato Sodico	os,im,ev	RRL/RR	A-PHT/C		DCA 147/2020	Indicato per l'insufficienza surrenalica nei bambini da 0 a 18 anni	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologia - Pediatria</p>	
H02AB09	Idrocortisone Emisuccinato Sodico	os	RRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 133/2023	Trattamento dell'iperplasia surrenalica congenita (CAH, congenital adrenal hyperplasia) negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni e negli adulti.	<p>Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
H02CA02	Osilodrostat	os	RNRL	A-PHT		DCA 106/2023	Trattamento della Sindrome di Cushing endogena negli adulti	<p>Hub: - Endocrinologia - Medicina interna</p>	
H04AA01	Glucagone	inal	RR	A-PHT		DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	<p>Trattamento dell'ipoglicemia severa nei pazienti pediatrici e adolescenti con diabete di tipo I in età scolare (4-19 anni)</p> <p>Trattamento dell'ipoglicemia severa negli adulti con terapia insulinica che assumono almeno quattro somministrazioni giornaliere, ovvero che siano in trattamento con il microinfusore</p>	<p>Rete Assistenziale Diabetologica Calabrese (DCA n. 11/2018) – MMG e PLS</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
H05AA02	Teriparatide	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia 	79
H05AA04	Abaloparatide	sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento di prima scelta nella prevenzione secondaria in donne con pregresse fratture vertebrali o di femore e T-score colonna o femore <-2,5 e > -5.0 (T-score <-2,0 e > -5.0 se di età superiore a 65 anni) + ≥ 2 fratture vertebrali lievi o almeno 1 moderata o storia di frattura ad avambraccio, omero, sacro, pelvi, anca, femore, o tibia negli ultimi cinque anni	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia 	79
H05BX01	Cinacalcet	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Endocrinologia - Nefrologia - Emodialisi 	
H05BX02	Paracalcitolo	ev,os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 109/2020	Prevenzione e trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti e pediatrici di età compresa tra i dieci e i sedici anni associato a malattia renale cronica negli stadi 3 e 4 e per la prevenzione ed il trattamento dell'iperparatiroidismo secondario in pazienti adulti associato a malattia renale cronica di stadio 5 in pazienti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Endocrinologia - Nefrologia - Emodialisi 	
H05BX04	Etelcalcetide	ev	RRL	A-PHT		DCA 146/2017 DCA 164/2018	Trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (SHPT) in pazienti adulti con malattia renale cronica (CKD) in emodialisi.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Nefrologia - Dialisi 	
J	ANTIMICROBICI GENERALI PER USO SISTEMICO								

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01AA13	Eravaciclina	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 56/2025	Trattamento di infezioni intra-addominali complicate (cIAI) negli adulti da germi multiresistenti ai trattamenti di prima linea	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J01CA10	Mezlocillina Sodica Monoidrata	im	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01CA12	Piperacillina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01CA12	Piperacillina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01CE08	Benzilpenicillina Benzatinica	im	RR	A-PHT		DCA 164/2018	<p>Profilassi della malattia reumatica in soggetti con infezioni delle prime vie respiratorie sostenute da streptococchi del gruppo A. Profilassi delle recidive della malattia reumatica</p> <p>Sifilide</p>	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Malattie infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia - Dermatologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatra - Urologia 	92
J01CE08	Benzilpenicillina Benzatinica	im	RR	A-PHT		DCA 164/2018	<p>Profilassi delle recidive delle malattie reumatiche</p>	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Malattie infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatra - Urologia 	92
J01CE09	Benzilpenicillina Benzatinica	im	RR	A-PHT		DCA 164/2019	<p>Sifilide</p>	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Malattie infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia - Dermatologia - Ginecologia - Otorinolaringoiatra - Urologia 	92
J01CR01	Ampicillina/Sulbactam	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	<p>trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari</p> <p>trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi</p>		55

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01CR05	Piperacillina Sodica/Tazobactam Sodico	ev,im	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DD02	Ceftazidima	im,ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H		DCA 164/2018	In adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 3 mesi per il trattamento delle seguenti infezioni: • infezione intra-addominale complicata (cIA) • infezione complicata del tratto urinario (cUTI), inclusa pielonefrite polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)	Hub e Spoke: - Malattie infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti con batteriemia che si verifica in associazione, o si sospetta sia associata, a una delle infezioni sopra elencate	Hub e Spoke: - Malattie infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti con batteriemia che si verifica in associazione, o si sospetta sia associata, a una delle infezioni sopra elencate	<p>Hub e Spoke: - Malattie infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p>	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di infezioni intraddominale complicata	<p>Hub e Spoke: - Malattie infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p>	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Polmonite acquisita in ospedale	<p>Hub e Spoke: - Malattie infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p>	
J01DD52	Ceftazidima/avibactam	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di infezioni causate da microrganismi Gram-negativi aerobi negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 3 mesi nei quali vi siano opzioni terapeutiche limitate	<p>Hub e Spoke: - Malattie infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DE01	Cefepime Dicloridrato Monoidrato	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01DF01	Aztreonam	inal	RNRL	C		DCA 164/2018	La prescrizione a carico del SSN è limitata: al trattamento iniziato in ambito ospedaliero La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche		56
J01DH51	Imipenem + Cilastatina	ev,im	OSP	C/H		DCA 164/2018	La prescrizione a carico del SSN è limitata: al trattamento iniziato in ambito ospedaliero La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche al trattamento iniziato in ambito ospedaliero		56
J01DH52	Meropenem/vaborbactam	ev	OSP	H		DCA 95/2021	Trattamento di pazienti adulti con accertate o sospette gravi infezioni sostenute da Enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi (CRE): infezione accertata del tratto urinario complicata (cUTI), compresa pielonefrite; infezione accertata o sospetta intra-addominale complicata (cIAI); polmonite nosocomiale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione (VAP) accertata o sospetta; batteriemia che si verifica in associazione o in sospetta associazione con una qualsiasi delle infezioni sopra elencate; trattamento di infezioni accertate dovute a organismi Gram-negativi aerobi in adulti che dispongono di opzioni terapeutiche limitate	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DH56	Imipenem/cilastatina/relebactam	ev	OSP	H		DCA 70/2022	Indicato nel: <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento della polmonite acquisita in ospedale (HAP), compresa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), negli adulti; - Trattamento della batteriemia che si manifesta in associazione o che si sospetta sia associata a HAP o VAP, negli adulti; - Trattamento delle infezioni causate da organismi aerobi Gram-negativi negli adulti con opzioni di trattamento limitate 	Hub e Spoke: <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive 	
J01DH56	Imipenem/cilastatina/relebactam	ev	OSP	H		DCA 70/2022	La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche	Hub e Spoke: <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive 	
J01DI01	Ceftobiprololo	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Polmonite acquisita in ospedale (HAP) esclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica	Hub e Spoke: <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive 	
J01DI01	Ceftobiprololo	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Polmonite acquisita in comunità	Hub e Spoke: <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DI02	Ceftarolina fosamil	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 238/2023	<p>Trattamento delle seguenti infezioni nei neonati, nei lattanti, nei bambini, e negli adolescenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI) • Polmonite acquisita in comunità (CAP) esclusivamente nei casi in cui sia fallito un precedente trattamento antibiotico <p>Si devono tenere in considerazione le indicazioni ufficiali sull'impiego appropriato degli agenti antibatterici</p>	<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p>	
J01DI04	Cefiderocol	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	<p>DCA 134/2021 DCA 56/2025 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025</p>	<p>Indicato per il trattamento delle infezioni dovute a organismi aerobi gram-negativi negli adulti con opzioni terapeutiche limitate</p>	<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p> <p>ASP CZ: -Dott. Benedetto Caroleo</p>	
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		<p>DCA 164/2018 DCA 88/2017 DCA 95/2021</p>	<p>Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)</p>	<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p>	
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		DCA 88/2017	<p>Trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:1- Infezioni intra-addominali complicate con eziologia documentata/sospetta da batteri Gram- negativi, resistenti ai trattamenti di prima linea</p>	<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		DCA 88/2017	Pielonefrite acuta eziologia documentata/sospetta batteri Gram-negativi, resistenti trattamenti di prima linea.	Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01DI54	Ceftolozano/tazobactam	ev	OSP	H		DCA 88/2017	Infezioni complicate del tratto urinario con eziologia documentata/sospetta da batteri gram-negativi, resistenti ai trattamenti di prima linea.	Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO	
J01GB01	Tobramicina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB01	Tobramicina	im,ev	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive - Medicina generale - Pediatria - Pneumologia - Centri Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01GB03	Gentamicina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB06	Amikacina Solfato	im,ev	RR/OSP	A/H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01GB07	Netilmicina	im,ev	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	trattamento iniettivo di infezioni gravi delle vie respiratorie, delle vie urinarie, dei tessuti molli, intra-addominali, ostetrico-ginecologiche, ossee e articolari trattamento iniettivo delle infezioni causate da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti immunocompromessi		55
J01MA23	Delafloxacin	os	RNRL	A-PHT	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 332/2023	Indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI) quando si considera inappropriato l'uso di altri agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di tali infezioni	<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive *specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p> <p>Nota Regionale Prot. n. 128767 del 20.02.2024 Centri Prescrittori QUOFENIX Integrazione</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01MA23	Delafloxacina	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 332/2023	Indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e dei tessuti molli (ABSSSI) quando si considera inappropriato l'uso di altri agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di tali infezioni	<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive</p> <p>*specialista con competenza infettivologica identificata dal CIO</p> <p>Nota Regionale Prot. n. 128767 del 20.02.2024 Centri Prescrittori QUOFENIX Integrazione</p>	
J01XA02	Teicoplanina	im,ev	RR	A		DCA 164/2018	<p>La prescrizione a carico del SSN è limitata:</p> <p>al trattamento iniziato in ambito ospedaliero</p> <p>La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio</p> <p>al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica</p> <p>Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche</p>		56
J01XA04	Dalbavancina	ev	OSP	H		DCA 164/2018 DCA 88/2017	Negli adulti per il trattamento delle infezioni batteriche acute della cute e della struttura cutanea (ABSSSI)	<p>Hub e Spoke: - Malattie Infettive</p>	
J01XA05	Oritavancina	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 70/2022	Indicato per il trattamento delle infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti	<p>Hub e Spoke: - Malattie infettive</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01XB01	Colistimetato Sodico	im,ev,inal	RNR	C		DCA 164/2018		Centro Regionale Fibrosi Cistica	
J01XX01	Fosfomicina Sale Di Trometamolo	os	RR	A/C		DCA 164/2018 DCA 126/2018	<p>Trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini, neonati inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osteomielite • infezioni complicate delle vie urinarie • infezioni nosocomiali delle vie respiratorie inferiori • meningite batterica <p>• batteriemia che si manifesta in associazione o che si ritiene eventualmente associata a una qualsiasi delle infezioni sopracitate</p>	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J01XX01	Fosfomicina sodica	ev	OSP	H		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J01XX08	Linezolid	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J01XX11	Tedizolid fosfato	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 146/2017	Trattamento di infezioni batteriche acute della pelle e della struttura cutanea (ABSSSI) negli adulti. La rimborsabilità è limitata alle sole infezioni complicate della cute e dei tessuti molli quando si sospetta o si ha la certezza che l'infezione sia causata da batteri Gram positivi sensibili.	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J02AC03	Voriconazolo	os,ev	RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia	
J02AC04	Posaconazolo	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Medicina Generale - Malattie Infettive - Ematologia	
J02AC05	Isavuconazolo	os,ev	RNRL/OSP	A-PHT/H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J04AB04	Rifabutina	os	RR	A		DCA 164/2018	<p>La prescrizione a carico del SSN è limitata:</p> <p>al trattamento iniziato in ambito ospedaliero</p> <p>La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio</p> <p>al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica</p> <p>Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche</p>	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive - Pneumologia 	56
J04AK05	Bedaquilina	os	RNRL	H		DCA 164/2018	<p>Tubercolosi polmonare multiresistente quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità</p>	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive - Pneumologia 	
J04AK06	Delamanid	os	RNRL	H		DCA 164/2018	<p>Opportuna terapia di associazione per la tubercolosi polmonare multiresistenti ai farmaci nei pazienti adulti quando non può essere utilizzato altro efficace regime terapeutico per motivi di resistenza o tollerabilità</p>	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive - Pneumologia 	
J04AK08	Pretomanid	os	RNRL	H		DCA 70/2022	<p>Indicato in combinazione con bedaquilina e linezolid, negli adulti, per il trattamento della tubercolosi (TB) polmonare a estesa farmacoresistenza (extensively drug resistant, XDR) o intollerante al trattamento o multifarmacoresistente (multidrug-resistant, MDR) non responsiva.</p>	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive - Pneumologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AB01	Aciclovir	os,ev	RR/OSP	A/H		DCA 164/2018	<p>Virus Herpes simplex</p> <p>Virus varicella-zoster (VZV)</p> <p>La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.</p>		84
J05AB09	Famciclovir	os	RR	A		DCA 164/2018	<p>Virus Herpes simplex</p> <p>Virus varicella-zoster (VZV)</p> <p>La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.</p>		84
J05AB11	Valaciclovir (cloridrato)	os	RR	C/A-PHT		DCA 164/2018	<p>Virus Herpes simplex</p> <p>Virus varicella-zoster (VZV)</p> <p>La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.</p>		84
J05AB14	Valganciclovir (cloridrato)	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	<p>Trattamento di induzione e mantenimento della retinite da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti con sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS)</p>	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AB14	Valganciclovir (cloridrato)	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Prevenzione della malattia da CMV in adulti e bambini (dalla nascita ai 18 anni di età) negativi al CMV, sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo.	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia	
J05AB14	Valganciclovir (cloridrato)	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Estensioni Legge 648/96: trattamento "pre-emptivo" dell'infezione da CMV in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie infettive - Pediatria - Centro Trapianti - Epatologia	
J05AB15	Brivudina	os	RR	A		DCA 164/2018	Virus Herpes simplex Virus varicella-zoster (VZV) La prescrizione dei farmaci attivi sui virus erpetici è rimborsata dal SSN anche per le altre indicazioni autorizzate nei pazienti immunocompromessi.		84
J05AB16	Remdesivir	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	Trattamento della malattia da coronavirus 2019 Trattamento precoce della malattia da coronavirus 2019	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AE01	Saquinavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AE03	Ritonavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV	
J05AE07	Fosamprenavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AE08	Atazanavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AE09	Tipranavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AE10	Darunavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AE30	Nirmatrelvir/ritonavir	os	RNR	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	Trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono ad elevato rischio di progressione a COVID-19 severa	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AF01	Zidovudina	os, ev	RNRL	A/H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AF05	Lamivudina	os	RR/RNRL	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	HBV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>PO Materdomini AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia <p>- Malattie Cardiovascolari Geriatriche</p> <p>- Ambulatorio di Medicina Generale</p> <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AF06	Abacavir Solfato	os	RNRL	H		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AF07	Tenofovir Disoproxil	os	RNRL	H		DCA 164/2018		<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia <p>DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AF08	Adefovir Dipivoxil	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>DPGR 198/2012 PDTA AIDS/HIV</p>	
J05AF09	Emtricitabina	os	RNRL	H		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AF10	Entecavir	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia 	
J05AF11	Telbivudina	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive - Medicina Generale - Gastroenterologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AF13	Tenofovir alafenamide fumarato	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 164/2018	HBV in adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg).	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AJ01	Raltegravir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AJ03	Dolutegravir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AJ04	Cabotegravir	os, ev	RNRL	H		DCA 147/2022	HIV	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AG01	Nevirapina	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AG03	Efavirenz	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AG04	Etravirina	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AG05	Rilpivirina	os/*ev	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AG05	Ripivirina	os/*ev	RNRL	H		DCA 147/2022	HIV	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AG06	Doravirina	os	RNRL	H		DCA 02/2020 DCA 133/2023	Indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AP01	Ribavirina	os,inal	RNRL	A		DCA 164/2018	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>PO Materdomini AOU CZ - Malattie infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale</p> <p>AO CS - Gastroenterologia - Malattie infettive</p> <p>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie infettive</p> <p>GOM RC - Malattie infettive</p> <p>ASP KR - Medicina Generale - Malattie infettive</p> <p>ASP CZ - Unità semplice di Malattie infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato</p> <p>ASP VV - Malattie infettive</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP09	Sofosbuvir	os	RNRL	C	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>PO Materdomini AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AP09	Dasabuvir	os	RNRL	A		DCA 164/2018	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AP54	Elbasvir/Grazoprevir	os	RNRL	A	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017 DCA 70/2022 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>PO Materdomini AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dott. Luciani 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP55	Sofosbuvir/Velpatasvir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>PO Materdomini AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dott. Luciani 	
J05AP55	Sofosbuvir/Velpatasvir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	Trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C cronica (hepatitis C virus, HCV) in pazienti di età pari o superiore a tre anni	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>PO Materdomini AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	
J05AP56	Sofosbuvir/Velpatasvir/Voxilaprevir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	HCV	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <p>AOU CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale <p>AO CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Malattie Infettive <p>AO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive <p>GOM RC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive <p>ASP KR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Malattie Infettive <p>ASP CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato <p>ASP VV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malattie Infettive 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AP57	Glecaprevir/Pibrentasvir	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 146/2017 DCA 70/2022 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	HCV	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: AOU CZ - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale AO CS - Gastroenterologia - Malattie Infettive AO CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive GOM RC - Malattie Infettive ASP KR - Medicina Generale - Malattie Infettive ASP CZ - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di Infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato ASP VV - Malattie Infettive ASP CS - Dott. Luciani	
J05AR01	Lamivudina/Zidovudina	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AR02	Abacavir/Lamivudina	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR04	Abacavir/Lamivudina/Zidovudina	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR06	Emtricitabina/Efavirenz/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR08	Emtricitabina/Rilpivirina/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR09	Cobicistat/Elvitegravir/Emtricitabina/tenofovir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR10	Lopinavir/Ritonavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018	HIV	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR13	Abacavir/Daltegravir/Lamivudina	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR14	Cobicistat/Darunavir	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR15	Atazanavir/Cobicistat	os	RNRL	H		DCA 164/2018 DCA 88/2017	In associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di soggetti adulti infetti da HIV-1 senza mutazioni note associate a resistenza ad atazanavir.	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR17	Emtricitabina/tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		DCA 164/2018 DCA 88/2017	In associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1).	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR18	Cobicista/emtricitabina/Elvitegravir/tenofovir alafenamide	ev	RNRL	H		DCA 164/2018 DCA 88/2017	Trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) infetti da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza alcuna mutazione nota associata a resistenza alla classe degli inibitori dell'integrasi, a emtricitabina o a tenofovir.	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR19	Rilpivirina/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		DCA 164/2018 DCA 146/2017	Trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 35 kg) con infezione da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza alcuna mutazione nota associata a resistenza alla classe degli inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa (NNRTI), a tenofovir o a emtricitabina e con una carica virale \leq 100.000 copie/mL di HIV-1 RNA.	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR20	Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		DCA aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV 1) in pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni e con peso corporeo di almeno 14 kg senza evidenza presente o passata di resistenza virale alla classe degli inibitori dell'integrasi, a emtricitabina o a tenofovir	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR20	Bictegravir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		DCA 02/2020	Trattamento degli adulti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana 1 (HIV-1) senza evidenza presente o passata di resistenza virale alla classe degli inibitori dell'integrasi, a emtricitabina o a tenofovir	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR21	Dolutegravir/Rilpivirina	os	RNRL	H		DCA 02/2020	Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti in soppressione virologica (HIV-1 RNA <50 copie/ml), in un regime antiretrovirale stabile da almeno sei mesi, con nessuna storia di fallimento virologico e con nessuna resistenza nota o sospetta a qualsiasi inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa o inibitore dell'integrasi.	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR22	Cobicistat/Darunavir/Emtricitabina/Tenofovir alafenamide	os	RNRL	H		DCA 259/2018	Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) negli adulti e negli adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg).	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR24	Doravirina/Lamivudina/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H		DCA 02/2020	Trattamento di adulti con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI, lamivudina o tenofovir	Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AR24	Doravirina/Lamivudina/Tenofovir disoproxil	os	RNRL	H		DCA 133/2023	Indicato per il trattamento di adolescenti di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg con infezione da HIV-1 senza evidenza di resistenza, pregressa o attuale, alla classe degli NNRTI, lamivudina o tenofovir e che hanno manifestato tossicità che preclude l'uso di altri regimi che non contengono tenofovir disoproxil	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AR25	Dolutegravir/Lamivudina	os	RNRL	H		DCA 147/2020	Trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 HIV-1, negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni, con peso corporeo di almeno 40 kg, con nessuna resistenza nota o sospetta verso la classe degli inibitori dell'integrasi o verso lamivudina	Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AX07	Enfuvirtide	sc	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	
J05AX09	Maraviroc	os	RNRL	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX10	Maribavir	os	RRL	A-PHT		DCA 238/2023	Trattamento dell'infezione e/o della malattia da citomegalovirus (CMV) refrattaria (con o senza resistenza) a una o più terapie precedenti, tra cui ganciclovir, valganciclovir, cidofovir o foscarnet in pazienti adulti che hanno subito un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) o trapianto di organo solido (SOT)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie infettive - Ematologia	
J05AX14	Daclatasvir	os	RNRL	A		DCA 164/2018	HCV	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: PO Materdomini AOU CZ - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale AO CS - Gastroenterologia - Malattie Infettive PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive GOM RC - Malattie Infettive ASP KR - Medicina Generale - Malattie Infettive ASP CZ - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato ASP VV - Malattie Infettive	
J05AX18	Letermovir	os,ev	RRL/OSP	A-PHT/H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	Profilassi della riattivazione e della malattia da citomegalovirus (CMV) in pazienti adulti sieropositivi per CMV riceventi [R+] trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie infettive - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J05AX28	bulevirtide	ev	RNRL	A-PHT		DCA 133/2023 DCA 111/2024	Trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite delta (HDV) in pazienti adulti positivi a HDV-RNA plasmatico (o sierico) con malattia epatica compensata	Hub e Spoke: -Malattie infettive Hub: - Gastroenterologia	
J05AX29	Fostemsavir	os	RNRL	H		DCA 147/2022	Indicato in associazione con altri antiretrovirali, per il trattamento di adulti con infezione da HIV-1 resistente a molti farmaci, per i quali non è altrimenti possibile stabilire un regime antivirale soppressivo	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AX31	Lenacapavir	os	RNRL	H		DCA 307/2023	in associazione con altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento degli adulti con infezione da HIV-1 multifarmaco-resistente per i quali non è possibile instaurare un regime antivirale soppressivo alternativo, per il carico orale prima della somministrazione dell'iniezione di lenacapavir a rilascio prolungato	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AX31	Lenacapavir	sc	RNRL	H		DCA 307/2023	in associazione con altri antiretrovirali, è indicato per il trattamento degli adulti con infezione da HIV-1 multifarmaco-resistente per i quali non è possibile instaurare un regime antivirale soppressivo alternativo	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
J05AX65	Ledipasvir/Sofosbuvir	os	RNRL	C		DCA 164/2018	HCV	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: PO Materdomini AOU CZ - Malattie Infettive - Epatologia - Fisiopatologia Digestiva - Malattie Cardiovascolari Geriatriche - Ambulatorio di Medicina Generale AO CS - Gastroenterologia - Malattie Infettive PO Pugliese-Ciaccio AOU CZ - Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva - Malattie Infettive GOM RC - Malattie Infettive ASP KR - Medicina Generale - Malattie Infettive ASP CZ - Unità semplice di Malattie Infettive aggregate alla Medicina Generale - Ambulatorio di infettivologia ed Epatologia - Ambulatorio Epatologia UO Medicina Interna PO Soverato ASP VV - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J06BA01	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Extravascolare	sc	RNRL	H		DCA 191/2022	Immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti con infezioni severe o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace e documentato difetto di anticorpi specifici (PSAF, proven specific antibody failure) o livello sierico di IgG < 4 g/l	Hub e Spoke: - Medicina Interna - Malattie infettive - Ematologia	
J06BA01	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Extravascolare	sc	RNRL	H		DCA 56/2025	Terapia immunomodulante negli adulti, nei bambini e negli adolescenti (di età compresa tra 0 e 18 anni) in polineuropatia demielinizante infiammatoria cronica (CIDP, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy) come terapia di mantenimento dopo stabilizzazione con IVIg Codice di esenzione MR = RF0180	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
J06BA02	immunoglobuline umane normali	ev	OSP	H		DCA aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Immunomodulazione negli adulti di età > 18 anni in gravi esacerbazioni acute della miastenia gravis	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
J06BA02	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Intravascolare	ev	OSP	H		DCA 164/2018 DCA 88/2017	Terapia sostitutiva in pazienti adulti, bambini e adolescenti (0-18 anni di età) per il trattamento di: <ul style="list-style-type: none"> Sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della produzione di anticorpi. Ipgammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC), ove gli antibiotici per uso profilattico abbiano fallito o siano controindicati. Ipgammaglobulinemia e infezioni batteriche ricorrenti in pazienti con mieloma multiplo (MM) . Ipgammaglobulinemia in pazienti prima e dopo allotrapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT, hematopoieticstemcelltransplantation). 	Hub e Spoke: - Medicina Interna - Malattie infettive - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J06BA02	Immunoglobulina Umana normale per somministr. Intravascolare	ev	OSP	H		DCA 126/2018	Polineuropatia demielinizante infiammatoria cronica (CIDP)	Hub: - Neurologia	
J06BA02	Immunoglobulina Umana ad alto titolo	ev	OSP	H		DCA 191/2022	Poliradicoloneuropatia demielinizante infiammatoria cronica (CIDP)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
J06BB01	Immunoglobulina Umana Rho	ev,im	OSP/RR	A-PHT/H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Servizi Trasfusionali - Ematologia - Ginecologia	
J06BC03	Palivizumab	im	RRL	A		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie Infettive	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
J06BD01	Bezlotoxumab	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 259/2018	Da solo o in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)	Hub e Spoke: - Malattie Infettive	
L	FARMACI ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI								
L01AA05	Clometina	cut, ev	RRL	H		DCA 107/2022	Trattamento topico del linfoma cutaneo a cellule T tipo micosi fungoide (CTCL tipo-MF) in pazienti adulti	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello Hub: - Dermatologia	
L01AA10	Melfalan flufenamide	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	in associazione con desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno tre linee di terapia precedenti, la cui malattia è refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale antiCD38, e che hanno mostrato progressione della malattia durante o dopo l'ultima terapia. Per i pazienti sottoposti in precedenza a trapianto autologo di cellule staminali, il tempo intercorso fino alla progressione deve essere di almeno tre anni dal trapianto	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01AX03	Temozolomide	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BA04	Pemetrexed	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Mesotelioma pleurico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01BA04	Pemetrexed	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BB05	Fludarabina Fosfato	ev,os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01BB07	Nelarabina	ev	OSP	H		DCA 164/2018	indicata per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a cellule T (T-ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T-LBL) che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con almeno due regimi di chemioterapia.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01BC06	Capecitabina	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BC07	Azacidina	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 212/2023	Terapia di mantenimento in pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) che abbiano conseguito una remissione completa (CR) o una remissione completa con recupero incompleto dell'emocromo (CRI) dopo terapia d'induzione associata o meno a trattamento di consolidamento e che non siano candidabili, o decidano di non sottoporsi, al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01BC07	Azacidina	ev,jm	OSP	H		DCA 126/2018	Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con LMA con blasti midollari > 30% secondo la classificazione dell'OMS	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01BC08	Decitabina	ev	RNRL	H		DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LAM) "de novo" o secondaria in base alla classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01BC52	Fluorouracile/Acido Salicilico	cut	RRL	A	Scheda Regionale DCA Nota 95	DCA 259/2018	Cheratosi attinica limitat ai pazienti adulti immunocompetenti con lesioni multiple in numero >6 Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	95
L01BC53	Tegafur/gimeracil/oteracil	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BC58	Decitabina e Cedazuridina	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (AML, acute myeloid leukaemia) di nuova diagnosi non idonei alla chemioterapia di induzione standard	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01BC59	Trifluridina/tipiracil	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In combinazione con bevacizumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma colorettale metastatico (CRC), che sono stati precedentemente trattati con almeno due regimi di trattamento tra cui chemioterapia a base di fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-VEGF ed anti-EGFR	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01BC59	Trifluridina/tipiracil	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma metastatico colorettale (CRC), già precedentemente trattati o non considerati candidati per il trattamento con altre terapie disponibili, tra cui chemioterapia a base di fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan, farmaci anti-VEGF ed anti-EGFR	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01BC59	Trifluridina/tipiracil	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 70/2022	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma gastrico metastatico incluso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che sono stati precedentemente trattati con almeno due precedenti regimi di trattamento sistemico per malattia avanzata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CA04	Vinorelbina Bitartrato	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Carcinoma polmonare non a piccole cellule Carcinoma mammario metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali - Oncologia	
L01CA04	Vinorelbina Bitartrato	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma polmonare non a piccole cellule Carcinoma mammario localmente avanzato e metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali - Oncologia	
L01CA05	Vinflunina	ev	OSP	H		DCA 164/2018	in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule transizionali del tratto uroteliale avanzato o metastatico dopo fallimento di un precedente regime contenente platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CD01	Paclitaxel	ev	OSP	H		DCA 93/2016	Indicazioni oncologiche	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CD04	Cabazitaxel	ev	OSP	H		DCA 164/2018	in combinazione con prednisione o prednisolone è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della prostata metastatico resistente alla castrazione, trattati in precedenza con un regime contenente docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01CE01	Topotecan Cloridrato	ev/os	OSP/RNRL	H/A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante (SCLC) per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea	Formulazione <u>os</u> Hub e Spoke: - Oncologia	
L01CE02	Irinotecan base anidra (come sale sucrososfato in formulazione liposomiale pegilata)	ev	OSP	H		DCA 332/2023	Trattamento dell'adenocarcinoma metastatico del pancreas, in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e leucovorin (LV), in pazienti adulti in progressione dopo una terapia a base di gemcitabina	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CE02	Irinotecan Cloridrato Triidrato	ev	OSP	H		DCA 259/2018	Trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon-retto	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CX01	Trabectedina	ev	OSP	H		DCA 164/2018	indicato nel trattamento dei pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato dopo il fallimento della terapia con antracicline e ifosfamide o che non sono idonei a ricevere tali agenti. I dati sull'efficacia si basano soprattutto su pazienti con liposarcoma e leiomiomasarcoma	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01CX01	Trabectedina	ev	OSP	H		DCA 164/2018	In associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), è indicato per il trattamento di pazienti con recidiva di cancro ovarico platino-sensibile	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01DB11	Pixantrone Dimaleato	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin (LNH) a cellule B aggressive, recidivati più volte o refrattari. Il beneficio del trattamento con pixantrone non è stato dimostrato quando è usato come chemioterapia in quinta linea o successiva, in pazienti refrattari all'ultima terapia.	Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EA01	Imatinib	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	
L01EA02	Dasatinib	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica di nuova diagnosi Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo e LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia Leucemia Mieloide Cronica in fase cronica o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA03	Nilotinib	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica di nuova diagnosi	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA04	Bosutinib	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Leucemia Mieloide Cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica, in fase accelerata e in fase blastica trattati in precedenza con uno o più inibitori della Tirosin kinesi e per i quali l'imatinib, nilotinib e il dasatinib non sono considerate opzioni terapeutiche appropriate	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA05	Ponatinib	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Indicato in pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica in fase cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), accelerata o blastica resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA05	Ponatinib	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Indicato in pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica in fase cronica con cromosoma Philadelphia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EA05	Ponatinib	os	RNRL	H		DCA 164/2018	in pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EA06	Asciminib	os	RNRL	H		DCA 212/2023	Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica (LMC-CP Ph+) precedentemente trattati con due o più inibitori tirosin-chinasici	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EB04	Osimertinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico positivo per la mutazione T790M del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EB04	Osimertinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EB04	Osimertinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Indicato in monoterapia per il trattamento adiuvante dopo resezione completa del tumore in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IB-IIIa il cui tumore presenta delezioni dell'esone 19 o mutazione sostitutiva dell'esone 21 (L858R) del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR).	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	GU n. 129 del 4/6/2013 Vemurafenib è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600 GU n. 230 del 01/10/2016 Cobimetinib è indicato in associazione a vemurafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	DCA 93/2016	GU n.256 del 3/11/2015 Indicato in associazione con cobimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC01	Vemurafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione del BRAF V600.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC02	Dabrafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	DCA 88/2017	Melanoma inoperabile o metastatico: Dabrafenib in monoterapia o in associazione con trametinib e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC02	Dabrafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Trattamento adiuvante del melanoma: Dabrafenib in associazione con trametinib è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600, dopo resezione completa.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC03	Encorafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020 DCA 70/2022	Indicato in associazione con binimetinib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EC03	Encorafenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020 DCA 70/2022	Indicato in associazione con cetuximab per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colon retto (CRC) positivo alla mutazione BRAF V600E, che hanno ricevuto precedente terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01ED01	Crizotinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento di pazienti pediatrici (da >=6 a <18 anni) con linfoma anaplastico a grandi cellule (Anaplastic LargeCell Lymphoma, ALCL) di tipo sistemico recidivante o refrattario, positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED01	Crizotinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento di pazienti pediatrici (da >=6 a <18 anni) con tumore miofibroblastico infiammatorio (Inflammatory Myofibroblastic Tumour, IMT) non resecabile, recidivante o refrattario, positivo per ALK (chinasi del linfoma anaplastico)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED01	Crizotinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in stadio avanzato	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED03	Alectinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 259/2018 DCA 70/2022	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in stadio avanzato precedentemente trattati con crizotinib.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED03	Alectinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 259/2018	In monoterapia è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01ED05	Lortatinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 332/2023	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) non trattati in precedenza con un inibitore di ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01ED05	Lorlatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro del polmone non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) la cui malattia è progredita dopo trattamento con alectinib o ceritinib come terapia di prima linea con un inibitore della tirosin chinasi (TKI) ALK, oppure dopo trattamento con crizotinib e almeno un altro TKI ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EE01	Trametinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 88/2017 DCA 02/2020	In associazione a dabrafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EE04	Selumetinib		RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 66/2024	Indicato in monoterapia per il trattamento del neurofibroma plessiforme (PN) inoperabile, sintomatico in pazienti pediatrici con neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) a partire dai tre anni di età	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L01EE04	Selumetinib	os				DCA 02/2020	Trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600, dopo resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EF01	Palbociclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) - in associazione ad un inibitore dell'aromatasi - in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EF02	Ribociclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In associazione a un inibitore dell' aromatasi o a fulvestrant, e' indicato nelle donne con carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR) e negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2), come terapia iniziale a base endocrina o in donne che hanno in precedenza ricevuto una terapia endocrina. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EH01	Lapatinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma mammario, il cui tumore sovraesprime l'HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EH03	Tucatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	In associazione a trastuzumab e capecitabina per il trattamento di pazienti adulti affetti da cancro della mammella localmente avanzato o metastatico HER2-positivo che abbiano ricevuto almeno 2 precedenti regimi di trattamento anti-HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EJ02	Fedratinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato per il trattamento della splenomegalia correlata alla malattia o dei sintomi in pazienti adulti con mielofibrosi primaria, mielofibrosi postpollicitemia vera o mielofibrosi post-trombocitemia essenziale che sono naive agli inibitori della chinasi Janus-associata (JAK) o che sono stati trattati con ruxolitinib	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL02	Acalabrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) non trattata in precedenza.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL02	Acalabrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL03	Zanubrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	In monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da macroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o come trattamento di prima linea per pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia	Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EL03	Zanubrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 332/2023	In monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma della zona marginale (MZL) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia a base di anticorpi anti-CD20;	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL03	Zanubrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 332/2023	In monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfocitica cronica (LLC)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EM03	Alpelisib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato in associazione a fulvestrant per il trattamento delle donne in post-menopausa, e degli uomini, affetti da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2), con mutazione di PIK3CA, dopo progressione di malattia successiva a terapia endocrina come monoterapia	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EN02	Pemigatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 107/2022	In monoterapia è indicato per il trattamento di adulti affetti da colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico, con fusione o riarrangiamento del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), che ha manifestato una progressione dopo almeno una linea precedente di terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX05	Regorafenib	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma metastatico del colon-retto	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX05	Regorafenib	os	RNRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	Trattamento dell'epatocarcinoma (Hepato Cellular Carcinoma, HCC) precedentemente trattato con sorafenib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 88/2017	Trattamento di pazienti adulti con carcinoma midollare della tiroide in progressione, non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	In associazione a nivolumab, è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato in pazienti adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 126/2018	In monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) negli adulti che sono stati precedentemente trattati con sorafenib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX07	Cabozantinib	os	RNRL	H		DCA 66/2024	Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma differenziato della tiroide (DTC) localmente avanzato o metastatico, refrattario o non eleggibile allo iodio radioattivo (RAI) che sono progrediti durante o dopo una precedente terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX08	Lenvatinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 88/2017	Indicato negli adulti per il trattamento del carcinoma indifferenziato della tiroide (DTC)(follicolare, papillare, a cellule di Hurthle) progressivo, localmente avanzato o metastatico, refrattario allo iodio radioattivo (RAI)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX08	Lenvatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Indicato come monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (Hepatocellular Carcinoma, HCC) avanzato o non operabile negli adulti che non hanno ricevuto una precedente terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX08	Lenvatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	Trattamento di adulti affetti da carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato in associazione a pembrolizumab, come trattamento di prima linea	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX08	Lenvatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in associazione a pembrolizumab è indicato in pazienti adulti per il trattamento del carcinoma dell'endometrio (Endometrial Carcinoma, EC) avanzato o ricorrente, che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo il trattamento precedente con una terapia contenente platino in qualsiasi contesto e che non siano candidati all'intervento chirurgico o alla radioterapia curativi	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX09	Nintedanib	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Indicato negli adulti per il trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)	Hub e Spoke: - Pneumologia - Medicina Interna - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Centro Regionale Fibrosi Cistica	
L01EX09	Nintedanib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017	in associazione con docetaxel per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, metastatico o localmente ricorrente con istologia adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima linea	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX09	Nintedanib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Trattamento di malattie interstiziali polmonari (ILD) fibrosanti croniche con fenotipo progressivo	Hub e Spoke: - Pneumologia - Reumatologia - Immunologia - Medicina Interna	
L01EX12	Larotrectinib solfato	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici affetti da tumori solidi che presentino una fusione di geni del Recettore Tirosin-Chinasi Neurotrofico (Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase, NTRK), - che abbiano una malattia localmente avanzata, metastatica oppure nel caso in cui la resezione chirurgica possa determinare una severa morbidità - che non dispongano di opzioni terapeutiche soddisfacenti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX13	Gilteritinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) recidivante o refrattaria che presentano una mutazione del gene FLT3.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EX14	Entrectinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a dodici anni con tumori solidi che esprimono una fusione dei geni del recettore tirosin-chinasico neurotrofico (NTRK), che sono affetti da malattia localmente avanzata, metastatica o la cui resezione chirurgica potrebbe comportare una severa morbidità e che non sono stati trattati in precedenza con un inibitore di NTRK, che non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti	Hub: - Oncologia (con i requisiti riportati in G.U. n. 214/2021)	
L01EX14	Entrectinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato ROS1- positivo non precedentemente trattati con inibitori di ROS1	Hub: - Oncologia (con i requisiti riportati in G.U. n. 214/2021)	
L01EX18	Avapritinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 238/2023	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da mastocitosi sistemica aggressiva (ASM), mastocitosi sistemica associata a neoplasia ematologica (SM-AHN) o leucemia mastocitaria (MCL), in seguito ad almeno una terapia sistemica. Mastocitosi Sistemica codice di esenzione Malattia Rara: RDO081; In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con Tumori stromali gastrointestinali (GIST) non resecabili o metastatici che presentano la mutazione del recettore alfa del fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGFRA) D842V	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L01EX19	Ripretinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 111/2024	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con tumore stromale gastrointestinale (GIST) avanzato che hanno ricevuto un trattamento precedente con tre o più inibitori della chinasi, incluso imatinib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX21	Tepotinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 106/2023	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, con alterazioni genetiche associate a skipping dell'esone 14 (METex14) del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale, che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EX17	Capmatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 212/2023	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, che presenta alterazioni genetiche associate al salto (skipping) dell'esone 14 del fattore di transizione mesenchimale-epiteliale (METex14) e che richiede una terapia sistemica a seguito di un precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX22	Selpercatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con immunoterapia e/o chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX22	Selpercatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	Come monoterapia è indicato nel trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato RET fusione-positivo non precedentemente trattati con un inibitore di RET	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX22	Selpercatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	Come monoterapia è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari o superiore a dodici anni con cancro midollare della tiroide (MTC) avanzato con mutazione di RET	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX23	Pralsetinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 106/2023	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene REarranged during Transfection (RET) non precedentemente trattati con un inibitore di RET	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EX22	Selpercatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Cancro della tiroide avanzato RET fusione-positivo che richiede terapia sistemica dopo precedente trattamento con sorafenib e/o lenvatinib;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FA01	Rituximab/Rituximab biosimilare	ev,sc	OSP	H		DCA 164/2018	Indicazioni ematologiche	Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	
L01FA01	Rituximab/Rituximab biosimilare	ev,sc	OSP	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 146/2017	Indicazioni reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio - ASP KR	
L01FA01	Rituximab/Rituximab biosimilare	ev,sc	OSP	H		DCA 95/2021	Trattamento di pazienti con pemfigo volgare (PV) da moderato a grave	Hub: - Dermatologia	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 126/2018	In combinazione con Lenalidomide e Desametasone, o bortezomib e Desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In associazione con Lenalidomide e Desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In associazione con bortezomid, melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In associazione con bortezomid, talidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 106/2023	In associazione con ciclofosfamide, bortezomid e desametasone per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi sistemica da catene leggere (AL) di nuova diagnosi	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L01FC01	Daratumumab	ev,sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 106/2023	In associazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente linea di terapia contenente un inibitore del proteasoma e lenalidomide, e che erano refrattari alla lenalidomide, o che abbiano ricevuto almeno due precedenti linee di terapia contenenti lenalidomide e un inibitore del proteasoma, e che abbiano mostrato progressione della malattia durante o dopo l'ultima terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FD02	Pertuzumab	ev	OSP	H		DCA 332/2023	Carcinoma mammario in fase iniziale È indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FD02	Pertuzumab	ev	OSP	H		DCA 164/2018	È indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FD02	Pertuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Carcinoma mammario in fase iniziale. "Perjeta" è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FD04	Trastuzumab deruxtecan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-positivo non reseccabile o metastatico, che hanno ricevuto uno o più precedenti regimi a base di anti-HER2 nel setting metastatico o hanno presentato una progressione di malattia durante un trattamento (neo)adiuvante o entro sei mesi dalla sua interruzione	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FD04	Trastuzumab deruxtecan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con adenosarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea (GEJ) avanzato HER2-positivo, che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FD04	Trastuzumab deruxtecan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella HER2-low non reseccabile o metastatico, che hanno ricevuto precedente chemioterapia per malattia metastatica o che hanno sviluppato recidiva della malattia durante o entro 6 mesi dal completamento della chemioterapia adiuvante	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In associazione a chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento neoadiuvante del carcinoma polmonare non a piccole cellule reseccabile ad alto rischio di recidiva in pazienti adulti con espressione tumorale di PD L1 $\geq 1\%$	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma allo stadio IB o IIC o melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 307/2023	in associazione a chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule squamose dell'esofago, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico, con espressione tumorale del PDL1 \geq 1%	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia è indicato per il trattamento adiuvante di adulti con melanoma con coinvolgimento dei linfonodi o malattia metastatica che sono stati sottoposti a resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017	Trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato a metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017	Trattamento in monoterapia del carcinoma a cellule renali avanzato dopo precedente terapia negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia per il trattamento del carcinoma squamoso della testa e del collo ricorrente o metastatico negli adulti in progressione durante o dopo terapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e trattamento con brentuximab vedotin	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma dell'esofago istotipo squamoso, avanzato non resecabile, ricorrente o metastatico dopo precedente chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	In associazione con Ipilimumab indicati per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile ad istologia non epitelioide	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	In monoterapia è indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti In associazione ad Ipilimumab è indicato, negli adulti, per il trattamento del melanoma metastatico in presenza di metastasi cerebrali asintomatiche o con PD-L1 < 1%	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	Carcinoma a cellule renali (RCC): in associazione a cabozantinib è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	Carcinoma del colon-retto (CRC) con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H): in associazione ad Ipilimumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colonretto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF01	Nivolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	Adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastroesofagea (GEJ) o dell'esofago: in associazione a chemioterapia di combinazione a base di fluoropirimidina e platino è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma dello stomaco, della giunzione gastroesofagea o dell'esofago, HER2 negativo, avanzato o metastatico, i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio positivo combinato (CPS) ≥ 5.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In associazione a trastuzumab, chemioterapia contenente fluoropirimidina e platino, è indicato nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In associazione a chemioterapia contenente fluoropirimidina e platino, è indicato nel trattamento di prima linea dell'adenocarcinoma dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 negativo localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS ≥ 1	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In associazione a gemcitabina e cisplatino, è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma delle vie biliari localmente avanzato non resecabile o metastatico negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In monoterapia è indicato nel trattamento adiuvante di adulti con carcinoma a cellule renali a maggior rischio di recidiva a seguito di nefrectomia o a seguito di nefrectomia e resezione di lesioni metastatiche	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In associazione a chemioterapia contenente platino come trattamento neoadiuvante e poi continuato in monoterapia come trattamento adiuvante, è indicato nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule resecabile ad alto rischio di recidiva negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021 DCA 02/2020	In monoterapia nel Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico (cHL) recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e brentuximab vedotin (BV), o che non siano eleggibili al trapianto e abbiano fallito il trattamento con BV	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	In monoterapia nel trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 3 anni affetti da linfoma di Hodgkin classico recidivato o refrattario che abbiano fallito il trattamento con trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) o a seguito di almeno due precedenti terapie quando ASCT non è un'opzione di trattamento.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	In monoterapia nel trattamento del carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico negli adulti che hanno ricevuto una precedente chemioterapia contenente platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Trattamento di prima linea del NSCLC metastatico non squamoso negli adulti in associazione a carboplatino e paclitaxel o nabpaclitaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato negli adulti in associazione ad axitinib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	In monoterapia e' indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma metastatico del colon-retto con elevata instabilità' dei microsatelliti (MSI-H, microsatellite instability-high) o con deficit di riparazione del mismatch (dMMR, mismatch repair deficient) negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	In monoterapia è indicato nel trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) nei pazienti adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	in monoterapia o in associazione a chemioterapia contenente platino e 5-fluorouracile (5-FU), è indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule squamose della testa e del collo, metastatico o ricorrente non resecabile, negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS \geq 1	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 64/2020	in monoterapia è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma al III Stadio e con coinvolgimento dei linfonodi che sono stati sottoposti a resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in associazione a chemioterapia con o senza bevacizumab, indicato nel trattamento del carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS maggiore o uguale a 1	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in associazione a chemioterapia, indicato nel trattamento del carcinoma mammario triplo negativo localmente ricorrente non resecabile o metastatico negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS = 10 e che non hanno ricevuto una precedente chemioterapia per malattia metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in associazione a lenvatinib, indicato nel trattamento del carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente negli adulti con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF04	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in associazione a chemioterapia contenente platino e fluoropirimidina, indicato nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma dell'esofago localmente avanzato non resecabile o metastatico o adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea HER-2 negativo negli adulti il cui tumore esprime PD-L1 con un CPS \geq 10	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in associazione a lenvatinib, indicato nel trattamento di prima linea del carcinoma a cellule renali avanzato negli adulti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in monoterapia indicato nel trattamento adiuvante di adulti con carcinoma a cellule renali M1 NED a seguito di nefrectomia e resezione di lesioni metastatiche	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in associazione a chemioterapia come trattamento neoadiuvante e poi continuato in monoterapia come trattamento adiuvante dopo intervento chirurgico, indicato nel trattamento di adulti con carcinoma mammario triplo negativo localmente avanzato o in fase iniziale ad alto rischio di recidiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in monoterapia indicato nel trattamento adiuvante di adulti con melanoma in stadio IIB, IIC e che sono stati sottoposti a resezione completa	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Pembrolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in monoterapia indicato nel trattamento dei seguenti tumori MSI-H (alta instabilità dei microsatelliti) o dMMR (deficit del mismatch repair) negli adulti con: <ul style="list-style-type: none"> • carcinoma del colon-retto non resecabile o metastatico dopo precedente terapia di associazione a base di fluoropirimidina; • carcinoma dell'endometrio avanzato o ricorrente, con progressione della malattia durante o dopo un precedente trattamento con una terapia contenente platino in qualsiasi setting e che non sono candidati a chirurgia curativa o radioterapia; • carcinoma gastrico, dell'intestino tenue o delle vie biliari, non resecabile o metastatico, con progressione della malattia durante o dopo almeno una precedente terapia 	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF04	Avelumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma a cellule di Merkel (Merkel Cell Carcinoma, MCC) metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF04	Avelumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	in monoterapia per il trattamento di mantenimento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma uroteliale (urothelial carcinoma, UC) localmente avanzato o metastatico senza progressione dopo chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020	In combinazione con carboplatino ed etoposide, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule; In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con Atezolizumab i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono essere stati sottoposti anche a terapia a bersaglio molecolare	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020	In combinazione con nab-paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario triplo negativo (triple-negative breastcancer, TNBC) non resecabile localmente avanzato o metastatico i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 \geq 1% e che non sono stati sottoposti a precedente chemioterapia per malattia metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 107/2022	In associazione con bevacizumab, indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile non sottoposti a precedente terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 107/2022	In monoterapia, indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) metastatico, i cui tumori presentano un'espressione di PD-L1 = 50% sulle cellule tumorali (TC) o = 10% sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore (IC) e sono negativi per mutazioni di EGFR o riarrangiamenti di ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020	In combinazione con carboplatino ed etoposide, è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule; in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico precedentemente sottoposti a chemioterapia. Prima di essere trattati con Atezolizumab i pazienti affetti da NSCLC con mutazioni di EGFR o ALK-positivo devono essere stati sottoposti anche a terapia a bersaglio molecolare	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF05	Atezolizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio iniziale	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato (mCSCC o laCSCC) che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	In monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare localmente avanzato o metastatico (laBCC o mBCC) la cui malattia è progredita o che sono intolleranti a un inibitore del pathway di Hedgehog (HHI)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Dermatologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Indicato in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) con espressione di PD-L1 (in ≥50% delle cellule tumorali), senza aberrazioni EGFR, ALK o ROS1, che presentano: NSCLC localmente avanzato e non sono candidati per la chemioradioterapia definitiva, oppure NSCLC metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma della cervice uterina recidivante o metastatico con progressione di malattia durante o dopo un precedente trattamento con chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF06	Cemiplimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	in associazione a chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con NSCLC che esprimono PD-L1 (in ≥1% delle cellule tumorali), senza aberrazioni di EGFR, ALK o ROS1, che presentano: NSCLC localmente avanzato che non sono candidati per la chemioradioterapia definitiva, oppure NSCLC metastatico;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF07	Dostarlimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	indicato in associazione a carboplatino e paclitaxel per il trattamento di pazienti adulte affette da cancro endometriale (CE) primario avanzato o ricorrente con deficit del sistema di mismatch repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H) e che sono candidate per la terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF07	Dostarlimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma endometriale avanzato o ricorrente, con deficit del sistema di Mismatch Repair (dMMR)/elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H), progredito durante o dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FG01	Bevacizumab	ev	OSP	H		DCA 88/2017 DCA 147/2020	In associazione con paclitaxel e cisplatino o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne che non possono essere sottoposte a Terapia a base di platino, per il trattamento di pazienti adulte affette da carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FG01	Bevacizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 147/2020	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
L01FG01	Bevacizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 147/2020	Edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	indicato per il trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	in associazione a nivolumab e' indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule renali avanzato a rischio intermedio/sfavorevole;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	in associazione a nivolumab e due cicli di chemioterapia a base di platino e' indicato per il trattamento in prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico negli adulti il cui tumore non esprime mutazioni per EGFR o traslocazioni di ALK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	in associazione sono indicati per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con mesotelioma maligno della pleura non resecabile ad istologia non epitelioide	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX04	Ipilimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	Carcinoma del colon-retto (CRC) con deficit di riparazione del mismatch (dMMR) o elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H); in associazione a nivolumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma del colonretto metastatico con deficit di riparazione del mismatch o elevata instabilità dei microsatelliti dopo precedente chemioterapia di associazione a base di fluoropirimidina;	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX05	Brentuximab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato in combinazione con ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (CHP) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico (sALCL)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX06	Brentuximab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato in combinazione con doxorubicina, vinblastina e dacarbazina (AVD) per pazienti adulti non precedentemente trattati affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ in Stadio IV	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX07	Brentuximab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Trattamento di pazienti adulti affetti da Linfoma cutaneo a cellule T (CTCL) CD30 positivo, sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX08	Elotuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017	In combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno una linea di terapia precedente	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX08	Elotuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In combinazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due linee di terapia precedenti comprendenti lenalidomide e un inibitore del proteasoma e con progressione della malattia durante l'ultima terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX09	Mogamulizumab	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021 DCA Aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento di pazienti adulti affetti da micosi fungoide (MF) o Sindrome di Sézary (SS) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia sistemica.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX12	Tafasitamab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	In associazione a lenalidomide, seguito da Tafasitamab in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario e non idonei a trapianto autologo di cellule staminali (Autologous Stem Cell Transplant, ASCT)	DCA n. 102/2020	
L01FX13	Enfortumab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro uroteliale (UC) localmente avanzato o metastatico che hanno precedentemente ricevuto una chemioterapia contenente platino e un inibitore del recettore di morte programmata 1 o un inibitore del ligando di morte programmata 1	Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX14	Polatuzumab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone (R-CHP) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) non precedentemente trattato con fattore di indice prognostico (PI) 3-5	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX14	Polatuzumab vedotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	In associazione a bendamustina e rituximab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante/refrattario non candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX15	Belantamab Mafodotin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	In monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo nei pazienti adulti, che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia risulta refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38 e che hanno mostrato progressione di malattia all'ultima terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX17	Sacituzumab govitecan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC) o non resecabile che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX17	Sacituzumab govitecan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella positivo per i recettori ormonali (HR) e negativo per il recettore HER2, metastatico o non resecabile che abbiano ricevuto in precedenza terapia endocrina e almeno altre due terapie sistemiche nel contesto avanzato precedentemente rimborsato solo per la malattia avanzata con recidiva entro 12 mesi dalla precedente terapia neo/adiuvante	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX17	Sacituzumab govitecan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro della mammella triplo negativo metastatico o non resecabile (metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC) che abbiano ricevuto in precedenza almeno due terapie sistemiche, almeno una delle quali per la malattia avanzata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FX18	Amivantamab	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 106/2023	In monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) avanzato con mutazioni da inserzione nell'esone 20 attivanti (exon20ins) del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR), dopo il fallimento della chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX20	Tremelimumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	Carcinoma epatocellulare: in associazione a durvalumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare avanzato o non resecabile	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX22	Loncastuximab tesirine	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 111/2024	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma ad alto grado a cellule B (high-grade) recidivanti o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX25	Mosunetuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 307/2023	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare (LF) recidivante o refrattario che sono stati sottoposti ad almeno due terapie sistemiche precedenti	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX28	Glofitamab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 111/2024	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX29	Talquetamab	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, compresi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38 e che abbiano evidenziato progressione della malattia durante l'ultima terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FY01	Pertuzumab/Trastuzumab	sc	OSP	H		DCA 315/2024	Indicato per l'uso in associazione con chemioterapia nel trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01X	brexucabtagene autoleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (mantle cell lymphoma, MCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica che includano un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (Bruton's tyrosine kinase, BTK)	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		DCA 259/2018 DCA 02/2020		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		DCA 02/2020	Carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		DCA 02/2020	Carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC03	Trastuzumab/Trastuzumab biosimilare	ev,sc	OSP/RNRL	H		DCA 02/2020	Carcinoma gastrico metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC05	Gemtuzumab/Ozogamicin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	In combinazione a terapia con daunorubicina (DNR) e citarabina (AraC) per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a 15 anni con leucemia mieloide acuta (LMA) CD33-positiva de novo, precedentemente non trattata, ad eccezione della leucemia promielocitica acuta (LPA)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC06	Cetuximab	ev	OSP	H		DCA 164/2018	carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC06	Cetuximab	ev	OSP	H		DCA 164/2018	carcinoma a cellule squamose di testa e collo	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC08	Panitumumab	ev	OSP	H		DCA 88/2017	carcinoma metastatico del colon-retto (mCRC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC09	Catumaxomab	ip	OSP	H		DCA 164/2018	Trattamento peritoneale dell'ascite maligna in pazienti con carcinomi EpCAM-positivi quando la terapia standard non sia disponibile o non sia più attuabile	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC14	Trastuzumab Emtansine	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Trattamento adiuvante di pazienti adulti affetti da tumore mammario in stadio iniziale HER2- positivo con malattia invasiva residua a livello della mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC14	Trastuzumab Emtansine	ev	OSP	H		DCA 134/2021	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2-positivo, inoperabile, localmente avanzato o metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e un taxano, somministrati separatamente o in associazione. I pazienti devono, o essere stati sottoposti in precedenza a terapia per la malattia localmente avanzata o metastatica, oppure aver sviluppato recidiva di malattia nel corso di o entro sei mesi dal completamento della terapia adiuvante	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017	Leucemia linfatica cronica (LLC)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 109/2019	In associazione a Bendamustina, seguito da obinutuzumab in mantenimento è indicato nel trattamento di pazienti con Linfoma follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione di malattia durante o fino a sei mesi dopo il trattamento con rituximab o un regime contenente rituximab (linee successive alla prima)	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC15	Obinutuzumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 109/2019	In associazione a chemioterapia, come terapia di mantenimento nei soggetti che ottengono una risposta, è indicato per il trattamento di pazienti con LF avanzato non pretrattato	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC16	Dinutuximab beta	ev	OSP	H		DCA 259/2018	Trattamento del neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire dai 12 mesi di età che sono stati precedentemente sottoposti a chemioterapia di induzione conseguendo almeno una risposta parziale, seguita da terapia mieloablattiva e trapianto di cellule staminali	Hub: - Oncologia - Oncoematologia pediatrica GOM Reggio Calabria: - UOC Centro Trapianti Midollo Osseo	
L01XC16	Dinutuximab beta	ev	OSP	H		DCA 259/2018	Trattamento del neuroblastoma recidivante o refrattario con o senza malattia residua e in pazienti che non hanno conseguito una risposta completa dopo terapia di prima linea, senza cosomministrazione di IL-2	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XC19	Blinatumomab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 88/2017	Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il cromosoma Philadelphia.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC19	Blinatumomab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superior a 1 anno con LLA da precursori delle cellule B in prima recidiva ad alto rischio, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, come parte della terapia di consolidamento.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC19	Blinatumomab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 332/2023	In monoterapia per il trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19. I pazienti con LLA da precursori delle cellule B positiva per il cromosoma Philadelphia devono non aver risposto al trattamento con almeno 2 inibitori della tirosin chinasi (TKI) e non devono avere opzioni di trattamento alternative	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC21	Ramucirumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	In associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino e fluoropirimidine. In monoterapia è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con carcinoma gastrico avanzato o con adenocarcinoma della giunzione gastro-esofagea con progressione della malattia dopo precedente chemioterapia con platino o fluoropirimidine, per i quali il trattamento in associazione con paclitaxel non è appropriato	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC26	Inotuzumab Ozogonomicin	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)	Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	
L01XC27	Olaratumab	ev	OSP	H		DCA 146/2017	In combinazione con doxorubicina per il trattamento di pazienti adulti con sarcoma dei tessuti molli in fase avanzata che non sono candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico o radioterapico e che non sono stati precedentemente trattati con doxorubicina.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FF02	Durvalumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	Carcinoma delle vie biliari: in associazione a gemcitabina e cisplatino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma delle vie biliari (BTC) non resecabile o metastatico.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Durvalumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	Carcinoma epatocellulare: in associazione a tremelimumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato o non resecabile	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Durvalumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	In monoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato, non resecabile, negli adulti il cui tumore presenta un'espressione di PD-L1 \geq 1% sulle cellule tumorali e la cui malattia non è progredita a seguito di chemio-radioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FF02	Durvalumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	In associazione con etoposide e carboplatino o cisplatino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (ES-SCLC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01FX24	Teclistamab	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	In monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo recidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, compresi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che abbiano evidenziato progressione della malattia durante l'ultima terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01FX27	Eporitamab	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	In monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario, dopo due o più linee di terapia sistemica	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01FY02	Nivolumab/relatimab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	indicato per il trattamento di prima linea del melanoma avanzato (non resecabile o metastatico) negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con espressione tumorale del PD-L1 < 1%	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XC38	Isatuximab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato, in associazione a pomalidomide e desametazone, per il trattamento di pazienti adulti con MM recidivato e refrattario che hanno ricevuto almeno due terapie precedenti, tra cui lenalidomide e un inibitore del proteasoma (PI) e con progressione della malattia durante l'ultima terapia.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XC38	Isatuximab				Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	in combinazione con carfilzomib e desametazone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto almeno una e non più di 3 linee di terapia precedenti. Sono esclusi dalla rimborsabilità i pazienti con "primary refractory disease" e i pazienti pretrattati con carfilzomib o refrattari/intolleranti ad un precedente trattamento con anticorpi monoclonali anti-CD38.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XE02	Gefitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l'EGFR-TK	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE03	Erlotinib cloridrato	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE03	Erlotinib cloridrato	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Carcinoma pancreatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE04	Sunitinib maleato	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE04	Sunitinib maleato	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma renale metastatico (MRCC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE04	Sunitinib maleato	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Tumori neuroendocrini pancreatici (pNET)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE05	Sorafenib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Epatocarcinoma (HCC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE05	Sorafenib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma a cellule renali (RCC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE05	Sorafenib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma tiroideo differenziato	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE09	Temsirolimus	ev	OSP	H		DCA 164/2018		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XE11	Pazopanib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE12	Vandetanib	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 93/2016	Carcinoma Midollare della Tiroide (MTC)	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XE13	Afatinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	In monoterapia è indicato nel trattamento di pazienti adulti naïve agli inibitori tirosinchinasi del recettore del fattore di crescita dell'epidermide (EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR	Hub e Spoke: - Oncologia	
L01XE17	Axitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01EJ01	Ruxolitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 315/2024	indicato per il trattamento di pazienti di età pari o superiore ai 12 anni con malattia del trapianto contro l'ospite acuta o con malattia del trapianto contro l'ospite cronica che presentano una risposta inadeguata al trattamento con corticosteroidi o altre terapie sistemiche	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EJ01	Ruxolitinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 126/2018	Trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EJ01	Ruxolitinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 126/2018	Trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EJ04	Momelotinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	Indicato per il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con anemia da moderata a severa che sono affetti da mielofibrosi primaria, mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale e che sono naive agli inibitori della chinasi Janus (JAK) o già trattati con ruxolitinib	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL01	Ibrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di Waldenström (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL01	Ibrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia Linfocitica Cronica (CLL) precedentemente non trattata. in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con CLL che hanno ricevuto almeno una precedente terapia.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01EL01	Ibrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare (MCL) recidivato o refrattario	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01EL01	Ibrutinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	in associazione con venetoclax è indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia linfatica cronica (CLL) precedentemente non trattata	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XE28	Ceritinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia per il trattamento in prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK)	Hub: - Oncologia	
L01XE28	Ceritinib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in stadio avanzato, precedentemente trattati con crizotinib	Hub: - Oncologia	
L01XE38	Cobimetinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 88/2017	In associazione a vemurafenib per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del BRAF V600	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE39	Midostaurina	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 259/2018	In combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina ad alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento con Rydapt come agente singolo per pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva	Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	
L01XE41	Binimetinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 147/2020	In associazione con encorafenib è indicato per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XE43	Brigatinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 95/2021	Trattamento di pazienti adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (anaplastic lymphoma kinase, ALK) in stadio avanzato, precedentemente non trattati con un inibitore di ALK.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Medicina Interna - Pneumologia	
L01XE43	Brigatinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 95/2021	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con NSCLC, ALK positivo, in stadio avanzato, precedentemente trattati con Crizotinib	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Medicina Interna - Pneumologia	
L01XE50	Abemaciclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020 DCA 95/2021	Trattamento di donne con carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico, positivo ai recettori ormonali (HR), negativo al recettore del fattore umano di crescita epidermico di tipo 2 (HER2); in associazione con un inibitore delle aromatasi o fulvestrant come terapia endocrina iniziale o in donne che hanno ricevuto una precedente terapia endocrina. Nelle donne in pre- o peri-menopausa, la terapia endocrina deve essere combinata con un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XE50	Abemaciclib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 212/2023	Carcinoma mammario in fase iniziale. In associazione alla terapia endocrina è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale, positivo al recettore ormonale (HR), negativo al recettore del fattore di crescita umano epidermico di tipo 2 (HER2), infonodopositivo, ad alto rischio di recidiva. Nelle donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina con inibitore dell'aromatasi deve essere associata a un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XF01	Tretionina	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XF03	Bexarotene	os	RNRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	In associazione con abiraterone e prednisone o prednisolone, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della prostata metastatico e resistente alla castrazione (mCRPC) e con mutazioni BRCA 1/2 (germinali e/o somatiche), in cui la chemioterapia non è clinicamente indicata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 307/2023	In monoterapia o in associazione con la terapia endocrina per il trattamento adiuvante di pazienti adulti con cancro della mammella allo stadio iniziale ad alto rischio, HER2-negativo, e con mutazioni nella linea germinale BRCA1/2, precedentemente trattati con chemioterapia neoadiuvante o adiuvante	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	In monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale sieroso di alto grado, di carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primitivo, BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), che sono in risposta (risposta completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In monoterapia, per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo FIGO) BRCA1/2- mutato (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che sono in risposta (completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Trattamento in monoterapia di pazienti adulti con cancro della mammella, localmente avanzato o metastatico, HER2 negativo, e con mutazioni della linea germinale BRCA1/2. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con un'antraciclina e un taxano nel setting (neo)adiuvante o metastatico, a meno che i pazienti fossero stati non eleggibili per questi trattamenti. I pazienti con cancro della mammella e recettore ormonale (HR)-positivo, devono inoltre aver progredito durante o dopo una precedente terapia endocrina o devono essere considerati non eleggibili per la terapia endocrina	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV secondo FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, in risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il cui tumore presenti un deficit di ricombinazione omologa (homologous recombination deficiency, HRD), definito dalla presenza di una mutazione BRCA1/2 e/o di instabilità genomica.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XK01	Olaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato, in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione e con mutazioni nei geni BRCA1/2 (mutazione nella linea germinale e/o mutazione somatica), in progressione dopo precedente trattamento che includeva un nuovo agente ormonale	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK02	Niraparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale avanzato (stadio FIGO III e IV), carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, che stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia di prima linea a base di platino per le pazienti BRCA mutate.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK03	Rucaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale, delle tube di Falloppio o peritoneale primario, avanzato (stadio III e IV secondo FIGO) e ad alto grado, in risposta (risposta completa o parziale) dopo il completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK03	Rucaparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Indicato come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino sensibile di carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle tube di Falloppio o peritoneale primario, in risposta (risposta completa o parziale) dopo chemioterapia a base di platino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XK04	Talazoparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	Indicato in combinazione con enzalutamide per il trattamento dei pazienti adulti con cancro della prostata metastatico e resistente alla castrazione (mCRPC) e con mutazioni BRCA 1/2 (germinali e /o somatiche), per i quali la chemioterapia non è clinicamente indicata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XJ02	Sonidegib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021 DCA 70/2022	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma basocellulare (BCC) in stadio localmente avanzato che non sono suscettibili di intervento chirurgico curativo o radioterapia	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Dermatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XL03	Glasdegib maleato	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021 DCA 107/2022	Indicato, in associazione a citarabina a basse dosi, per il trattamento della leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi de novo oppure secondaria, in pazienti adulti non candidabili alla chemioterapia di induzione standard	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XL03	Axicabtagene ciloleuceel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B refrattario o recidivante (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (primary mediastinal large B-cell lymphoma, PMBCL), dopo due o più linee di terapia sistemica	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XL03	Axicabtagene ciloleuceel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 332/2023	Trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare (LF) r/r dopo tre o più linee di terapia sistemica;	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XL03	Axicabtagene ciloleuceel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 332/2023	Trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) e linfoma a cellule B ad alto grado (high-grade B cell lymphoma, HGBL) refrattario alla chemioimmunoterapia di prima linea o recidivante entro dodici mesi dal completamento della chemioimmunoterapia di prima linea	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XL06	Brexucabtagene autoleuceel, brexu-cel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 332/2023	Indicato per il trattamento di pazienti adulti di eta' pari o superiore a ventisei anni con leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) a precursori di cellule B recidivante o refrattaria	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XL07	Idacabtagene vicleuceel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	Trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivante e refrattario che hanno ricevuto almeno tre precedenti terapie, inclusi un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e un anticorpo anti-CD38, e che hanno dimostrato progressione della malattia all'ultima terapia	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX05	Idrossiurea o Idrossicarbamide	os	RNRL	C		DCA 107/2022 DCA 147/2022 DCA 106/2023	Indicato per la prevenzione delle crisi dolorose vaso-occlusive ricorrenti inclusa la sindrome acuta toracica in pazienti adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 2 anni affetti da anemia falciforme sintomatica	Hub: - Ematologia - Pediatria	
L01XX23	Mitotane	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX24	Peg-asparaginasi	ev	OSP	H		DCA 146/2017	Come componente di una terapia di associazione antineoplastica per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, ALL) nei pazienti pediatrici dalla nascita a diciotto anni e negli adulti.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX27	Arsenico triossido	ev	OSP	H		DCA 02/2020	Induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da leucemia promielocitica acuta (LPA) di nuova diagnosi a rischio basso/intermedio (conta leucocitaria $\leq 10 \times 10^9/\text{mcl}$) in combinazione con acido all-trans retinoico (ATRA) caratterizzata dalla presenza della traslocazione t(15;17) e/o dalla presenza del gene Leucemia Promielocitica/recettore alfa dell'acido retinoico (PML/RAR-alfa)	uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
L01XX32	Bortezomib	ev	OSP	H		DCA 164/2018	In monoterapia in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desamteosone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX33	Bortezomib	ev	OSP	H		DCA 164/2018	In associazione con melafalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX34	Bortezomib	ev	OSP	H		DCA 164/2018	In associazione con desametasone o con desametasone e talidomide è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX35	Bortezomib	ev	OSP	H		DCA 164/2018	In associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX35	Anagrelide cloridrato	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX41	Eribulina mesilato	ev	RNRL/OSP	H		DCA 164/2018 DCA 126/2018	E' indicato per il trattamento di pazienti con cancro della mammella localmente avanzato o metastatico, che hanno mostrato una progressione dopo almeno due regimi chemioterapici per malatti avanzata. La terapia precedente deve aver previsto l'impiego di un'antraciclina e di un taxano, in contesto adiuvante o metastatico, a meno che i pazienti non siano idonei a ricevere questi trattamenti	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX41	Eribulina mesilato	ev	RNRL/OSP	H		DCA 164/2018	E' indicato per il trattamento di pazienti adulti con liposarcoma inoperabile, sottoposti a precedente terapia contenente antracicline (eccetto se non idonei) per malattia avanzata o metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX43	Vismodegib	os	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Carcinoma basocellulare	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Dermatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX44	Aflibercept	ev	OSP	H		DCA 164/2018	In combinazione con chemioterapia a base di irinotecan/5-fluorouracile/acido folinico (FOLFIRI) è indicato nei pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico (MCR) resistente o in progressione dopo un regime contenente oxaliplatino	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX45	Carfilzomib	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018 DCA 88/2017	In associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX46	Carfilzomib	ev	OSP	H		DCA 126/2018	In associazione con daratumumab e desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX47	Idelalisib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX47	Idelalisib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemioterapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX50	Ixazomib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Treatmento di pazienti adulti affetti da mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia Si ricorda che è ammesso alla rimborsabilità solamente il trattamento di Ixazomib, in combinazione con lenalidomide e desametasone, in pazienti con mieloma multiplo recidivato/refrattario che non si siano dimostrati refrattari a lenalidomide o ad un inibitore del proteasoma e che abbiano ricevuto ≥ 2 precedenti linee di terapia o almeno 1 precedente linea di terapia con citogenetica sfavorevole [del (17); t (4;14); t(14;16)]	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX52	Venetoclax	os	RNRL	H		DCA 164/2018	Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL- chronic lymphocytic leukaemia) in presenza della delezione 17p o della mutazione TR53 in pazienti adulti non idonei o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX52	Venetoclax	os	RNRL	H		DCA 02/2020	Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione 17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX52	Venetoclax	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	In combinazione con obinutuzumab è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) non trattati in precedenza	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX52	Venetoclax	os	RNRL	H		DCA 133/2023	In combinazione con azacitidina è indicato per il trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (AML - acute myeloid leukaemia) di nuova diagnosi non idonei alla chemioterapia intensiva	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX60	Talazoparib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mutazioni germinali BRCA1/2, affetti da carcinoma mammario HER2-negativo localmente avanzato o metastatico. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati con una antraciclina e/o un taxano nel contesto (neo)adiuvante, localmente avanzato o metastatico, ad eccezione dei pazienti non idonei per tali trattamenti. I pazienti con carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali (HR) devono essere stati precedentemente trattati con terapia endocrina o ritenuti non idonei alla terapia endocrina	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX62	Ivosidenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	In associazione con azacitidina, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LMA) con una mutazione dell'isocitrato deidrogenasi 1 (IDH1) R132 che non sono idonei per la chemioterapia di induzione standard	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX62	Ivosidenib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	In monoterapia, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico con mutazione IDH1 R132, precedentemente trattati con almeno una linea di terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX66	Selinexor	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	In associazione a bortezomib e desametasone (SvD) per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una terapia precedente e refrattari alla lenalidomide	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX66	Selinexor	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 315/2024	In associazione a desametasone (Sd) per il trattamento del mieloma multiplo in pazienti adulti sottoposti ad almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia è refrattaria ad almeno due inibitori del proteasoma, a due agenti immunomodulatori e a un anticorpo monoclonale anti-CD38, che abbiano dimostrato progressione di malattia durante l'ultima terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L01XX67	Tagraxofusp	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 133/2023	Indicato in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN)	Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	
L01XX71	Tisagenlecleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Trattamento di: • Pazienti pediatrici e giovani adulti fino a venticinque anni di età con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o ulteriore recidiva;	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX71	Tisagenlecleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 307/2023	Trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare (LF) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L01XX71	Tisagenlecleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Trattamento di: • Pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica.	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XX73	Sotorasib	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 225/2024	In monoterapia per il trattamento di adulti con cancro del polmone non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) in stadio avanzato, con mutazione KRAS G12C e in progressione dopo almeno una precedente linea di terapia sistemica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L01XX88	Lisocabtagene maraleucel	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	Trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (PMBCL) e linfoma follicolare di grado 3B (FL3B) recidivati o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica	CTMO dell'Azienda Ospedaliera GOM di RC (Decreto Dirigenziale n. 10966 del 12.09.2019)	
L01XY01	Daunorubicina/citarabina	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Trattamento di adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta correlata a terapia (t-AML) o AML con alterazioni correlate a mielodisplasia (AML-MRC)	Hub: Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020	
L01FY01	Pertuzumab/Trastuzumab	sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	• in associazione con chemioterapia nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva, • in associazione con docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, metastatico o localmente recidivato non operabile, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L02AB01	Megestrol Acetato	os	RNR	A		DCA 164/2018	neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata o da AIDS		28

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02AB02	Medrossiprogesterone (Acetato)	os,im	RNR	A		DCA 164/2018	neoplasia della mammella e carcinoma dell'endometrio sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata o da AIDS		28
L02AB03	Fulvestrant	im	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma mammella localmente avanzato o metastatico	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L02AE01	Buserelina Acetato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51
L02AE02	Leuprorelina Acetato	im,sc	RR/RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva Pubertà precoce	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51
L02AE03	Goserelin Acetato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02AE04	Triptorelina	sc,im	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Carcinoma della prostata Carcinoma mammella Endometriosi Fibromi uterini inoperabili Trattamento pre-chirurgico dei fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva Pubertà precoce	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Chirurgia - Endocrinologia - Ginecologia - Oncologia - Pediatria - Urologia Ambulatori specialistici territoriali: - Endocrinologo - Urologo - Ginecologo - Pediatra	51
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	E' indicato per il trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione (CRPC), asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	E' indicato per il trattamento di uomini adulti con CRPC metastatico resistente alla castrazione nei quali la patologia è progredita durante o al termine della terapia con docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 147/2022	Trattamento di uomini adulti con cancro della prostata metastatico ormonosensibile (metastatic hormone-sensitive prostate cancer, mHSPC) in associazione con terapia di deprivazione androgenica.	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB04	Enzalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 147/2022	Trattamento di uomini adulti con cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla castrazione (castration resistant prostate cancer, CRPC)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB05	Apalutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 70/2022	Indicato negli uomini adulti per il trattamento del carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC) in combinazione con terapia di deprivazione androgenica (ADT), con diagnosi di malattia a basso volume o ad alto volume e non candidabili a trattamento con docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L02BB06	Darolutamide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 111/2024	Trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico metastatico sensibile agli ormoni (mHSPC) in associazione a docetaxel e a terapia di deprivazione androgenica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BB06	Darolutamide	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 95/2021	Trattamento degli uomini adulti con carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione (nmCRPC) che sono ad alto rischio di sviluppare malattia metastatica	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BX02	Degarelix	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Endocrinologia - Oncologia - Urologia	
L02BX03	Abiraterone acetato	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	E' indicato assieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non è ancora indicata clinicamente	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BX03	Abiraterone acetato	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	E' indicato assieme a prednisone o prednisolone per il trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti la cui malattia è progredita durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	
L02BX04	Relugolix	os	RR	A-PHT		DCA 111/2024	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico in stadio avanzato sensibile agli ormoni	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia - Urologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03	Frazione cellulare arricchita di cellule autologhe CD34+	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti con immunodeficienza grave combinata da deficit di adenosina deaminasi (ADA-SCID), per i quali non sia disponibile un idoneo donatore consanguineo di cellule staminali HLA (antigene leucocitario umano)- compatibili		
L03AA02	Filgrastim originator	ev,sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Ematologia - Malattie infettive - Oncologia	
L03AA02	Filgrastim biosimilare	ev,im,sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Ematologia - Malattie infettive - Oncologia	
L03AA10	Lenograstim	ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Ematologia - Malattie infettive - Oncologia	
L03AA13	Pegfilgrastim	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Ematologia - Malattie infettive - Oncologia	
L03AA14	Lipegfilgrastim	sc	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico/ PT online webcare	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Ematologia - Malattie infettive - Oncologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AB01	Interferone Alfa Naturale	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB01	Interferone Alfa Naturale	im,sc	RRL	A		DCA 164/2018	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB04	Interferone Alfa 2a	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB05	Interferone Alfa 2a	im,sc	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB05	Interferone Alfa 2b	im,sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB06	Interferone Alfa 2b	im,sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AB07	Interferone Beta 1a	im	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB08	Interferone Beta 1b	im	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011) Sclerosi Multipla secondariamente progressiva con malattia in fase attiva evidenziata da recidive	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB10	Interferone Alfa 2b Pegilato	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB10	Interferone Alfa 2b Pegilato	sc	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	
L03AB11	Interferone Alfa-2A Pegilato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le epatiti	Hub e Spoke: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria - Malattie Infettive - Epatologia	
L03AB12	Interferone Alfa-2A Pegilato	sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Per le altre indicazioni	Hub e Spoke: - Dermatologia - Nefrologia - Oncologia - Urologia - Ematologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L03AB13	Peg-interferone Beta 1A	sc	RR	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AB15	Ropeginterferone alfa-2b	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022 DCA Aggiornamento Marzo-Aprile -Maggio 2025	Trattamento della policitemia vera senza splenomegalia sintomatica, in monoterapia nei pazienti adulti.	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L03AX13	Glatiramer	sc	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L03AX15	Mifamurtide	ev	OSP	H		DCA 164/2018	E' indicato nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma non metastatico ad alto grado reseccabile in seguito a resezione chirurgica macroscopicamente	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
L03AX16	Plerixafor	os,sc	OSP	H		DCA 164/2018	E' indicato in combinazione con il fattore stimolante le colonie dei granulociti (G-CSF) per incrementare la mobilitazione delle cellule staminali ematopoietiche nel sangue periferico per la raccolta e il conseguente trapianto autologo in pazienti adulti con linfoma e mieloma multiplo con una scarsa mobilitazione cellulare	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AA03	Immunoglobuline equine anti-linfociti T	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 307/2023	Indicato per l'uso negli adulti e nei bambini di età pari o superiore a 2 anni per il trattamento dell'anemia aplastica acquisita da moderata a grave di eziologia immunologica nota o sospetta, nell'ambito della terapia immunosoppressiva standard in pazienti che non sono idonei al trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) per i quali non è disponibile un donatore di HSC idoneo	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA06	Acido micafenolico	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018	Profilassi del rigetto acuto	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Nefrologia - Pediatria - Immunologia - Ematologia 	
L04AA10	Sirolimus	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: <ul style="list-style-type: none"> - Centri di Trapianto - Emodialisi - Nefrologia 	
L04AA10	Sirolimus	os	RNR	A-PHT		DCA 106/2023	Trattamento di pazienti affetti da linfangioleiomiomatosi sporadica con malattia polmonare moderata o funzione polmonare in diminuzione	Pneumologia AOU CZ	
L04AA13	Leflunomide	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Dermatologia - Medicina Generale - Reumatologia 	
L04AA18	Everolimus	os	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali: <ul style="list-style-type: none"> - Cardiocirurgia - Nefrologia - Malattie infettive - Gastroenterologia - Epatologia 	
L04AA23	Natalizumab	ev/sc	OSP	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA24	Abatacept	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016	Indicazioni Reumatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio - ASP KR</p>	
L04AA25	Eculizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	DCA 164/2018	E' indicato per il trattamento di adulti e bambini affetti da: emoglobinuria parossistica notturna (EPN). Le prove del beneficio clinico sono dimostrate in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attività della malattia, indipendentemente dalla storia precedente di trasfusioni	<p>Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AA25	Eculizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA - Legge 648/96	DCA 164/2018 DCA 106/2023	Sindrome emolitico uremica atipica (SEUa)	<p>Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AA27	Eculizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Trattamento di adulti affetti da disturbo dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) in pazienti positivi agli anticorpi anti-acquaporina 4 (AQP4) con decorso recidivante della malattia	<p>Hub: - Neurologia</p>	
L04AA28	Eculizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Trattamento di pazienti adulti affetti da miastenia gravis generalizzata refrattaria (MGg) in pazienti positivi agli anticorpi anti recettore dell'acetilcolina (AChR)	<p>Hub: - Neurologia</p> <p>Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AA26	Belimumab	ev,sc	OSP/RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	E' indicato come terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, con un alto grado di attività della malattia (ad es. anti-ds DNA positivi e basso complemento) nonostante la terapia standardcx	<p>Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina Interna - Immunologia - Ambulatori di Reumatologia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA28	Belimumab	ev,sc	OSP/RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 107/2022	In combinazione con terapie immunosoppressive di fondo per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica attiva	Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina Interna - Nefrologia - Immunologia	
L04AA27	Fingolimod	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018 DCA 147/2020	Indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre: pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia disease modifying; oppure pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA28	Belatacept	ev	OSP	C		DCA 88/2017	In combinazione con corticosteroidi e acido micofenolico (MPA), è indicato per la profilassi del rigetto del trapianto negli adulti riceventi trapianto renale.	Hub e Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Nefrologia - Immunologia	
L04AA31	Teriflunomide	os	RRL	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L04AA32	Apremilast	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 88/2017	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	Area Reumatologia Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR) Area Dermatologia Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA33	Vedolizumab	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016	Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AA34	Alemtuzumab	ev	OSP	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA36	Ocrelizumab	ev	OSP	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 259/2018	Trattamento di pazienti adulti affetti da forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base alle caratteristiche cliniche o radiologiche	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA38	Ozanimod	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 134/2021	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla recidivante-remittente (SMRR) con malattia in fase attiva, come definito da caratteristiche cliniche o di imaging.	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA40	Cladribina	os	RNRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 109/2019	Trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività, definita da caratteristiche cliniche o di diagnostica per immagini	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA41	Imlifidase	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 111/2024	Indicato per il trattamento di desensibilizzazione di pazienti adulti altamente sensibilizzati che necessitano di trapianto di rene con un crossmatch positivo contro un donatore deceduto disponibile. L'uso di «idefix» deve essere riservato ai pazienti che hanno poche probabilità di essere sottoposti a trapianto nell'ambito del sistema di allocazione dei reni disponibili, compresi i programmi di assegnazione di priorità per i pazienti altamente sensibilizzati	Centri abilitati al Trapianto del Rene (Rete Ospedaliera DCA n. 78/2024 - Allegato 4 Tabella C) UU.OO. Nefrologia dell'AO Cosenza e del GOM Reggio Calabria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA40	Siponimod	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 134/2021 DCA 106/2023	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla secondariamente progressiva (SMSP) con malattia attiva evidenziata da recidive o da caratteristiche radiologiche di attivita' infiammatoria.	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA40	Ravulizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 212/2023	Trattamento di pazienti con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da sindrome emolitica uremica atipica (SEUa) che sono naive agli inibitori del complemento o che sono stati trattati con eculizumab per almeno tre mesi e hanno evidenziato una risposta a eculizumab	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA43	Ravulizumab	ev	OSP	H		DCA 70/2022	Indicato nel trattamento di pazienti adulti e pediatrici con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN): <ul style="list-style-type: none"> • in pazienti con emolisi e uno o più sintomi clinici indicativi di un'elevata attivita' della malattia; • in pazienti clinicamente stabili dopo trattamento con eculizumab per almeno gli ultimi 6 mesi 	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA47	Inebilizumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 133/2023	In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) sieropositivi per le immunoglobuline G antiaquaporina-4 (IgG AQP4), in seconda linea rispetto a rituximab, limitatamente ai pazienti che abbiano riportato almeno un attacco acuto di NMOSD nell'anno precedente, che hanno richiesto una terapia di salvataggio (ad esempio steroidi, plasmaferesi, somministrazione endovenosa di immunoglobuline) e che presentino un punteggio alla scala EDSS (Expanded Disability Severity Scale) ≤ 8,0	Hub: - Neurologia	
L04AA50	Ponesimod	os	RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 107/2022	Trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita sulla base di caratteristiche cliniche o radiologiche	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA51	Anifrolumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 133/2023 DCA 56/2025	Terapia aggiuntiva per il trattamento di pazienti adulti affetti da lupus eritematoso sistemico (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, in forma da moderata a severa, nonostante la terapia standard	Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina Interna - Immunologia U.O. Medicina Interna - Ospedale generale di Tropea	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AA52	Ofatumumab	sc	RRL	H		DCA 88/2017	Trattamento in combinazione con clorambucile o bendamustina di pazienti con LLC che non sono stati trattati in precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di fludarabina	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AA53	Ofatumumab	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 70/2022	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o radiologiche	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AA54	Pegcetacoplan	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Trattamento di pazienti adulti con emoglobinuria parossistica notturna (EPN) che rimangono anemici dopo trattamento con un inibitore di C5 per almeno TRE mesi	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AA58	Efgartigimod alfa	ev/sc	OSP/RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 307/2023	In aggiunta alla terapia standard per il trattamento dei pazienti adulti con miastenia gravis generalizzata (gMG) che sono positivi all'anticorpo antirecettore dell'acetilcolina (AChR)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AB01	Etanercept/Etanercept biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR) <u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AB02	Infliximab/Infliximab biosimilare	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria</p>	
L04AB05	Certolizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)</p>	
L04AB06	Golimumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AB04	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 88/2017	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR) <u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR) <u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale - Pediatria	
L04AB05	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 259/2018	Uveite	Hub: - Oculistica	
L04AB07	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 259/2018	Uveite pediatrica		
L04AB08	Adalimumab/Adalimumab biosimilare	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 259/2018	Idrosadenite Suppurativa		
L04AC03	Anakinra	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 109/2020	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC03	Anakinra	ev	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 134/2021	Febbre mediterranea familiare (FMF). Se appropriato, Anakinra deve essere somministrato in associazione con colchicina	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AC03	Anakinra	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 106/2023	Trattamento di soggetti adulti ospedalizzati con polmonite da COVID-19 moderata/severa (con pO2/FiO2<150, in ossigenoterapia e non sottoposti a C-PAP o ventilazione meccanica) e con livelli di plasma Solubile Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor (suPAR) ≥ 6ng/ml.	Malattie infettive e Centri indicati per la gestione dei pazienti affetti da COVID-19	
L04AC05	Ustekinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR) <u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR) <u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AC07	Tocilizumab	ev,sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 164/2018	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)	
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sindromi da Febbre Periodica Autoinfiammatoria (TRAPS, MKD, FMF)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 164/2018	Indicazioni Reumatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Pediatria - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p>	
L04AC08	Canakinumab	sc	RRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Malattia di Still	<p>Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AC10	Secukinumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 93/2016 DCA 212/2023	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotona (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Pediatria - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotona (ASP KR)</p>	
L04AC11	Siltuximab	ev	OSP	H		DCA 88/2017	Trattamento di malattia di Castleman multicentrica (MCD) che sono negativi per il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e per l'herpes virus-8 umano (HHV8)	<p>Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)</p>	
L04AC12	Brodalumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 109/2019	Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC13	Ixekizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 164/2018	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR)</p>	
L04AC14	Sarilumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 259/2018	Indicazioni Reumatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)</p>	
L04AC16	Guselkumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 259/2018	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR)</p>	
L04AC17	Tildrakizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 164/2018	Indicazioni Dermatologiche	<p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p>	
L04AC18	Risankizumab	ev	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 109/2020 DCA 106/2023 DCA 307/2023	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AC19	Satralizumab	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	In monoterapia o in associazione a terapia immunosoppressiva (TIS), per il trattamento dei disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD), in pazienti adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di età con sieropositività per le IgG antiacquaporina- 4 (AQP4-IgG)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AC21	Bimekizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 315/2024	In monoterapia o in combinazione con metotressato, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (disease-modifying antirheumatic drugs, DMARDs)	Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia - Reumatologia - Medicina Generale	
L04AC21	Bimekizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 106/2023	Indicazioni Dermatologiche	<u>Area Dermatologia.</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia	
L04AC22	Spesolimab	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 56/2025	In monoterapia per il trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata (generalised pustular psoriasis, GPP)	Hub e Spoke: - Dermatologia	
L04AC24	Mirikizumab	sc	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 315/2024	indicato per il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa attiva di grado da moderato a grave che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un trattamento biologico	<u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AD02	Tacrolimus	os,ev	RNR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Profilassi del rigetto da trapianto nei pazienti che ricevono trapianto allogenico di fegato, rene o cuore. Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri medicinali immunosoppressori.	Hub e Spoke: - Centri di Trapianto - Nefrologia - Emodialisi - Cardiologia - Cardiocirurgia - Malattie Infettive - Gastroenterologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AD03	Voclosporina	os	RRL	A-PHT		DCA 238/2023	In associazione a micofenolato mofetile, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica (NL) attiva di classe III, IV o V (comprese le classi miste III/IV e IV/V)	Hub e Spoke: - Reumatologia - Medicina Interna - Nefrologia	
L04AF01	Tofacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 259/2018 DCA 95/2021 DCA 70/2022	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR) <u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR) <u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale	
L04AF02	Baricitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 126/2018	Indicazioni Reumatologiche	<u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia - Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)	
L04AF02	Baricitinib	os	RNRL	H	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 238/2023	Trattamento dell'alopecia areata severa nei pazienti adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
L04AF02	Baricitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 238/2023	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AF03	Upadacitinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 238/2023	Indicazioni Reumatologiche Indicazioni Dermatologiche Indicazioni Gastroenterologiche	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p> <p>- Casa di cura Madonna dello Scoglio e Poliambulatorio Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p> <p>Poliambulatori di Palmi – Siderno – Melito – Scilla – Reggio Calabria (ASP RC) Poliambulatori Rende (ASP CS) e Crotone (ASP KR)</p> <p><u>Area Gastroenterologica</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina generale</p>	
L04AF03	Upadacitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 106/2023	Trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia</p>	
L04AF04	Filgotinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 134/2021	Trattamento dell'artrite reumatoide, in monoterapia o in associazione a metotrexato (MTX), in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o piu' farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD).	<p><u>Area Reumatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Reumatologia - Medicina generale - Ambulatori di Reumatologia</p>	
L04AF04	Filgotinib	os	RNRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 106/2023	Trattamento della colite ulcerosa in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno avuto una perdita di risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un medicinale biologico	<p><u>Area Gastroenterologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Gastroenterologia - Medicina Generale</p>	
L04AF07	Deucravacitinib	os	RRL	H	Scheda Regionale DCA Farmaci Biologici	DCA 315/2024	trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa in adulti candidati alla terapia sistemica	<p><u>Area Dermatologia</u> Hub, Spoke e Ospedali generali: - Dermatologia - Ambulatori di Dermatologia</p>	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AF08	Ritlecitinib	os	RNRL	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 315/2024	Alopecia areata severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Dermatologia	
L04AG14	Ublituximab	ev	OSP	H	Scheda di Prescrizione cartacea AIFA	DCA 56/2025	Indicato per il trattamento di pazienti adulti con forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita da caratteristiche cliniche o radiologiche	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
L04AJ05	Avacopan	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 225/2024	In associazione ad un regime a base di rituximab o ciclofosfamide, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangioite (GPA) o poliangioite microscopica (MPA) in fase attiva e severa Codice di esenzione MR: RG0070 granulomatosi con poliangioite (GPA) Codice di esenzione MR: RG0020 poliangioite microscopica (MPA)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AJ06	Zilucoplan	sc	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 56/2025	Terapia aggiuntiva alla terapia standard per il trattamento della miastenia gravis generalizzata (gMG) in pazienti adulti positivi agli anticorpi antirecettore dell'acetilcolina (AChR) Codice di esenzione MR = RFG101	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AX02	Talidomide	os	RR	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX04	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018 prot 427568 del 29.12.2022	E' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AX05	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018 prot 427568 del 29.12.2020	Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-I, associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX06	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX07	Lenalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone e' indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX05	Pirfenidone	os	RR/RNRL	H	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 111/2024	Trattamento di fibrosi polmonare idiopatica da lieve a moderata	Hub e Spoke: - Pneumologia - Medicina Interna - Pneumologia (Policlinico Madonna della Consolazione - ASP RC) Centro Regionale Fibrosi Cistica	
L04AX06	Pomalidomide	os	RNRL	H		DCA 93/2016	in associazione a desametasone è indicato nel trattamento di pazienti adulti con amiloidosi AL sottoposti a precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib che non abbiano determinato una risposta ematologica completa o parziale molto buona (definita come dFLC <40 mg/L nei soggetti con dFLC basale >50 mg/L o come dFLC <10 mg/L nei soggetti con dFLC basale tra 20 e 50 mg/L).	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
L04AX06	Pomalidomide	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	In associazione con desametasone, è indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario, sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della malattia durante l'ultima terapia	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
L04AX06	Pomalidomide	os	RRRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	In associazione con bortezomib e desametasone, e' indicato nel trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia comprendente lenalidomide	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
L04AX07	Dimetilfumarato	os	RR/RRL	A-PHT	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Sclerosi Multipla recidivante-remittente (RRMS) definita secondo i criteri di McDonald rivisti nel 2010 per la diagnosi di sclerosi multipla (Polman 2011)	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	65
L04AX08	Dimetilfumarato	os	RR/RRL	A		DCA 109/2019	Trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che necessitano di terapia farmacologica sistemica	Hub e Spoke: - Dermatologia	
M	SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO								
M01AB01	Indometacina	os,ev,im,loc	RR	A/C		DCA 93/2016	Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AB05	Diclofenac	os,loc,im	RR	A/C		DCA 93/2016	Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66
M01AB14	Proglumetacina	os	RR	A		DCA 93/2016	Artropatie su base connettivica; - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta.		66

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M01AB55	Diclofenac Sodico/Misoprostolo	os	RR	A		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta. 		66
M01AC01	Piroxicam	os,im	RR	A		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta. 		66
M01AE01	Ibuprofene	os	OTC/RR	C/A		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta. 		66
M01AE02	Naprossene	os	RR	A/C		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta. 		66
M01AE03	Ketoprofene	ev,os	RR	A		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta. 		66
M01AE09	Flurbiprofene	os	RR	A		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta. 		66

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M01AE12	Oxaprozina	os	RR	A		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta. 		66
M01AX17	Nimesulide	os	RR	A		DCA 93/2016	<p>Artropatie su base connettivica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; - Dolore neoplastico; - Attacco acuto di gotta <p>Trattamento di breve durata del dolore acuto</p>		66
M04AA04	Febuxostat	os	RR	A		DCA 93/2016	Trattamento dell'iperuricemia cronica con anamnesi o presenza di tofi e/o di artrite gottosa in soggetti che non siano adeguatamente controllati con allopurinolo o siano ad esso intolleranti.		91
M05BA02	Acido Clodronico Sale Disodico	im	RR	A/C		DCA 164/2018	Trattamento delle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e del mieloma multiplo	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Ematologia - Medicina Interna - Ortopedia 	42
M05BA03	Acido Pamidronico Sale Disodico	ev	RNRL	H		DCA 164/2018		<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Ematologia - Medicina Interna - Ortopedia 	
M05BA04	Acido Alendronico Sale Sodico	os	RR	A		DCA 164/2018	<p>Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche</p> <p>Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura</p>	<p>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia 	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BA04	Acido Alendronico Sale Sodico	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Indicato negli adulti per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee;	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Medicina Interna - Ortopedia	
M05BA06	Acido Ibandronico	os, ev	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
M05BA06	Acido Ibandronico	os, ev	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018	Indicato negli adulti per la prevenzione degli eventi scheletrici (fratture patologiche, complicanze ossee che richiedono l'uso della radioterapia o della chirurgia) in pazienti affette da tumore della mammella e metastasi ossee;	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Oncologia - Medicina Interna - Ortopedia	
M05BA07	Acido Risedronico	os	RR	A		DCA 164/2018	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia Ambulatori specialistici territoriali: - Ortopedia - Fisiatria - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia - Reumatologia	79
M05BA08	Acido Zolendronico Monoidrato	ev	RNRL/OSP	H		DCA 164/2018	Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura	Hub, Spoke: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia Ambulatori specialistici territoriali: - Ortopedia - Fisiatria - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia - Reumatologia	79

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BA08	Acido Zolendronico Monoidrato	ev	RNRL/OSP	H		DCA 164/2018		<p><u>Acido Zolendronico 5 mg</u> (fino a 4 unità-sacche o fialoncini)</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Reumatologia - Geriatria - Endocrinologia - Ginecologia - Ortopedia <p><u>Acido Zolendronico 4 mg</u> (fino a 4 unità-sacche o fialoncini)</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Ematologia - Medicina Interna - Ortopedia - Urologia <p>OSP: 5 mg (unità superiori a 4) OSP: 4 mg (unità superiori a 4)</p>	
M05B03	Acido Alendronico (aledronato sodico triidrato e colecalciferolo)	os	RR	A		DCA 164/2018	<p>Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche</p> <p>Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura</p>	<p>Hub, Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortopedia - Fisioterapia - Medicina Interna - Geriatria - Endocrinologia - Reumatologia 	79
M05BX04	Denosumab	sc	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 164/2018 Nota prot. n. 427568 del 2020	<p>Prevenzione secondaria in soggetti con pregresse fratture osteoporotiche</p> <p>Prevenzione primaria in donne in menopausa o uomini di età ≥50 anni a rischio elevato di frattura</p>	<p>Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Oncologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia 	79
M05BX04	Denosumab	sc	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 164/2018	Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia - Ematologia 	
M05BX04	Denosumab	sc	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbidità	<p>Hub, Spoke e Ospedali generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oncologia 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M05BX05	Burosumab	sc	RNL	H	Registro web-based AIFA	DCA 02/2020	Trattamento dell'ipofosfatemia X-linked (XLH) con evidenza radiografica di malattia ossea, nei bambini di età pari o superiore ad un anno e negli adolescenti con sistema scheletrico in crescita	Hub: - Nefrologia - Endocrinologia - Pediatria	
M05BX05	Burosumab	ev	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 133/2023	Trattamento dell'ipofosfatemia X-linked, nei bambini e adolescenti di età compresa tra uno e diciassette anni con evidenza radiografica di malattia ossea, e negli adulti	Hub: - Nefrologia - Endocrinologia - Pediatria	
M05BX06	Romosozumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 147/2022	Trattamento dell'osteoporosi severa in donne in post-menopausa ad alto rischio di frattura: - donne in menopausa con osteoporosi documentata, in prevenzione secondaria (≥1 frattura vertebrale moderata o grave oppure ≥2 fratture vertebrali lievi oppure ≥2 fratture non vertebrali da fragilità in anamnesi oppure una frattura femorale nei 2 anni prima) e con rischio di frattura a 10 anni ≥20% (determinato con calcolatore validato);- impossibilità a proseguire trattamenti alternativi efficaci (intolleranza, inefficacia o scadenza del periodo di impiego autorizzato), assenza di pregressi eventi cardio e cerebrovascolari e/o assenza di rischio cardiovascolare elevato (definito come rischio ≥20% secondo le carte del rischio del progetto CUORE per paz. < 70 anni, secondo valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare come da RCP per paz. ≥= 70 anni).	Hub, Spoke e Ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Geriatria - Ortopedia - Reumatologia - Ginecologia - Endocrinologia - Recupero e Riabilitazione Funzionale - Nefrologia	79
M05BX07	Vosoritide	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 66/2024	Trattamento dell'acondroplasia in pazienti di età compresa tra i cinque e i quattordici anni al momento dell'inizio della terapia e le cui epifisi non siano chiuse. La diagnosi di acondroplasia deve essere confermata mediante opportuna analisi genetica	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M05BX07	Vosoritide	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 106/2023	Trattamento dell'acondroplasia in pazienti di età compresa tra i cinque e i quattordici anni al momento dell'inizio della terapia e le cui epifisi non siano chiuse. La diagnosi di acondroplasia deve essere confermata mediante opportuna analisi genetica	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M09A802	Collagenasi di clostridium histolyticum	im	RL/OSP	H		DCA 164/2018	E' indicato nel trattamento della contrattura di Dupuytren in pazienti adulti con corda palpabile	- Ortopedia (specializzata nella chirurgia della mano)	
M09A802	Collagenasi di clostridium histolyticum	im	RL/OSP	H		DCA 164/2018	E' indicato nel trattamento di uomini adulti affetti da malattia di Peyronic con placca palpabile e curvatura di almeno 30 gradi all'inizio della terapia	- Ortopedia (specializzata nella chirurgia della mano)	
M09AX03	Ataluren	os	RNRL	H		DCA 146/2017	Trattamento della distrofia muscolare di Duchenne dovuta a mutazione nonsense nel gene della distrofina (nonsense mutation Duchenne Muscular Dystrophy, nmDMD) nei pazienti deambulanti di età pari o superiore a 5 anni. L'efficacia non è stata dimostrata nei pazienti non deambulanti	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M09AX07	Nusinersen	intrat	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 146/2017	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale 5q	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M09AX09	Onasemnogene Apeparovvec	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 111/2024	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 Kg e diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio dei sintomi nei primi 6 mesi di vita, oppure diagnosi di SMA 5q (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a tre copie del gene SMN2)		
M09AX09	Onasemnogene Apeparovvec	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 kg; diagnostica clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi di vita, oppure diagnosi genetica di SMA di tipo 1 (mutazione biallelica nel gene SMN1 e fino a due copie del gene SMN2)		

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
M09AX10	Risdiplam	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Trattamento dell'atrofia muscolare spinale (spinal muscular atrophy, SMA) 5q in pazienti con una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o aventi da una a quattro copie di SMN2	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
M09AX10	Risdiplam	os	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA) 5q in pazienti a partire da 2 mesi di età, con una diagnosi clinica di SMA di tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o aventi da una a quattro copie di SMN2	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N	SISTEMA NERVOSO								
N01AX03	Ketamina	ev	OSP	H		DCA 88/2017	Come unico anestetico per manovre chirurgiche e diagnostiche. Nonostante sia più indicato per interventi brevi, KETAMINA MOLteni può essere usato, con dosi addizionali, per interventi di maggiore durata. Qualora si desideri rilasciamento della muscolatura scheletrica, si usi un miorelassante e si tenga sotto controllo la respirazione. Per indurre l'anestesia prima di somministrare altri anestetici generali. Come supplemento ad altri anestetici.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
N02AE01	Buprenorfina (Cloridrato)	os,im,ev,td	RMR	A/H		DCA 164/2018	Trattamento sostitutivo per la dipendenza da oppioidi, nell'ambito di un contesto di trattamento medico, sociale e psicologico	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N02BG10	Delta-9-tetraidrocannabinolo/cannabidiolo	inal	RNRL	H		DCA 164/2018	E' indicato come trattamento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da spasticità da moderata a grave dovuta alla sclerosi multipla (SM) che non hanno manifestato una risposta adeguata ad altri medicinali antispastici e che hanno mostrato un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi associati alla spasticità nel corso di un periodo di prova iniziale della terapia	PDTA Sclerosi Multipla DCA n. 140 del 19/10/2017	
N02CD01	Erenumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020 DCA 95/2021 DCA 70/2022	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	Rete Regionale delle Cefalee DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	
N02CD02	Galcanezumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020 DCA 95/2021 DCA 70/2022	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	Rete Regionale delle Cefalee DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N02CD03	Fremanezumab	sc	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 147/2020 DCA 95/2021 DCA 70/2022	Profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese	Rete Regionale delle Cefalee DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	
N02CD05	Eptinezumab	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 238/2023	Indicato per la profilassi dell'emicrania negli adulti, con almeno quattro giorni di emicrania al mese	Rete Regionale delle Cefalee DCA n. 21 del 07/03/2022 Centri di II - III livello	
N03AF03	Rufinamide	os	RRL	A		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N03AF04	Eslicarbazepina acetato	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N03AX10	Felbamato	os	RRL	A		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Neurologia - Pediatria - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neurologo - Pediatra	
N03AX12	Gabapentin	os	RR	A		DCA 164/2018	Dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes, neuropatia associata a malattia, dolore post-ictus o da lesione midollare, polineuropatie, multineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, domipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risultati inefficace, neuropatia diabetica	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	4
N03AX12	Gabapentin	os	RR	A		DCA 164/2018	Trattamento della epilessia	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		DCA 164/2018	Dolore grave e persistente dovuto alle seguenti patologie documentate dal quadro clinico e/o strumentale: nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes, neuropatia associata a malattia, dolore post-ictus o da lesione midollare, polineuropatie, multilineuropatie, mononeuropatie dolorose, limitatamente ai pazienti nei quali l'impiego degli antidepressivi triciclici (amitriptilina, clomipramina) e della carbamazepina sia controindicato o risultati inefficace, neuropatia diabetica	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	4
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		DCA 164/2018	Trattamento della epilessia	Hub e Spoke: - Neurologia - Medicina Generale - Diabetologia - Centri per la Terapia del Dolore Ambulatori specialistici territoriali: - Internista - Diabetologo - Neurologo - Oncologo	
N03AX16	Pregabalin	os	RR	A		DCA 164/2018	Trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato	Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Psichiatria	
N03AX21	Retigabina	os	RR	A		DCA 164/2018	E' indicato come trattamento aggiuntivo delle crisi parziali farmaco-resistenti con o senza generalizzazione secondaria nei pazienti di età pari o superiore ai 18 anni affetti da epilessia, quando altre associazioni appropriate di farmaci si siano dimostrate inadeguate o non siano state tollerate	Hub e Spoke: - Neurologia	
N03AX22	Perampanel	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neurologo	
N03AX23	Brivaracetam	os/ev	RR/OSP	A-PHT/C	PT Cartaceo AIFA	Nota prot 427568 del 29.12.2020 DCA 259/2018	Terapia aggiuntiva nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti ed adolescenti a partire dai 16 anni di età con epilessia	Hub e Spoke: - Neurologia - Neuropsichiatria infantile	
N03AX24	Cannabidiolo	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	Nota prot 427568 del 29.12.2020 DCA 259/2018	Indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox Gastaut (LGS) nei pazienti a partire da due anni di età	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N03AX24	Cannabidiolo	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 134/2021	Indicato, come terapia aggiuntiva, in associazione con clobazam, per le crisi epilettiche associate a sindrome di Dravet (DS) nei pazienti a partire da due anni di età'	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N03AX24	Cannabidiolo	os	RNRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 147/2022	Indicato come terapia aggiuntiva per le crisi epilettiche associate a sclerosi tuberosa complessa (TSC) nei pazienti a partire da due anni di età'	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N03AX25	Cenobamato	os	RRL	A-PHT		Nota prot 427568 del 29.12.2020 DCA 70/2022	Indicato come terapia aggiuntiva delle crisi convulsive a insorgenza focale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti adulti affetti da epilessia che non sono stati adeguatamente controllati nonostante una storia di trattamento con almeno due medicinali antiepilettici.	Hub e Spoke: - Neurologia	
N03AX26	Fenfluramina	os	RNRL	A-PHT		DCA 147/2022	Trattamento di crisi epilettiche associate alla sindrome di Dravet come terapia aggiuntiva ad altri medicinali antiepilettici per pazienti di età pari o superiore ai 2 anni	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N04BA03	Levodopa/Carbidopa/Entacapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neurologo	
N04BA07	Foslevodopa e foscarbidopa	os	RRL	H		DCA 66/2024	Indicato per il trattamento della malattia di Parkinson in stadio avanzato rispondente a levodopa, con gravi fluttuazioni motorie e ipercinesia o discinesia, quando le combinazioni disponibili di medicinali antiparkinsoniani non hanno dato risultati soddisfacenti	Hub e Spoke: - Neurologia	
N04BC06	Cabergolina	os	RNL/RNR	A/C	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		<u>Classe C</u> Ambulatori specialistici territoriali: - Geriatria - Neurologia - Psichiatria	
N04BC07	Apomorfina	sc	RNRL	H		DCA 191/2022	Trattamento delle fluttuazioni motorie (fenomeni "on-off") in pazienti affetti da malattia di Parkinson che non sono sufficientemente controllati da medicinali anti-Parkinson per uso orale	Hub: Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N04BD02	Rasagilina mesilato	os	RR	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Psichiatria - Geriatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Geriatria - Neurologo - Psichiatria	
N04BD03	Safinamide	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA Aggiornamento Marzo-Aprile-Maggio 2025	Trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson idiopatica come terapia aggiuntiva a una dose stabile di levodopa (L-dopa) in monoterapia o in associazione ad altri medicinali per la malattia di Parkinson in pazienti fluttuanti in fase da intermedia ad avanzata	Hub e Spoke: - Neurologia	
N04BX01	Tolcapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Geriatria - Neurologia	
N04BX02	Entacapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Geriatria - Neurologia	
N04BX04	Opicapone	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 259/2018 Nota prot 427568 del 29.12.2020	Terapia aggiuntiva alle associazioni di levodopa/inibitori della DOPA decarbossilasi (DOPA decarboxylase inhibitors, DDCI) in pazienti adulti con malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie di fine dose che non sono stabilizzate con queste associazioni		
N05AE04	Ziprasidone Cloridrato	os	RR	A-PHT		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Psichiatria	
N05AE05	Lurasidone	os	RR	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 106/2023	Trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 13 anni di età	Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile	
N05AH01	Loxapina	inal	OSP	H	PT Cartaceo AIFA	DCA 126/2018	E' indicato per il controllo rapido dello stato di agitazione da lieve a moderato in pazienti adulti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare. I pazienti devono ricevere il trattamento abituale immediatamente dopo il controllo dei sintomi acuti di agitazione	Hub e Spoke: - Psichiatria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N05AH02	Clozapina	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396/205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche 	
N05AH03	Olanzapina	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396/205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche 	
N05AH03	Olanzapina	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H	Scheda di monitoraggio dei pazienti con disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza in trattamento con antipsicotici	DCA 164/2018	<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia - Geriatria 	
N05AH04	Quetiapina (fumarato)	os	RR	A-PHT		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396/205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche 	
N05AH04	Quetiapina (fumarato)	os	RR	A-PHT		DCA 164/2018	<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia - Geriatria 	
N05AH05	Asenapina	os	RR	A-PHT		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396/205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche 	
N05AH05	Asenapina	os	RR	A-PHT		DCA 164/2018	<p>Uso off-label:</p> <p>Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza</p>	<p>Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia - Geriatria 	
N05AX08	Risperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018		<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psichiatria - Neurologia <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396/205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N05AX08	Risperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018	Uso off-label: Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza	Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A. - Psichiatria - Neurologia - Geriatria	
N05AX12	Aripiprazolo	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AX12	Aripiprazolo	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018	Uso off-label: Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza	Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A. - Psichiatria - Neurologia - Geriatria	
N05AX13	Paliperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018	Trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire dai 15 anni di età	Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AX13	Paliperidone	os,im	RR/RNRL	A-PHT/H		DCA 164/2018	Uso off-label: Disturbi psicotici e comportamentali associati a demenza	Centri Valutazione Alzheimer ex U.V.A. - Psichiatria - Neurologia - Geriatria	
N05AX13	Paliperidone	im	RNRL	H	PT cartaceo AIFA	DCA 133/2023	Formulazione iniettabile a somministrazione semestrale Indicato per la terapia di mantenimento della schizofrenia limitatamente ai pazienti adulti adeguatamente trattati con paliperidone palmitato formulazione iniettabile a rilascio prolungato a somministrazione trimestrale (Trevicta) (350 o 525 mg) per almeno 6 mesi, con le ultime 2 dosi con lo stesso dosaggio e con punteggio totale PANSS stabilmente <70	Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	
N05AX16	Brexpiprazolo	os	RR	A-PHT		DCA 95/2021	Indicato per il trattamento della schizofrenia nei pazienti adulti	Hub e Spoke: - Psichiatria - Neurologia Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria Infantile (circolare Regionale 396205/2014) - Centri di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie - Psichiatri dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N05CD08	Midazolam	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Crisi convulsive acute prolungate in bambini e adolescenti (da 3 mesi a < 18 anni) Forme idiopatiche Sindrome di Dravet Sindrome di Panayiotopoulos	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia - Pediatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N05CD14	Remimazolam	ev	OSP	C		DCA 111/2024	Sedazione procedurale negli adulti	Hub e Spoke - Gastroenterologia	
N06AB03	Fluoxetina	os	RR	A		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N06AX21	Duloxetina cloridrato	os	RR	A/C		DCA 164/2018	Dolore grave e persistente		4
N06AX21	Duloxetina cloridrato	os	RR	A/C		DCA 164/2018	Trattamento della depressione maggiore e disturbo d'ansia generalizzato	Hub e Spoke: - Psichiatria	
N06AX26	Vortioxetina bromidrato	os	RR	A		DCA 109/2019	Trattamento episodi depressivi maggiori negli adulti	Hub e Spoke: - Psichiatria	
N06AX27	Esketamina	inal	RMR	H		DCA 70/2022 DCA 106/2023	In combinazione con un SSRI o un SNRI, è indicato per adulti con disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento, che non hanno risposto ad almeno due diversi trattamenti con antidepressivi nel corso dell'attuale episodio depressivo da moderato a grave	Hub e Spoke: - Psichiatria Centri di salute mentale (CSM)	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N06BA04	Metilfenidato	os	RMR	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 164/2018	CPR a Rilascio Modificato: Indicato come parte di un programma globale di trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti nei casi in cui le sole misure correttive si dimostrano insufficienti. Il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista in disturbi comportamentali in età pediatrica.	Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N06BA04	Metilfenidato (cloridrato)	os	RMR	A-PHT	PT web-based AIFA - Legge 648/96	DCA 164/2018	Trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD) negli adulti già in trattamento farmacologico prima del compimento del diciottesimo anno di età.	Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N06BA07	Modafinil	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Neurologia	
N06BA09	Atomoxetina (cloridrato)	os	RNRL	A-PHT	PT web-based AIFA - Legge 648/96	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Psichiatria Ambulatori specialistici territoriali: - Neuropsichiatria infantile	
N06BA14	Solriamfetol	os	RRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 134/2021	Indicato per: - migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva in pazienti adulti affetti da narcolessia (con o senza cataplessia). - migliorare lo stato di veglia e ridurre la sonnolenza diurna eccessiva (Excessive Daytime Sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva del sonno (Obstructive Sleep Apnoea, OSA) nei quali l'EDS non è stata trattata in modo soddisfacente con la terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione positiva continua nelle vie aeree (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP)	Hub: - Neurologia	
N06BX13	Idebenone	os	RR	C		DCA 164/2018	- Nel trattamento di deficit cognitivo- comportamentali conseguenti a patologie cerebrali sia di origine vascolare che degenerativa - Miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N06BX14	Idebenone	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018 DCA 126/2018	E' indicato per il trattamento della compromissione visiva in pazienti adulti e adolescenti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber (LHON)	Hub e Spoke: - Oftalmologia - Neurologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N06DA02	Donepezil Cloridrato	os	RRL/RNRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Trattamento della malattia di Alzheimer: - di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20	Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)	85
N06DA03	Rivastigmina	os,transderm	RRL	A	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Trattamento della malattia di Alzheimer: - di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20	Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)	85
N06DA04	Galantamina (bromidato)	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Trattamento della malattia di Alzheimer: - di grado lieve, con MMSE tra 21 e 26 - di grado moderato, con MMSE tra 10 e 20	Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)	85
N06DX01	Memantina (cloridrato)	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti con malattia di Alzheimer da moderata a grave	Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD)	85
N07BB04	Naltrexone Cloridrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC02	Metadone cloridrato	os	OSP	H		DCA 307/2023	Terapia sostitutiva per la dipendenza da oppioidi (OST) in pazienti adulti, nell'ambito di un trattamento medico, sociale e psicologico	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC05	Levometazone cloridrato	os	OSP	C		DCA 88/2017	Terapia sostitutiva di mantenimento nella dipendenza da oppioidi negli adulti, in associazione con un adeguato supporto medico, sociale e psicosociale.	Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07BC51	Buprenorfina/naloxone	os	RMR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N07XX	Edaravone	ev	OSP			DCA 164/2018	Trattamento di pazienti con diagnosi definitiva o probabile di sclerosi laterale amiotrofica, selezionati secondo specifici criteri: eta' ≥ 18 anni; punteggio ≥ 2 in ogni item della scala ALS Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R); funzionalità respiratoria caratterizzata da un valore di Capacità Vitale Forzata (CVF) ≥ 80% del teorico; durata di malattia dall'esordio dei sintomi ≤ 2 anni; riduzione di 1-4 punti nel punteggio ALS Functional Rating Scale-Revised nelle 12 settimane precedenti all'inizio del trattamento.	Hub: - Neurologia (GOM RC-AOU CZ-AO CS) Spoke: - Neurologia (PO VV-ASP VV)	
N07XX02	Riluzolo	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	sclerosi laterale amiotrofica (SLA)	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Neurologia	
N07XX04	Sodio oxibato	os	RNRL	C/H		DCA 164/2018	narcolessia con cataplessia in pazienti adulti	<u>Classe C</u> Neurologia <u>Classe H</u> Ser.D – Servizi per le Dipendenze Patologiche	
N07XX05	Amifampridina	os	RRL	C		DCA 164/2018	Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Neurologia	
N07XX06	Tetrabenazina	os	RRL	A		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Neurologia - Psichiatria - Geriatria	
N07XX08	Tafamidis	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 93/2016	Trattamento dell'amiloidosi da transtiretina nei pazienti adulti affetti da polineuropatia sintomatica di stadio 1 al fine di ritardare la compromissione neurologica periferica	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N07XX08	Tafamidis	os	RRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021 DCA 106/2023	Trattamento dell'amiloidosi da transtiretina wild type o ereditaria nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTR-CM)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024) U.O. Cardiologia del PO di Pollstena - ASP Reggio Calabria U.O. Cardiologia del PO di Castrovillari - ASP Cosenza	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
N07XX11	Pitolisant	os	RRL	A	PT cartaceo AIFA	DCA 147/2022	Indicato per migliorare lo stato di veglia e ridurre l'eccessiva sonnolenza diurna (excessive daytime sleepiness, EDS) in pazienti adulti affetti da apnea ostruttiva nel sonno (obstructive sleep apnea, OSA) nei quali l'EDS non è stata trattata in modo soddisfacente dalla terapia primaria per l'OSA, ad esempio la pressione continua positiva delle vie aeree (continuous positive airway pressure, CPAP) o nei quali tale terapia non sia stata tollerata.	Hub: - Neurologia	
N07XX11	Pitolisant	os	RRL	A-PHT		DCA 133/2023	Negli adulti per il trattamento della narcolessia con o senza cataplessia	Hub: - Neurologia	
N07XX12	Patisiran Sodico	ev	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 109/2020	Trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o stadio 2	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N07XX15	Inotersen	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da amiloidosi ereditaria da accumulo di transtiretina (hATTR) con polineuropatia in stadio 1 o 2	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
N07XX18	Vutrisiran	sc	RNRL	H	Registro web-based AIFA	DCA 307/2023	Trattamento dell'amiloidosi ereditaria mediata dalla transtiretina (amiloidosi hATTR) in pazienti adulti affetti da polineuropatia allo stadio 1 o allo stadio 2	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
P	FARMACI ANTIPARASSITARI, INSETTICIDI E REPELLENTI								
P01CX01	Pentamidina Isetionato	ev	RRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Malattie Infettive - Pneumologia	
R	SISTEMA RESPIRATORIO								
R03AC04	Fenoterolo	inal	RR	A		DCA 93/2016	Trattamento sintomatico degli attacchi asmatici; profilassi dell'asma da sforzo; trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopulmonari	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AC12	Salmeterolo Xinafoato	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AC13	Formoterolo	inal,os	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AC18	Indacaterolo	os	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AC19	Olodaterolo	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AK06	Salmeterolo Xinafoato/Fluticasone Propriionato	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AK07	Budesonide/Formoterolo Fumarato	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AK08	Formoterolo/beclometasone	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99
R03AK10	Fluticasone furoato/vilanterolo	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99
R03AL03	Umeclidinio bromuro/Vilanterolo trifenatato	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 88/2017	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99
R03AL04	Indacaterolo/glicopirronio bromuro	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99
R03AL05	Bromuro di aclidinio/Formoterolo	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 88/2017	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99
R03AL06	Tiotropio/Olodaterolo	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 88/2017	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03AL07	Glicopirronio/Formoterolo	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL08	Fluticasone/Umeclidinio/Vilanterolo	inal	RRL	A	PT Sistema TS	DCA 164/2018prot 427568 DCA 109/2019	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL09	Beclometasone/Formoterolo/glicopirroni o bromuro	inal	RRL	A	PT Sistema TS	DCA 164/2018prot 427568	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03AL09	Beclometasone/Formoterolo/glicopirroni o bromuro	inal	RRL	A	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018prot 427568	Terapia di mantenimento dei pazienti adulti con diagnosi di asma, per i quali l'associazione di un beta2-agonista a lunga durata d'azione e una dose media oppure elevata di corticosteroidi, non consenta un controllo adeguato dei sintomi, laddove siano soddisfatte, alla prima prescrizione	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia - Allergologia	
R03AL11	Glicopirronio/Formoterolo/Budesonide	inal	RNRL	A	PT Sistema TS	DCA 164/2018prot 427568	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99
R03BB04	Tiotropio bromuro cloridrato	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 88/2017	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	MMG Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia	99

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03BB05	Acildinio bromuro	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99
R03BB06	Glicopirronio bromuro	inal	RR	A	Scheda di prescrizione cartacea AIFA	DCA 164/2018	Terapia inalatoria di mantenimento della BPCO	<p>MMG</p> <p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicina Interna - Geriatria - Pneumologia 	99
R03DC03	Montelukast	os	RR	A		DCA 164/2018	<p>Trattamento di "seconda linea" dell'asma moderata persistente, in aggiunta agli steroidi per via inalatoria, quando questi non garantiscono un controllo adeguato della patologia, anche dopo associazione con β-2 agonisti</p> <p>Proflassi dell'asma da sforzo</p>	<p>Hub e Spoke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pneumologia - Medicina Generale <p>Ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allergologia - Pneumologia - Pediatria - Medicina <p>Per pazienti pediatrici affetti da asma (Nota 336746/2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pediatria 	82
R03DX05	Omalizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 164/2018 DCA 70/2022	Asma di accertata natura IgE mediata	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria <p>- Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria</p>	
R03DX05	Omalizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT web-based AIFA	DCA 164/2018 DCA 70/2022	Orticaria cronica spontanea	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dermatologia - Allergologia - Pediatria 	
R03DX05	Omalizumab	sc	RRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 191/2022	Indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a diciotto anni) con Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) grave per i quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia	<p>Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allergologia - Immunologia - ORL 	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03DX07	Roflumilast	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	E' indicato come terapia di mantenimento nella broncopneumopatia cronica ostruttiva grave (BPO) (FEV1 post-broncodilatatore meno del 50% del teorico) associata a bronchite cronica nei pazienti adulti con una storia di esacerbazioni frequenti come aggiunta al trattamento broncodilatatore	Hub e Spoke: - Pneumologia - Geriatria - Medicina Generale	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018 DCA 88/2017 DCA 70/2022 DCA 147/2022	Terapia aggiuntiva per l'asma eosinofilo refrattario severo in pazienti adulti, adolescenti e bambini di eta' pari o superiore a 6 anni	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 70/2022 DCA133/2023	Indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) severa per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Allergologia - Immunologia - ORL	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 133/2023	Granulatosi eosinofila con poliangite (EGPA)	Rete Malattie Rare (Allegato 1 - DCA n. 28 del 30/01/2024)	
R03DX09	Mepolizumab	sc,ev	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 133/2023	Sindrome Ipereosinofila (HES)	Hub: - Allergologia - Ematologia - Immunologia - Pediatria - Pneumologia - Reumatologia	
R03DX10	Benralizumab	sc	RRL	A-PHT	PT Cartaceo AIFA	DCA 109/2019 DCA 70/2022 DCA 147/2022	Terapia di mantenimento aggiuntiva in pazienti adulti con asma eosinofilo severo non adeguatamente controllato malgrado l'impiego di corticosteroidi per via inalatoria a dosi elevate e β-agonisti a lunga durata d'azione	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria - Medicina Interna Ambulatorio di Pneumologia del PO di Polistena e Melito Porto Salvo - ASP Reggio Calabria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R03DX11	Tezepelumab	sc	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 111/2024	Indicato come trattamento aggiuntivo di mantenimento in adulti e adolescenti di età pari o superiore ai dodici anni con asma severa che non sono adeguatamente controllati nonostante alte dosi di corticosteroidi per via inalatoria più un altro medicinale per il trattamento di mantenimento	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Pneumologia - Allergologia - Immunologia - Pediatria	
R05CB13	Dornase alfa	inal	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R05DA20	Diidrocoideina + acido benzoico	os	RR	A		DCA 164/2018	tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R05DA	Diidrocoideina	os	RR	A		DCA 164/2018	tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R05DB27	Levodropropizina	os	RR	A		DCA 164/2018	tosse persistente non produttiva nelle gravi pneumopatie croniche e nelle neoplasie polmonari primitive o secondarie		31
R06AD02	Prometazina Cloridrato	im,os	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R06AE06	Oxatomide	os	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AE07	Cetirizina Dicloridrato	os	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AE09	Levocetirizina dicloridrato	os	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AX13	Loratadina	os	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R06AX17	Ketotifene fumarato acido	os	RR	A		DCA 93/2016	Pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)		89
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Indicato in monoterapia per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a 6 anni e di peso pari o superiore a 25 kg affetti da fibrosi cistica (FC), che hanno una delle seguenti mutazioni di gating (di classe III) nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R. [Data inizio monitoraggio AIFA 05/05/2015] o che hanno una mutazione R117H CFTR [Data inizio monitoraggio AIFA 12/04/2017 per i pz i età pari o superiore a 18 anni]; [Data inizio monitoraggio 04/01/2022 per i pz di età pari o superiore a 6 anni]	Centro Regionale Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	In un regime di associazione con Ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a sei e minore di dodici anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Kalydeco® compresse e' indicato in regime di associazione con Ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Kalydeco® compresse e' indicato in regime di associazione con Ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono eterozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) per F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Kalydeco® compresse e' indicato in regime di associazione con Ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a sei anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure; di funzione residua (genotipo F/RF) oppure; non classificata (genotipo F/non classificato) oppure; non identificata (genotipo F/non identificato).	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		DCA 134/2021	Indicato in associazione con Ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor 100 mg compresse per il trattamento di adulti e adolescenti di età pari e superiore a sei anni affetti da fibrosi cistica (FC), omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR o eterozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		DCA 70/2022	Indicato in un regime di associazione con Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor compresse, per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure di funzione residua (genotipo F/RF) oppure non classificata (genotipo F/non classificato) oppure non identificata (genotipo F/non identificato)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX02	Ivacaftor	os	RRL	A-PHT		DCA 164/2018	In un regime di associazione con ivacaftor /tezacaftor/elexacaftor compresse per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini di età pari e superiore a sei e minore di dodici anni affetti da fibrosi cistica (FC) che hanno almeno una mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX30	Lumacaftor / ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 111/2024	Trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 1 anno omozigoti per la mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX30	Lumacaftor / ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Granulato: indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in bambini di età pari o superiore a 2 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX30	Lumacaftor / ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato per il trattamento della fibrosi cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 6 anni omozigoti per la mutazione F508del nel gene CFTR	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX31	Tezacaftor/ivacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento di pazienti affetti da fibrosi cistica (FC) di età pari e superiore a dodici anni, omozigoti per la mutazione F508del o eterozigoti per la mutazione F508del e che presentano una delle seguenti mutazioni nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR): P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+ 3A → G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789 + 5G → A, 3272-26A → G, e 3849 + 10kbc → T	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX32	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 134/2021	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di età pari e superiore a dodici anni, che sono omozigoti per la mutazione F508del nel gene per il regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) o eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione a funzione minima (MF).	Centro Regionale Fibrosi Cistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
R07AX32	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 191/2022	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di eta' da sei a minore di dodici anni che hanno almeno una mutazione F508del nel gene regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
R07AX33	Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor	os	RRL	A-PHT	Registro web-based AIFA	DCA 70/2022	Indicato in un regime di associazione con ivacaftor 150 mg compresse, per il trattamento della fibrosi cistica (FC) in pazienti di eta' pari e superiore a 12 anni, che sono eterozigoti per F508del nel gene CFTR con una mutazione: di gating (genotipo F/G) oppure di funzione residua (genotipo F/RF) oppure non classificata (genotipo F/non classificato) oppure non identificata (genotipo F/non identificato)	Centro Regionale Fibrosi Cistica	
S	ORGANI DI SENSO								
S01AA12	Tobramicina	loc	RR	C		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Malattie Infettive - Medicina Generale - Pediatria - Pneumologia Centri Fibrosi Cistica	
S01BA15	Fluocinolone acetoneide	intravit	OSP	H	PT Cartaceo AIFA	DCA 146/2017	Trattamento della compromissione visiva associata all'edema maculare diabetico cronico che non risponde in misura sufficiente alle altre terapie disponibili.	Hub: - Oculistica	
S01BC10	Nepafenac	loc	RR	H		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Oculistica	
S01EB01	Pilocarpina Cloridrato	loc	RR	A		DCA 164/2018		Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Medicina Generale - Oncologia - Oculistica - Gastroenterologia	
S01LA03	Pegaptanib sodico	intravit	OSP	H		DCA 164/2018	E' indicato per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD) negli adulti	Hub e Spoke: - Oculistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01LA04	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 164/2018	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA04	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 164/2018	Edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA07	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 164/2018	Trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA07	Ranibizumab	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 164/2018	Trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia patologica (PM)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA05	Aflibercept	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 111/2024	Indicato nei neonati pretermine per il trattamento di retinopatia del prematuro (Retinopathy Of Prematurity, ROP) con zona I (stadio 1+, 2+, 3 o 3+), zona II (stadio 2+ or 3+) o AP-ROP (ROP aggressiva posteriore)	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01LA05	Aflibercept	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 164/2018	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA05	Aflibercept	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 164/2018	Edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA05	Aflibercept	intravitr	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 164/2018	Compromissione della vista dovuta a edema maculare secondario a occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)	Hub e Spoke: - Oculistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01LA06	Brolucizumab	intravit	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 95/2021	Degenerazione maculare neovascolare correlata all'età (AMD essudativa)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA06	Brolucizumab	intravit	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 66/2024	Indicato negli adulti per il trattamento di diminuzione visiva causata da edema maculare diabetico (DME)	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01LA09	Faricimab	intravit	OSP	H	Scheda multifarmaco semplificata anti-vegf	DCA 307/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Degenerazione maculare legata all'età' di tipo neovascolare (umida) (nAMD) • Compromissione della vista dovuta a edema maculare diabetico(DME) 	Hub e Spoke: - Oculistica	98
S01XA18	Ciclosporina	loc	RRL	A-PHT		DCA 147/2020 DCA 238/2023	Trattamento di severa cheratoconjuntivite Vernal (VKC) nei bambini al di sopra di 4 anni e negli adolescenti	Hub e Spoke: - Oculistica	
S01XA18	Ciclosporina	loc	RRL	A-PHT		DCA 147/2020	Trattamento della cheratite grave in pazienti adulti con sindrome dell'occhio secco non migliorata malgrado il trattamento con sostituti lacrimali	Hub e Spoke: - Oculistica	83
S01XA19	Cellule epiteliali corneali umane autologhe	imp. sc	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 164/2018	Trattamento di pazienti adulti affetti da deficit di cellule staminali limbari da moderato a grave (definito dalla presenza di neovascolarizzazione superficiale della cornea in almeno due quadranti, con coinvolgimento della parte centrale della cornea e grave compromissione dell'acuità visiva), unilaterale o bilaterale, causato da ustioni oculari da agenti fisici o chimici. Per la biopsia sono necessari almeno 1-2 mm ² di tessuto limbare non danneggiato	Hub: - Oculistica	
S01XA22	Ocriplasmina	intravit	OSP	H		DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
S01XA24	Cenegegermin	loc	RNRL	H		DCA 126/2018 DCA 164/2018	Trattamento della cheratite neurotrofica moderata (difetto epiteliale persistente) o severa (ulcera corneale) negli adulti	Hub e Spoke: - Oculistica	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
S01XA27	Voretigenene neparovec	sottoretinico	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 95/2021	Trattamento di pazienti adulti e pediatrici con perdita della vista dovuta adistrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche confermate di RPE65 e che abbiano sufficienti cellule retiniche vitali	Hub: - Oculistica	
v	VARI								
V01AA02	Polline di graminacee	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Allergologia - Pediatria - Otorinolaringoiatria - Pneumologia - Immunologia	
V01AA07	Allergeni estratti da Veleno di Ape adsorbito su gel di Idrossido di Alluminio	ev	OSP	H		DCA 212/2023 DCA 111/2024	Immunoterapia allergene specifica per pazienti con una storia documentata di reazioni allergiche IgE-mediate generalizzate e/o sistemiche causate da sensibilizzazione al veleno di Ape (Apis mellifera), confermata da Skin Prick Test e/o test intradermico e/o IgE specifiche	Hub e Spoke: - Allergologia	
V01AA07	Allergeni estratti da Veleno di Ape adsorbito su gel di Idrossido di Alluminio idrato	ev	OSP	H		DCA 212/2023 DCA 111/2024	Immunoterapia allergene specifica per pazienti con una storia documentata di reazioni allergiche IgE-mediate generalizzate e/o sistemiche causate da sensibilizzazione al veleno di vespa (Vespula spp.), confermata da Skin Prick Test e/o test intradermico e/o IgE specifiche	Hub e Spoke: - Allergologia	
V03AB35	Sugammadex	ev	OSP	H		DCA 259/2018	Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti. Per la popolazione pediatrica: sugammadex è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 17 anni.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero	
V03AB37	Idarucizumab	ev	OSP	H		DCA 88/2017	Indicato nei pazienti adulti trattati con dabigatranetexilato nei casi in cui si rende necessaria l'inattivazione rapida dei suoi effetti anticoagulanti-negli interventi chirurgici di emergenza/nelle procedure urgenti2-nel sanguinamento potenzialmente fatale o non controllato.	Uso esclusivo in ambiente ospedaliero DCA 88/2017	
V03AB38	Andexanet alfa	ev	OSP	C		DCA 107/2022	Indicato per pazienti adulti trattati con un inibitore diretto del fattore Xa (FXa) (apixaban o rivaroxaban), quando è richiesta l'inversione della terapia anticoagulante a causa di emorragie potenzialmente fatali o incontrollate	Hub e Spoke: - Centri DEA 1 e 2 - Pronto Soccorso Elenco sito Ministero della Salute aggiornato al 6 dicembre 2021	
V03AC01	Deferoxamina Mesilato	im,ev,sc	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Ematologia - Servizio Trasfusionale - Medicina Generale - Nefrologia - Emodialisi - Oncologia - Pediatria	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V03AC02	Deferiprone	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello Hub e Spoke: - Servizio Trasfusionale	
V03AC03	Deferasirox	os	RNRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello Hub e Spoke: - Servizio Trasfusionale	
V03AE01	Sodio Polistiren Solfonato	os	RR	A		DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Medicina Generale - Nefrologia - Cardiologia - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE02	Sevelamer	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE03	Lantano carbonato idrato	os	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Emodialisi - Nefrologia	
V03AE05	Ossidrossido sucoferrico	os	RRL	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Nefrologia	
V03AE09	Patiromer	os	RRL	A-PHT		DCA 134/2021	Indicato per il trattamento dell'iperkalemia negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Nefrologia - Medicina Interna	
V03AE10	Ciclosilicato di sodio e zirconio	os	RRL	A-PHT	PT cartaceo AIFA	DCA 134/2021	Indicato per il trattamento dell'iperkalemia negli adulti	Hub, Spoke e ambulatori specialistici territoriali: - Cardiologia - Nefrologia - Medicina Interna	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V03AF01	Mesna	ev	RR	A-PHT	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
V03AF03	Calcio Folinato	im,ev,os	RR	A		DCA 93/2016	Recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico		11
V03AF09	Glucarpidasi	ev	OSP	H		DCA 66/2024	Indicato per ridurre concentrazioni plasmatiche tossiche di metotrexato in adulti e bambini (di età pari e superiore a ventotto giorni) con eliminazione ritardata di metotrexato o a rischio di tossicità da metotrexato	Rete Ematologica Regionale - DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello Hub: - Oncoematologia Pediatrica - Reumatologia Hub e Spoke: - Anestesia e Rianimazione - Medicina d'urgenza	
V03AH01	Diazossido	os	RRL	A	Scheda Regionale DCA PT generico	DCA 164/2018		Hub e Spoke: - Medicina Generale - Oncologia - Gastroenterologia - Pediatria	
V04CD01	Metirapone	os	RNRL	A-PHT		DCA 164/2018		Hub: - Medicina Generale - Endocrinologia	
V04CJ01	Tireotropina alfa	im	OSP	H		DCA 164/2018		Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia	
V10XX02	Ibritumomab tiuxetano	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Indicato come terapia di consolidamento dopo l'induzione della remissione in pazienti con linfoma follicolare non pretrattati	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	
V10XX03	Ibritumomab tiuxetano	ev	OSP	H		DCA 164/2018	Indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non-Hodgkin (NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a rituximab	Rete Ematologica Regionale DCA n. 102/2020 Centri di II - III livello	

Codice ATC	Principio Attivo	Via somm.	Tipo Ricetta	Classe SSN	PT/WEB- BASED	DCA	INDICAZIONE TERAPEUTICA RIMBORSATA	CENTRI PRESCRITTORI	Nota AIFA o altro
V10XX03	Radio-223 dicloruro	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 93/2016	<p>In monoterapia o in associazione con un analogo dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizante (Luteinising Hormone-Releasing Hormone, LHRH) è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer, mCRPC), con metastasi ossee sintomatiche e senza metastasi viscerali note, in progressione dopo almeno due precedenti linee di terapia sistemica per il mCRPC (diverse dagli analoghi del LHRH) o non eleggibili ai trattamenti sistemici disponibili per il mCRPC</p> <p>2. limitare l'uso ai pazienti che sono stati sottoposti a due precedenti trattamenti per il carcinoma prostatico metastatico (cancro della prostata che si è diffuso alle ossa) o che non possono ricevere altri trattamenti.</p>	<p>Hub, Spoke e Ospedali generali: - Oncologia</p>	
V10XX04	Lutezio-177LU-Oxodotreotide	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA 109/2019	<p>Trattamento di tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (NET-GEP) ben differenziati (G1 e G2), progressivi, non asportabili o metastatici, positivi ai recettori per la somatostatina.</p>	<p>Hub: - Oncologia - Radioterapia</p>	
V10XX05	Lutezio-177LU-vipivotide tetraxetan	ev	OSP	H	Registro web-based AIFA	DCA aggiornamento PTR Marzo-Aprile-Maggio 2025	<p>In associazione a terapia di deprivazione androgenica (androgen deprivation therapy, AD T) con o senza inibitore della via del recettore degli androgeni (androgen receptor, AR), è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC) progressivo, positivo all'antigene di membrana specifico della prostata (prostate-specific membrane antigen, PSMA), che sono stati trattati con inibitore della via dell'AR e chemioterapia a base di docetaxel e cabazitaxel o che non sono candidabili a cabazitaxel</p>	<p>AO CS: UU.OO. Oncologia e Medicina Nucleare</p>	